MV3

305495

ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK

Leírás

Az MV3 sejtvonal egy emberi melanoma-modell, amelyet egy amelanotikus melanomában szenvedő férfi beteg metasztatikus nyirokcsomójából állítottak elő. Ez a sejtvonal rendkívül metasztatikus és tumorigenikus, ami a melanoma progressziójának és metasztázisának vizsgálatában kulcsfontosságú erőforrássá teszi. Az MV3 sejtek jelentős invazív tulajdonságokat mutatnak, amit az extracelluláris mátrix komponenseinek lebontására irányuló erős képességük is alátámaszt. Ezt a képességet az urokináz-típusú plazminogén-aktivátor (u-PA) útvonal és a plazminogén-aktivátor-gátlók (PAI-1 és PAI-2) általi szabályozás közvetíti. Az MV3-sejteket a metasztázissal összefüggő markerek, például az integrinek (pl. VLA-2) és a növekedési faktor-receptorok expressziója jellemzi, amelyek agresszív fenotípusukhoz kapcsolódnak.
Xenotranszplantációs modellekben az MV3-sejtek gyors daganatképződést és magas gyakoriságú spontán metasztázisokat mutatnak, különösen a tüdőbe. Ezek a tulajdonságok kulcsfontosságúak voltak a melanóma terjedésének és a terápiával szembeni rezisztenciának az alapjául szolgáló mechanizmusok feltárására irányuló preklinikai kutatásokban. A meztelen egerekben kialakuló MV3-daganatok megőrzik az eredeti, betegből származó daganat szövettani jellemzőit, beleértve a magas mitotikus aktivitást és a korlátozott pigmentációt. Az MV3-sejtek prokoaguláns tulajdonságai tovább hozzájárulnak metasztatikus viselkedésükhöz, mivel szöveti faktor-aktivitást mutatnak, és közvetlenül aktiválhatják a protrombint trombinná, fokozva ezzel a tumor mikrokörnyezetével való kölcsönhatásokat.
Az MV3-at olyan tanulmányokban is alkalmazták, amelyek a sejtfelszíni molekulák szerepére és azok szabályozására összpontosítottak a melanoma áttétképzésében. Például a sejtvonal jelentős mennyiségben expresszálja az intercelluláris adhéziós molekula-1-et (ICAM-1) és az epidermális növekedési faktor-receptort (EGFR), amelyek a fokozott áttétképző képességgel társulnak. A modell továbbra is kulcsfontosságú szerepet játszik a célzott terápiák értékelésében és a melanóma rosszindulatúságának molekuláris kiváltó tényezőinek megértésében.

Szövet	Bőr
Betegség	Amelanotikus melanoma
Áttétes hely	Nyirokcsomó

Szinonimák

- MV-3
- MV 3

OSZTÁLYOZÁS

Organizmus	Ember
Szex	Férfi
Növekedési tulajdonságok	Hűséges
Biológiai biztonsági szint	1

JELLEMZŐK

Morfológia	Epithelszerű

AZONOSÍTÓK

Hivatkozás

MV3 (Cytion katalógusszám: 305495)

NCBI adóazonosító szám	9606

Cellosaurus	CVCL_W280

KEZELÉS ÉS TENYÉSZTÉS

Táptalaj

RPMI 1640, w: 2,0 mM stabil glutamin, w: 2,0 g/L NaHCO3 (Cytion 820700a cikkszám)

Inkubációs környezet	37°C, 5%CO2, párásított légkör.

Kiegészítők

A táptalajt egészítsük ki 10% FBS-szel

Diszociációs reagens	Accutase

Átültetés

Távolítsa el a régi táptalajt a megtapadt sejtekről, és mossa őket kalcium- és magnéziummentes PBS-szel. T25-ös lombikokhoz 3-5 ml PBS-t, T75-ös lombikokhoz pedig 5-10 ml-t használjunk. Ezután fedjük be a sejteket teljesen Accutase-zal, T25 lombikok esetében 1-2 ml-t, T75 lombikok esetében 2,5 ml-t használva. A sejteket 8-10 percig hagyjuk szobahőmérsékleten inkubálni, hogy leváljanak. Az inkubálás után óvatosan keverjük össze a sejteket 10 ml tápfolyadékkal, hogy reszuszpendáljuk őket, majd centrifugáljuk 300xg-nél 3 percig. Dobja el a felülúszót, szuszpendálja újra a sejteket friss tápfolyadékban, és helyezze át őket új lombikokba, amelyek már friss tápfolyadékot tartalmaznak.

Felolvasztás és tenyésztés

Confirm that the vial remains deeply frozen upon delivery, as cells are shipped on dry ice to maintain optimal temperatures during transit.
Upon receipt, either store the cryovial immediately at temperatures below -150°C to ensure the preservation of cellular integrity, or proceed to step 3 if immediate culturing is required.
For immediate culturing, swiftly thaw the vial by immersing it in a 37°C water bath with clean water and an antimicrobial agent, agitating gently for 40-60 seconds until a small ice clump remains.
Perform all subsequent steps under sterile conditions in a flow hood, disinfecting the cryovial with 70% ethanol before opening.
Carefully open the disinfected vial and transfer the cell suspension into a 15 ml centrifuge tube containing 8 ml of room-temperature culture medium, mixing gently.
Centrifuge the mixture at 300 x g for 3 minutes to separate the cells and carefully discard the supernatant containing residual freezing medium.
Gently resuspend the cell pellet in 10 ml of fresh culture medium. For adherent cells, divide the suspension between two T25 culture flasks; for suspension cultures, transfer all the medium into one T25 flask to promote effective cell interaction and growth.
Adhere to established subculture protocols for continued growth and maintenance of the cell line, ensuring reliable experimental outcomes.

MINŐSÉGELLENŐRZÉS ÉS KRIOKONZERVÁLÁS

Meddőség

A mikoplazma-szennyeződést mind a PCR-alapú vizsgálatokkal, mind a lumineszcencia-alapú mikoplazma-kimutatási módszerekkel kizárják. A bakteriális, gombás vagy élesztőgombás szennyeződés elkerülése érdekében a sejtkultúrákat napi vizuális ellenőrzésnek vetik alá.

Fagyasztóközeg	Krioprezerváló táptalajként teljes növekedési táptalajt (beleértve az FBS-t) + 10% DMSO-t használunk a megfelelő kiolvasztás utáni életképesség érdekében, vagy CM-1-et (Cytion katalógusszám: 800100), amely optimalizált ozmoprotektánsokat és metabolikus stabilizátorokat tartalmaz a regenerálódás fokozása és a krio-indukált stressz csökkentése érdekében.

Tárolási feltételek

Hosszú távú tartósítás céljából helyezze az üvegeket gőzfázisú folyékony nitrogénbe, körülbelül -150 és -196 °C közötti hőmérsékleten. A -80 °C-on történő tárolás csak rövid átmeneti lépésként fogadható el a folyékony nitrogénbe való átvitel előtt.

Szállítási feltételek

A kriokonzervált sejtvonalakat szárazjégen, validált, szigetelt csomagolásban szállítják, elegendő hűtőközeggel, hogy a szállítás során a hőmérsékletet körülbelül -78 °C-on tartsák. Átvételkor azonnal vizsgálja meg a tárolóedényt, és haladéktalanul helyezze át az injekciós üvegeket a megfelelő tárolóhelyre.

Cytion GmbH
Nikola-Tesla-Str. 3
69124 Heidelberg
Tel: +49 (0)6221 405780
info@cytion.com
cytion.com

Registered office Heidelberg
VAT ID: DE283292917
Local court Mannheim - HRB 714394
CEO / Geschäftsführer: Jonathan Steubing

Banking information
Sparkasse Heidelberg
IBAN: DE35 6725 0020 0009 2076 86
BIC: SOLADES1HDB

ADOMÁNYOZÓ

Az adományozó életkora	76 év
Etnikai hovatartozás	Meghatározatlan

JOGI ÉS BIZTONSÁGI INFORMÁCIÓK

Biztonsági óvintézkedések

Ha egy kriovialitást folyékony nitrogénben tervezünk tárolni a későbbi kiolvasztás céljából, akkor kötelező betartani a szigorú biztonsági intézkedéseket. A megfelelő védőkesztyű és védőruházat elengedhetetlen, és a fagyasztott minták folyékony nitrogéntartályba vagy a folyékony nitrogéntartályból történő átvitele során arcmaszk vagy védőszemüveg használata szükséges. Ez azért van, hogy csökkentsék a kriovialis anyagok eltávolításakor bekövetkező esetleges robbanásból eredő sérülésveszélyt, amely éles szilánkok kilövellését eredményezheti.

Garancia

A Cytionnál kiállunk termékeink minősége és életképessége mellett.
Garantáljuk, hogy sejtjeink a tenyésztés megkezdésekor életképesek lesznek, a létesítményünkből történő kiszállítás után 60 napig.
Biztosítjuk, hogy minden anyag megfelel az analitikai tanúsítványban és/vagy a terméklapon leírt specifikációknak
A teljes részleteket lásd <a href=""/Who-we-are/Warranty/"" hreflang=""""x-default"">Garancia nyilatkozatunkban

Anyagátadási megállapodás szükséges	Yes