MV3

305495

GENERELL INFORMASJON

Beskrivelse

MV3-cellelinjen er en modell for humant melanom som er etablert fra en metastatisk lymfeknute hos en mannlig pasient med amelanotisk melanom. Denne cellelinjen er svært metastatisk og tumorigen, noe som gjør den til en viktig ressurs for å studere melanomets progresjon og metastasering. MV3-celler viser betydelige invasive egenskaper, understøttet av deres sterke evne til å nedbryte komponenter i den ekstracellulære matriksen. Denne evnen formidles gjennom urokinase-type plasminogenaktivator (u-PA)-signalveien og dens regulering av plasminogenaktivatorinhibitorer (PAI-1 og PAI-2). MV3-celler kjennetegnes ved uttrykk av markører assosiert med metastasering, slik som integriner (f.eks. VLA-2) og vekstfaktorreseptorer, som er knyttet til deres aggressive fenotype.
I xenotransplantasjonsmodeller viser MV3-celler rask tumordannelse og en høy forekomst av spontane metastaser, særlig til lungene. Disse egenskapene har vært sentrale i preklinisk forskning med sikte på å avdekke mekanismene som ligger til grunn for spredning av melanom og resistens mot behandling. MV3-svulster hos nakne mus beholder de histologiske trekkene til den opprinnelige svulsten fra pasienten, inkludert høy mitotisk aktivitet og begrenset pigmentering. De prokoagulerende egenskapene til MV3-cellene bidrar ytterligere til deres metastatiske atferd, da de viser vevsfaktoraktivitet og kan aktivere protrombin direkte til trombin, noe som forsterker interaksjonene med svulstens mikromiljø.
MV3 har også blitt brukt i studier som har fokusert på rollen til molekyler på celleoverflaten og reguleringen av disse i melanommetastaser. For eksempel uttrykker cellelinjen betydelige nivåer av intercellulært adhesjonsmolekyl-1 (ICAM-1) og epidermal vekstfaktorreseptor (EGFR), som er forbundet med økt metastatisk potensial. Modellen spiller fortsatt en avgjørende rolle i evalueringen av målrettede behandlinger og forståelsen av de molekylære driverne bak melanomets ondartethet.

Vev	Hud
Sykdom	Amelanotisk melanom
Metastaseområde	Lymfeknute

Synonymer

- MV-3
- MV 3

KLASSIFISERING

Organisme	Menneske
Sex	Mann
Vekstegenskaper	Tilhenger
Biosikkerhetsnivå	1

EGENSKAPER

Morfologi	Epitel-lignende

IDENTIFIKATORER

Kildehenvisning

MV3 (Cytion-katalognummer 305495)

NCBI-skattenummer	9606
Cellosaurus	CVCL_W280

Cytion GmbH
Nikola-Tesla-Str. 3
69124 Heidelberg
Tel: +49 (0)6221 405780
info@cytion.com
cytion.com

Registered office Heidelberg
VAT ID: DE283292917
Local court Mannheim - HRB 714394
CEO / Geschäftsführer: Jonathan Steubing

Banking information
Sparkasse Heidelberg
IBAN: DE35 6725 0020 0009 2076 86
BIC: SOLADES1HDB

HÅNDTERING OG KULTUR

Næringsmedium

RPMI 1640, m: 2,0 mM stabil glutamin, m: 2,0 g/L NaHCO3 (Cytion artikkelnummer 820700a)

Inkubasjonsatmosfære	37 °C, 5 %CO2, befuktet atmosfære.

Kosttilskudd

Suppler mediet med 10 % FBS

Dissosiasjonsmiddel	Accutase

Subkultivering

Fjern det gamle mediet fra de adherente cellene, og vask dem med PBS uten kalsium og magnesium. Bruk 3-5 ml PBS for T25-kolber og 5-10 ml for T75-kolber. Dekk deretter cellene helt med Accutase, med 1-2 ml for T25-kolber og 2,5 ml for T75-kolber. La cellene inkubere i romtemperatur i 8-10 minutter for å løsne dem. Etter inkubasjon blandes cellene forsiktig med 10 ml medium for å resuspendere dem, og sentrifuger deretter ved 300xg i 3 minutter. Kast supernatanten, resuspender cellene i nytt medium, og overfør dem til nye kolber som allerede inneholder nytt medium.

Tining og dyrking

Confirm that the vial remains deeply frozen upon delivery, as cells are shipped on dry ice to maintain optimal temperatures during transit. Upon receipt, either store the cryovial immediately at temperatures below -150°C to ensure the preservation of cellular integrity, or proceed to step 3 if immediate culturing is required.
For immediate culturing, swiftly thaw the vial by immersing it in a 37°C water bath with clean water and an antimicrobial agent, agitating gently for 40-60 seconds until a small ice clump remains.
Perform all subsequent steps under sterile conditions in a flow hood, disinfecting the cryovial with 70% ethanol before opening.
Carefully open the disinfected vial and transfer the cell suspension into a 15 ml centrifuge tube containing 8 ml of room-temperature culture medium, mixing gently.
Centrifuge the mixture at 300 x g for 3 minutes to separate the cells and carefully discard the supernatant containing residual freezing medium.
Gently resuspend the cell pellet in 10 ml of fresh culture medium. For adherent cells, divide the suspension between two T25 culture flasks; for suspension cultures, transfer all the medium into one T25 flask to promote effective cell interaction and growth.
Adhere to established subculture protocols for continued growth and maintenance of the cell line, ensuring reliable experimental outcomes.

KVALITETSKONTROLL OG KRYOKONSERVERING

Sterilitet

Mykoplasma-kontaminering utelukkes ved hjelp av både PCR-baserte analyser og luminescensbaserte metoder for påvisning av mykoplasma.
For å sikre at det ikke finnes bakterie-, sopp- eller gjærkontaminering, blir cellekulturene inspisert visuelt hver dag.

Frysemedium	Som kryopreserveringsmedium bruker vi komplett vekstmedium (inkludert FBS) + 10 % DMSO for tilstrekkelig levedyktighet etter opptining, eller CM-1 (Cytion-katalognummer 800100), som inneholder optimaliserte osmobeskyttende midler og metabolske stabilisatorer for å øke utvinningen og redusere kryoindusert stress.

Oppbevaringsbetingelser

For langtidsoppbevaring plasseres hetteglassene i flytende nitrogen i dampfase ved ca. -150 til -196 °C. Lagring ved -80 °C er kun akseptabelt som et kort mellomtrinn før overføring til flytende nitrogen.

Fraktvilkår

Kryopreserverte cellelinjer sendes på tørris i validert, isolert emballasje med tilstrekkelig kjølemiddel til å opprettholde en temperatur på ca. -78 °C under hele transporten. Ved mottak skal beholderen inspiseres umiddelbart, og hetteglassene skal straks overføres til egnet lagringsplass.

DONOR

Donorens alder	76 år
Etnisitet	Uspesifisert

JURIDISK OG SIKKERHET

Sikkerhetsregler

Når du planlegger å oppbevare et kryovial i flytende nitrogen for senere tining, er det obligatorisk å følge strenge sikkerhetstiltak. Det er viktig å bruke egnede vernehansker og -klær, og det er påbudt å bruke ansiktsmaske eller vernebriller under overføring av frosne prøver til eller fra tanken med flytende nitrogen. Dette er for å redusere risikoen for skader som følge av potensielle kryovæskeeksplosjoner ved fjerning, noe som kan føre til at skarpe fragmenter slynges ut.

Garanti

Hos Cytion står vi bak kvaliteten og levedyktigheten til produktene våre.
Vi garanterer at cellene våre vil være levedyktige ved starten av dyrkingen i 60 dager etter at de er sendt fra våre anlegg.
Vi forsikrer at alle materialer er i samsvar med spesifikasjonene som er beskrevet i analysesertifikatet og/eller produktarket
For fullstendig informasjon, se vår <a href=""/Who-we-are/Warranty/"" hreflang=""x-default"">Garantierklæring

Avtale om materialoverføring kreves	Yes