SHP-77

305498

ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ

Описание

Клетъчната линия SHP-77 е модел на човешки дребноклетъчен белодробен карцином (ДКБК). Тя е получена от първичен тумор на белия дроб и се използва широко в изследванията на рака, особено за проучвания, насочени към биологията на белодробния рак и разработването на лекарства. Клетките SHP-77 показват класическите характеристики на SCLC, включително бърз растеж и висок туморен потенциал в ксенографски модели. Тази клетъчна линия е известна със способността си да се размножава в среди за култивиране, допълнени със серум, и е използвана в различни експериментални постановки, като например изследвания на онкогенни сигнални пътища и терапевтичен отговор към химиотерапевтични агенти.
Клетките SHP-77 са част от Енциклопедията на раковите клетъчни линии (CCLE) - ресурс, който позволява на изследователите да съпоставят генетичните профили с чувствителността към лекарства. Геномното профилиране на SHP-77 разкрива мутации и промени в критични онкогени и туморни супресори, предоставяйки платформа за изучаване на молекулярните механизми, лежащи в основата на патогенезата на SCLC. Клетъчната линия е включена и в проучвания за скрининг на лекарства, което дава представа за фармакологичната ѝ уязвимост и подпомага идентифицирането на съединения с терапевтичен потенциал за рак на белия дроб.

Тъкан	Бял дроб, ляв горен лоб
Заболяване	дребноклетъчен карцином

Приложения

3D клетъчна култура, Изследване на рака

Синоними

- SHP77
- Shadyside Hospital Pittsburgh-77

КЛАСИФИКАЦИЯ

Организъм	Човек
Секс	Мъж
Свойства, свързани с растежа	Адхезивен и суспензионен
Ниво на биологична безопасност	1

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Морфология	Кръгли клетки
Тип клетка	Епителни клетки
Туморогенен	Да; Да, клетките образуват тумори в атимни голи мишки и обикновено растат като ограничени възли без данни за метастази
Време за удвояване	85 часа

ИДЕНТИФИКАТОРИ

Източник

SHP-77 (каталожен номер 305498 на Cytion)

Cytion GmbH
Nikola-Tesla-Str. 3
69124 Heidelberg
Tel: +49 (0)6221 405780
info@cytion.com
cytion.com

Registered office Heidelberg
VAT ID: DE283292917
Local court Mannheim - HRB 714394
CEO / Geschäftsführer: Jonathan Steubing

Banking information
Sparkasse Heidelberg
IBAN: DE35 6725 0020 0009 2076 86
BIC: SOLADES1HDB

Данъчен идентификационен номер в NCBI	9606
Целозавър	CVCL_1693

ПРОЯВА И ПРЕДРАЗПОЛОЖЕНОСТ

Експресия на антигена

Кръвна група O; Rh+; CD56; CD57 (HNK-1,Leu-7)

Мутационен профил

Мутация: ABL1, проста, p.Val1128Glu (c.3383T>A), зигозитет=хетерозиготен; Мутация: KRAS, проста, p.Gly12Val (c.35G>T), хомозигота; Мутация: RAC1, проста, p.Tyr32Cys (c.95A>G), хетерозиготна; Мутация: TP53, проста, p.Cys176Trp (c.528C>G), хомозиготна

ОБРАБОТКА И ОТГЛЕЖДАНЕ

Хранителна среда

RPMI 1640, w: 2,0 mM стабилен глутамин, w: 2,0 g/L NaHCO3 (номер на статията в Cytion 820700a)

Атмосфера за инкубация	37°C, 5%CO2, овлажнена атмосфера.

Добавки

Допълнете средата с 10% FBS

Обновяване на течността	2 до 3 пъти седмично

Размразяване и култивиране

Confirm that the vial remains deeply frozen upon delivery, as cells are shipped on dry ice to maintain optimal temperatures during transit.
Upon receipt, either store the cryovial immediately at temperatures below -150°C to ensure the preservation of cellular integrity, or proceed to step 3 if immediate culturing is required.
For immediate culturing, swiftly thaw the vial by immersing it in a 37°C water bath with clean water and an antimicrobial agent, agitating gently for 40-60 seconds until a small ice clump remains.
Perform all subsequent steps under sterile conditions in a flow hood, disinfecting the cryovial with 70% ethanol before opening.
Carefully open the disinfected vial and transfer the cell suspension into a 15 ml centrifuge tube containing 8 ml of room-temperature culture medium, mixing gently.
Centrifuge the mixture at 300 x g for 3 minutes to separate the cells and carefully discard the supernatant containing residual freezing medium.
Gently resuspend the cell pellet in 10 ml of fresh culture medium. For adherent cells, divide the suspension between two T25 culture flasks; for suspension cultures, transfer all the medium into one T25 flask to promote effective cell interaction and growth.
Adhere to established subculture protocols for continued growth and maintenance of the cell line, ensuring reliable experimental outcomes.

КОНТРОЛ НА КАЧЕСТВОТО И КРИОКОНСЕРВАЦИЯ

Стерилност

Замърсяването с микоплазма се изключва както чрез PCR-базирани анализи, така и чрез луминесцентни методи за откриване на микоплазма.
За да се гарантира, че няма бактериално, гъбично или дрождево замърсяване, клетъчните култури се подлагат на ежедневни визуални проверки.

Среда за замразяване	Като среда за криоконсервация използваме пълна среда за растеж (включително FBS) + 10% DMSO за адекватна жизнеспособност след размразяване или CM-1 (каталожен номер 800100 на Cytion), която включва оптимизирани осмопротектори и метаболитни стабилизатори за подобряване на възстановяването и намаляване на криоиндуцирания стрес.

Условия за съхранение

За дълготрайно съхранение поставете флаконите в течен азот в парна фаза при температура около -150 до -196 °C. Съхранението при -80 °C е приемливо само като кратък междинен етап преди прехвърлянето в течен азот.

Условия за доставка

Криоконсервираните клетъчни линии се транспортират върху сух лед в утвърдени, изолирани опаковки с достатъчно хладилен агент, за да се поддържа приблизително -78 °C по време на транспортирането. При получаването незабавно прегледайте опаковката и незабавно прехвърлете флаконите за подходящо съхранение.

ДАРИТЕЛ

Възраст на донора	54 години
Етническа принадлежност	Кавказки

ПРАВНИ ВЪПРОСИ И БЕЗОПАСНОСТ

Мерки за безопасност

Когато планирате да съхранявате криопрепарат в течен азот за бъдещо размразяване, е задължително да спазвате строги мерки за безопасност. Подходящите защитни ръкавици и облекло са от съществено значение, а по време на прехвърлянето на замразени проби към или от резервоара с течен азот е необходимо да се използва маска за лице или предпазни очила. Това се прави, за да се намали рискът от нараняване от потенциални експлозии на криовиолите при изваждането им, които могат да доведат до изхвърляне на остри фрагменти.

Гаранция

Ние в Cytion заставаме зад качеството и жизнеспособността на нашите продукти.
Гарантираме, че нашите клетки ще бъдат жизнеспособни в началото на култивирането в продължение на 60 дни след изпращането им от нашите съоръжения.
Гарантираме, че всички материали отговарят на спецификациите, описани в сертификата за анализ и/или продуктовата листа
За пълни подробности, моля, направете справка с нашата <a href=""/Кои сме ние/Гаранция/"" hreflang=""x-default"">Гаранционна декларация

Необходимо е споразумение за прехвърляне на материали	Yes