SHP-77

305498

YLEISTÄ TIETOA

Kuvaus

SHP-77-solulinja on ihmisen pienisoluisen keuhkosyövän (SCLC) malli. Se on peräisin primaarisesta keuhkokasvaimesta, ja sitä käytetään laajalti syöpätutkimuksessa, erityisesti keuhkosyövän biologiaan ja lääkekehitykseen keskittyvissä tutkimuksissa. SHP-77-soluilla on SCLC:n klassiset piirteet, kuten nopea kasvu ja suuri kasvainpotentiaali ksenograft-malleissa. Tämä solulinja on tunnettu kyvystään lisääntyä seerumilla täydennetyssä elatusaineessa, ja sitä on hyödynnetty erilaisissa koejärjestelyissä, kuten onkogeenisten signaalireittien ja terapeuttisen vasteen tutkimisessa kemoterapeuttisille aineille.
SHP-77-solut ovat osa Cancer Cell Line Encyclopediaa (CCLE), joka on resurssi, jonka avulla tutkijat voivat korreloida geneettisiä profiileja lääkeherkkyyden kanssa. SHP-77-solujen genomiprofiilien määritys on paljastanut mutaatioita ja muutoksia kriittisissä onkogeeneissä ja kasvainsuppressoreissa, mikä tarjoaa alustan SCLC:n patogeneesin taustalla olevien molekyylimekanismien tutkimiseen. Solulinja on myös otettu mukaan lääkeaineiden seulontatutkimuksiin, mikä on antanut tietoa sen farmakologisista haavoittuvuuksista ja auttanut tunnistamaan yhdisteitä, joilla on terapeuttista potentiaalia keuhkosyöpään.

Kudos	Keuhko, vasen ylälohko
Sairaus	pienisoluinen karsinooma

Sovellukset

3D-soluviljely, Syöpätutkimus

Synonyymit

- SHP77
- Shadyside Hospital Pittsburgh-77

LUOKITTELU

Organismi	Ihminen
Sukupuoli	Mies
Kasvuominaisuudet	Adheesio ja suspensio
Bioturvallisuustaso	1

OMINAISUUDET

Morfologia	Pyöreät kennot
Solutyyppi	Epiteelisolut
Kasvaimia aiheuttava	Kyllä; Kyllä, solut muodostavat kasvaimia athymic nude-hiirissä, ja ne kasvavat yleensä rajattuina kyhmyinä ilman merkkejä etäpesäkkeistä
Kaksinkertaistumisaika	85 tuntia

TUNNISTEET

Lähdeviite

SHP-77 (Cytionin luettelonumero 305498)

NCBI-verotunnus	9606

Cytion GmbH
Nikola-Tesla-Str. 3
69124 Heidelberg
Tel: +49 (0)6221 405780
info@cytion.com
cytion.com

Registered office Heidelberg
VAT ID: DE283292917
Local court Mannheim - HRB 714394
CEO / Geschäftsführer: Jonathan Steubing

Banking information
Sparkasse Heidelberg
IBAN: DE35 6725 0020 0009 2076 86
BIC: SOLADES1HDB

Cellosaurus	CVCL_1693

ILMENTYMINEN JA ALTTIUS

Antigeenin ilmentyminen

Veriryhmä O; Rh +; CD56; CD57 (HNK-1,Leu-7)

Mutaatioprofiili

Mutaatio: Val1128Glu (c.3383T>A), Zygosity=Heterozygootti; Mutaatio: ABL1, Simple, p.Val1128Glu (c.3383T>A), Zygosity=Heterozygootti; Mutaatio: ABL1, Simple, p.Val1128Glu (c.3383T>A), Zygosity=Heterozygootti: KRAS, Simple, p.Gly12Val (c.35G>T), Homozygous; Mutation: RAC1, yksinkertainen, p.Tyr32Cys (c.95A>G), heterotsygoottinen; Mutaatio: RAC1, yksinkertainen, p.Tyr32Cys (c.95A>G), heterotsygoottinen; Mutaatio: RAC1, yksinkertainen, p.Tyr32Cys (c.95A>G), heterotsygoottinen: TP53, yksinkertainen, p.Cys176Trp (c.528C>G), homotsygoottinen

KÄSITTELY JA VILJELY

Viljelyalusta

RPMI 1640, w: 2,0 mM stabiilia glutamiinia, w: 2,0 g/L NaHCO3 (Cytionin artikkelinumero 820700a)

Inkubaatioilma	37 °C, 5 %CO2, kostutettu ilmakehä.

Ravintolisät

Täydennetään elatusainetta 10 %:lla FBS:llä

Nesteen uusiminen	2-3 kertaa viikossa

Sulatus ja viljely

Confirm that the vial remains deeply frozen upon delivery, as cells are shipped on dry ice to maintain optimal temperatures during transit. Upon receipt, either store the cryovial immediately at temperatures below -150°C to ensure the preservation of cellular integrity, or proceed to step 3 if immediate culturing is required.
For immediate culturing, swiftly thaw the vial by immersing it in a 37°C water bath with clean water and an antimicrobial agent, agitating gently for 40-60 seconds until a small ice clump remains.
Perform all subsequent steps under sterile conditions in a flow hood, disinfecting the cryovial with 70% ethanol before opening.
Carefully open the disinfected vial and transfer the cell suspension into a 15 ml centrifuge tube containing 8 ml of room-temperature culture medium, mixing gently.
Centrifuge the mixture at 300 x g for 3 minutes to separate the cells and carefully discard the supernatant containing residual freezing medium.
Gently resuspend the cell pellet in 10 ml of fresh culture medium. For adherent cells, divide the suspension between two T25 culture flasks; for suspension cultures, transfer all the medium into one T25 flask to promote effective cell interaction and growth.
Adhere to established subculture protocols for continued growth and maintenance of the cell line, ensuring reliable experimental outcomes.

LAADUNVALVONTA JA KRYOSÄILYTYS

Hedelmättömyys

Mykoplasmakontaminaatio suljetaan pois sekä PCR-pohjaisilla määrityksillä että luminesenssiin perustuvilla mykoplasman osoitusmenetelmillä.
Bakteeri-, sieni- tai hiivakontaminaation välttämiseksi soluviljelmät tarkastetaan päivittäin silmämääräisesti.

Jäädytysaine	Kryosäilytysmediana käytämme täydellistä kasvualustaa (mukaan lukien FBS) + 10 % DMSO:ta riittävän sulatuksen jälkeisen elinkelpoisuuden varmistamiseksi tai CM-1:tä (Cytionin luettelonumero 800100), joka sisältää optimoituja osmoprotectantteja ja metabolisia stabilisaattoreita, jotka parantavat elpymistä ja vähentävät kryosäilytyksen aiheuttamaa stressiä.

Säilytysolosuhteet

Pitkäaikaissäilytystä varten injektiopullot asetetaan höyryfaasissa olevaan nestemäiseen typpeen noin -150 - -196 °C:een. Säilytys -80 °C:ssa on hyväksyttävää vain lyhyenä välivaiheena ennen siirtoa nestemäiseen typpeen.

Cytion GmbH
Nikola-Tesla-Str. 3
69124 Heidelberg
Tel: +49 (0)6221 405780
info@cytion.com
cytion.com

Registered office Heidelberg
VAT ID: DE283292917
Local court Mannheim - HRB 714394
CEO / Geschäftsführer: Jonathan Steubing

Banking information
Sparkasse Heidelberg
IBAN: DE35 6725 0020 0009 2076 86
BIC: SOLADES1HDB

Toimitusehdot

Kryosäilytetyt solulinjat kuljetetaan kuivajäässä validoidussa, eristetyssä pakkauksessa, jossa on riittävästi kylmäainetta, jotta lämpötila pysyy noin -78 °C:ssa koko kuljetuksen ajan. Pakkaus on tarkastettava välittömästi sen vastaanottamisen jälkeen ja injektiopullot on siirrettävä viipymättä asianmukaiseen varastoon.

LAHJOITTAJA

Luovuttajan ikä	54 vuotta
Etnisyys	Kaukasialainen

OIKEUDELLISET JA TURVALLISUUSASIAT

Turvallisuusohjeet

Kun suunnitellaan kryoputken säilyttämistä nestemäisessä typessä sulatusta varten, on noudatettava tiukkoja turvatoimenpiteitä. Asianmukaiset suojakäsineet ja -vaatteet ovat välttämättömiä, ja kasvonaamarin tai suojalasien käyttö on välttämätöntä siirrettäessä jäädytettyjä näytteitä nestetyppisäiliöön tai siitä pois. Tällä pyritään pienentämään loukkaantumisriskiä, joka aiheutuu kryoputkien mahdollisista räjähdyksistä, jotka voivat aiheuttaa terävien sirpaleiden sinkoutumisen.

Takuu

Me Cytionilla seisomme tuotteidemme laadun ja elinkelpoisuuden takana.
Takaamme, että solumme ovat elinkelpoisia viljelyn alkaessa 60 päivän ajan sen jälkeen, kun ne on lähetetty laitoksestamme.
Vakuutamme, että kaikki materiaalit ovat analyysitodistuksessa ja/tai tuoteselosteessa kuvattujen eritelmien mukaisia
Lisätietoja on <a href=""/Who-we-are/Warranty/"" hreflang=""""x-default"""">Takuulausumassa

Aineiden siirtoa koskeva sopimus vaaditaan	Yes

Cytion GmbH
Nikola-Tesla-Str. 3
69124 Heidelberg
Tel: +49 (0)6221 405780
info@cytion.com
cytion.com

Registered office Heidelberg
VAT ID: DE283292917
Local court Mannheim - HRB 714394
CEO / Geschäftsführer: Jonathan Steubing

Banking information
Sparkasse Heidelberg
IBAN: DE35 6725 0020 0009 2076 86
BIC: SOLADES1HDB