SHP-77

305498

INFORMASI UMUM

Deskripsi

Garis sel SHP-77 adalah model karsinoma paru sel kecil manusia (SCLC). Sel ini berasal dari tumor paru primer dan digunakan secara luas dalam penelitian kanker, terutama untuk penelitian yang berfokus pada biologi kanker paru dan pengembangan obat. Sel SHP-77 menunjukkan karakteristik klasik SCLC, termasuk pertumbuhan yang cepat dan potensi tumorigenik yang tinggi dalam model xenograft. Sel ini dikenal karena kemampuannya untuk berkembang biak dalam media kultur yang disuplementasi dengan serum dan telah digunakan dalam berbagai pengaturan eksperimental, seperti studi jalur pensinyalan onkogenik dan respons terapeutik terhadap agen kemoterapi. Sel SHP-77 adalah bagian dari Cancer Cell Line Encyclopedia (CCLE), sebuah sumber daya yang memungkinkan para peneliti untuk mengkorelasikan profil genetik dengan kepekaan obat. Profil genom SHP-77 telah mengungkapkan mutasi dan perubahan pada onkogen kritis dan penekan tumor, menyediakan platform untuk mempelajari mekanisme molekuler yang mendasari patogenesis SCLC. Garis sel ini juga telah disertakan dalam studi skrining obat, menawarkan wawasan tentang kerentanan farmakologisnya dan membantu dalam identifikasi senyawa dengan potensi terapeutik untuk kanker paru-paru.

Tisu	Paru-paru, lobus kiri atas
Penyakit	karsinoma sel kecil

Aplikasi

kultur sel 3D, Penelitian kanker

Sinonim

- SHP77
- Shadyside Hospital Pittsburgh-77

KLASIFIKASI

Organisme	Manusia
Seks	Laki-laki
Sifat-sifat pertumbuhan	Adhesi dan suspensi
Tingkat keamanan hayati	1

KARAKTERISTIK

Morfologi	Sel bulat
Jenis sel	Sel epitel
Tumorigenik	Ya; Ya, sel-sel membentuk tumor pada tikus telanjang athymic, dan biasanya tumbuh sebagai nodul berbatas tanpa bukti metastasis
Waktu penggandaan	85 jam

PENGIDENTIFIKASI

Referensi

SHP-77 (Nomor katalog Cytion 305498)

Nomor Identifikasi Pajak NCBI	9606

Cytion GmbH
Nikola-Tesla-Str. 3
69124 Heidelberg
Tel: +49 (0)6221 405780
info@cytion.com
cytion.com

Registered office Heidelberg
VAT ID: DE283292917
Local court Mannheim - HRB 714394
CEO / Geschäftsführer: Jonathan Steubing

Banking information
Sparkasse Heidelberg
IBAN: DE35 6725 0020 0009 2076 86
BIC: SOLADES1HDB

Cellosaurus	CVCL_1693

EKSPRESI DAN KERENTANAN

Ekspresi antigen

Golongan Darah O; Rh +; CD56; CD57 (HNK-1, Leu-7)

Profil mutasi

Mutasi: ABL1, Sederhana, p.Val1128Glu (c.3383T>A), Zigositas = Heterozigot; Mutasi: KRAS, Sederhana, p.Gly12Val (c.35G>T), Homozigot; Mutasi: RAC1, Sederhana, p.Tyr32Cys (c.95A>G), Heterozigot; Mutasi: TP53, Sederhana, p.Cys176Trp (c.528C>G), Homozigot

PENANGANAN DAN BUDIDAYA

Media kultur

RPMI 1640, w: 2,0 mM Glutamin stabil, w: 2,0 g/L NaHCO3 (Nomor artikel Cytion 820700a)

Suasana inkubasi	37°C, 5%CO2, atmosfer yang dilembabkan.

Suplemen

Tambahkan media dengan 10% FBS

Pergantian cairan	2 hingga 3 kali per minggu

Pencairan dan pembiakan

Confirm that the vial remains deeply frozen upon delivery, as cells are shipped on dry ice to maintain optimal temperatures during transit.
Upon receipt, either store the cryovial immediately at temperatures below -150°C to ensure the preservation of cellular integrity, or proceed to step 3 if immediate culturing is required.
For immediate culturing, swiftly thaw the vial by immersing it in a 37°C water bath with clean water and an antimicrobial agent, agitating gently for 40-60 seconds until a small ice clump remains.
Perform all subsequent steps under sterile conditions in a flow hood, disinfecting the cryovial with 70% ethanol before opening.
Carefully open the disinfected vial and transfer the cell suspension into a 15 ml centrifuge tube containing 8 ml of room-temperature culture medium, mixing gently.
Centrifuge the mixture at 300 x g for 3 minutes to separate the cells and carefully discard the supernatant containing residual freezing medium.
Gently resuspend the cell pellet in 10 ml of fresh culture medium. For adherent cells, divide the suspension between two T25 culture flasks; for suspension cultures, transfer all the medium into one T25 flask to promote effective cell interaction and growth.
Adhere to established subculture protocols for continued growth and maintenance of the cell line, ensuring reliable experimental outcomes.

PENGENDALIAN MUTU DAN KRIOPRESERVASI

Kemandulan

Kontaminasi mikoplasma disingkirkan dengan menggunakan tes berbasis PCR dan metode deteksi mikoplasma berbasis pendaran.
Untuk memastikan tidak ada kontaminasi bakteri, jamur, atau ragi, kultur sel menjalani inspeksi visual setiap hari.

Media pembekuan	Sebagai media kriopreservasi, kami menggunakan media pertumbuhan lengkap (termasuk FBS) + 10% DMSO untuk viabilitas pasca-pencairan yang memadai, atau CM-1 (nomor katalog Cytion 800100), yang mencakup osmoprotektan yang dioptimalkan dan penstabil metabolisme untuk meningkatkan pemulihan dan mengurangi stres yang diinduksi kriopreservasi.

Kondisi penyimpanan

Untuk pengawetan jangka panjang, tempatkan botol dalam nitrogen cair fase uap pada suhu sekitar -150 hingga -196 °C. Penyimpanan pada suhu -80 °C hanya dapat diterima sebagai langkah sementara sebelum dipindahkan ke nitrogen cair.

Ketentuan pengiriman

Lini sel kriopreservasi dikirim di atas es kering dalam kemasan terisolasi yang divalidasi dengan refrigeran yang cukup untuk mempertahankan suhu sekitar -78 ° C selama perjalanan. Setelah diterima, segera periksa wadah dan pindahkan botol tanpa penundaan ke tempat penyimpanan yang sesuai.

DONATUR

Usia donor	54 tahun
Etnis	Kaukasia

HUKUM DAN KESELAMATAN

Tindakan pencegahan keselamatan

Ketika berencana menyimpan kriovial dalam nitrogen cair untuk pencairan di masa mendatang, Anda wajib mematuhi langkah-langkah keamanan yang ketat. Sarung tangan dan pakaian pelindung yang tepat sangat penting, dan penggunaan masker wajah atau kacamata pengaman diperlukan selama pemindahan sampel beku ke atau dari tangki nitrogen cair. Hal ini untuk mengurangi risiko cedera akibat potensi ledakan cryovial pada saat pemindahan, yang dapat mengakibatkan proyeksi fragmen tajam.

Garansi

Di Cytion, kami mendukung kualitas dan kelangsungan hidup produk kami.
Kami menjamin bahwa sel kami akan dapat bertahan hidup pada awal kultur selama 60 hari setelah pengiriman dari fasilitas kami.
Kami menjamin bahwa semua bahan sesuai dengan spesifikasi yang dijelaskan dalam Sertifikat Analisis dan / atau Lembar Produk
Untuk detail lengkap, silakan merujuk ke <a href=""/Siapa-kami-Garansi/Garansi/"" hreflang=""x-default"">Pernyataan Jaminan kami

Diperlukan Perjanjian Transfer Material	Yes