SHP-77

305498

INFORMAZIONI GENERALI

Descrizione

La linea cellulare SHP-77 è un modello di carcinoma polmonare umano a piccole cellule (SCLC). È stata derivata da un tumore polmonare primario ed è ampiamente utilizzata nella ricerca sul cancro, in particolare per studi incentrati sulla biologia del tumore polmonare e sullo sviluppo di farmaci. Le cellule SHP-77 presentano le caratteristiche classiche del SCLC, tra cui una crescita rapida e un elevato potenziale tumorigenico nei modelli di xenotrapianto. Questa linea cellulare è nota per la sua capacità di proliferare in terreni di coltura addizionati di siero ed è stata utilizzata in vari setup sperimentali, come gli studi sulle vie di segnalazione oncogenica e sulla risposta terapeutica agli agenti chemioterapici.
Le cellule SHP-77 fanno parte della Cancer Cell Line Encyclopedia (CCLE), una risorsa che consente ai ricercatori di correlare i profili genetici con la sensibilità ai farmaci. Il profilo genomico di SHP-77 ha rivelato mutazioni e alterazioni in oncogeni e soppressori tumorali critici, fornendo una piattaforma per studiare i meccanismi molecolari alla base della patogenesi del SCLC. La linea cellulare è stata anche inclusa in studi di screening farmacologico, offrendo approfondimenti sulle sue vulnerabilità farmacologiche e contribuendo all'identificazione di composti con potenziale terapeutico per il cancro del polmone.

Tessuto	Polmone, lobo superiore sinistro
Malattia	carcinoma a piccole cellule

Applicazioni

coltura cellulare 3D, ricerca sul cancro

Sinonimi

- SHP77
- Shadyside Hospital Pittsburgh-77

CLASSIFICAZIONE

Organismo	Umano
Sesso	Maschio
Proprietà di crescita	Aderente e in sospensione
Livello di biosicurezza	1

CARATTERISTICHE

Morfologia	Celle rotonde
Tipo di cellula	Cellule epiteliali
Tumorigenico	Sì; sì, le cellule formano tumori in topi nudi atimici, e di solito crescono come noduli circoscritti senza evidenza di metastasi
Tempo di raddoppio	85 ore

IDENTIFICATORI

Riferimento bibliografico

SHP-77 (numero di catalogo Cytion 305498)

Cytion GmbH
Nikola-Tesla-Str. 3
69124 Heidelberg
Tel: +49 (0)6221 405780
info@cytion.com
cytion.com

Registered office Heidelberg
VAT ID: DE283292917
Local court Mannheim - HRB 714394
CEO / Geschäftsführer: Jonathan Steubing

Banking information
Sparkasse Heidelberg
IBAN: DE35 6725 0020 0009 2076 86
BIC: SOLADES1HDB

Codice fiscale NCBI	9606
Cellosaurus	CVCL_1693

ESPRESSIONE E SUSCETTIBILITÀ

Espressione dell'antigene

Gruppo sanguigno O; Rh +; CD56; CD57 (HNK-1,Leu-7)

Profilo mutazionale

Mutazione: ABL1, semplice, p.Val1128Glu (c.3383T>A), Zigosità=Eterozigote; Mutazione: KRAS, semplice, p.Gly12Val (c.35G>T), omozigote; Mutazione: RAC1, semplice, p.Tyr32Cys (c.95A>G), eterozigote; Mutazione: TP53, Semplice, p.Cys176Trp (c.528C>G), Omozigote

MANIPOLAZIONE E COLTURA

Terreno di coltura

RPMI 1640, w: 2,0 mM di glutammina stabile, w: 2,0 g/L di NaHCO3 (articolo Cytion numero 820700a)

Atmosfera di incubazione	37°C, 5%CO2, atmosfera umidificata.

Integratori

Integrare il terreno di coltura con il 10% di FBS

Rinnovo dei fluidi	da 2 a 3 volte alla settimana

Scongelamento e coltura

Confirm that the vial remains deeply frozen upon delivery, as cells are shipped on dry ice to maintain optimal temperatures during transit. Upon receipt, either store the cryovial immediately at temperatures below -150°C to ensure the preservation of cellular integrity, or proceed to step 3 if immediate culturing is required.
For immediate culturing, swiftly thaw the vial by immersing it in a 37°C water bath with clean water and an antimicrobial agent, agitating gently for 40-60 seconds until a small ice clump remains.
Perform all subsequent steps under sterile conditions in a flow hood, disinfecting the cryovial with 70% ethanol before opening.
Carefully open the disinfected vial and transfer the cell suspension into a 15 ml centrifuge tube containing 8 ml of room-temperature culture medium, mixing gently.
Centrifuge the mixture at 300 x g for 3 minutes to separate the cells and carefully discard the supernatant containing residual freezing medium.
Gently resuspend the cell pellet in 10 ml of fresh culture medium. For adherent cells, divide the suspension between two T25 culture flasks; for suspension cultures, transfer all the medium into one T25 flask to promote effective cell interaction and growth.
Adhere to established subculture protocols for continued growth and maintenance of the cell line, ensuring reliable experimental outcomes.

CONTROLLO DI QUALITÀ E CRIOCONSERVAZIONE

Sterilità

La contaminazione da micoplasma viene esclusa utilizzando sia saggi basati sulla PCR sia metodi di rilevamento del micoplasma basati sulla luminescenza.
Per garantire l'assenza di contaminazione batterica, fungina o da lieviti, le colture cellulari sono sottoposte a ispezioni visive quotidiane.

Terreno di coltura congelato	Come terreno di crioconservazione, utilizziamo un terreno di crescita completo (incluso FBS) + 10% DMSO per un'adeguata vitalità post-scongelamento, o CM-1 (numero di catalogo Cytion 800100), che include osmoprotettori e stabilizzatori metabolici ottimizzati per migliorare il recupero e ridurre lo stress crio-indotto.

Condizioni di conservazione

Per la conservazione a lungo termine, porre le fiale in azoto liquido in fase vapore a una temperatura compresa tra -150 e -196 °C circa. La conservazione a -80 °C è accettabile solo come breve fase intermedia prima del trasferimento in azoto liquido.

Condizioni di spedizione

Le linee cellulari crioconservate vengono spedite su ghiaccio secco in confezioni isolate e convalidate, con una quantità di refrigerante sufficiente a mantenere circa -78 °C durante il trasporto. Al ricevimento, ispezionare immediatamente il contenitore e trasferire immediatamente le fiale in un luogo di conservazione appropriato.

DONATORE

Età dei donatori	54 anni
Etnia	Caucasico

ASPETTI LEGALI E DI SICUREZZA

Misure di sicurezza

Quando si prevede di conservare una crioviale in azoto liquido per un futuro scongelamento, è obbligatorio attenersi a rigorose misure di sicurezza. Guanti e indumenti protettivi appropriati sono essenziali e l'uso di una maschera facciale o di occhiali di sicurezza è richiesto durante il trasferimento dei campioni congelati da o verso il serbatoio di azoto liquido. Questo per ridurre il rischio di lesioni dovute a potenziali esplosioni di crioviali al momento della rimozione, che possono provocare la proiezione di frammenti taglienti.

Garanzia

Noi di Cytion garantiamo la qualità e la vitalità dei nostri prodotti.
Garantiamo che le nostre cellule saranno vitali all'inizio della coltura per 60 giorni dopo la spedizione dai nostri stabilimenti.
Assicuriamo che tutti i materiali sono conformi alle specifiche descritte nel Certificato di Analisi e/o nella Scheda Prodotto
Per tutti i dettagli, consultare la nostra <a href=""/Chi-siamo/Garanzia/"" hreflang=""x-default"">Dichiarazione di Garanzia

È richiesto un accordo di trasferimento di materiale	Yes