SHP-77

305498

ALLMÄN INFORMATION

Beskrivning

SHP-77-cellinjen är en modell för småcellig lungcancer (SCLC) hos människa. Den härstammar från en primär lungtumör och används flitigt inom cancerforskningen, framför allt för studier inriktade på lungcancerbiologi och läkemedelsutveckling. SHP-77-celler uppvisar de klassiska egenskaperna hos SCLC, inklusive snabb tillväxt och hög tumörframkallande potential i xenograftmodeller. Denna cellinje är känd för sin förmåga att föröka sig i serumkompletterade odlingsmedier och har använts i olika experimentella uppställningar, till exempel studier av onkogena signalvägar och terapeutisk respons på kemoterapeutiska medel.
SHP-77-celler ingår i Cancer Cell Line Encyclopedia (CCLE), en resurs som gör det möjligt för forskare att korrelera genetiska profiler med läkemedelskänslighet. Genomisk profilering av SHP-77 har avslöjat mutationer och förändringar i kritiska onkogener och tumörsuppressorer, vilket ger en plattform för att studera de molekylära mekanismer som ligger bakom patogenesen vid SCLC. Cellinjen har också ingått i läkemedelsscreeningstudier, vilket har gett insikter om dess farmakologiska sårbarhet och bidragit till identifieringen av substanser med terapeutisk potential för lungcancer.

Vävnad	Lungan, vänster övre lob
Sjukdom	småcellig karcinom

Ansökningar

3D-cellodling, Cancerforskning

Synonymer

- SHP77
- Shadyside Hospital Pittsburgh-77

KLASSIFICERING

Organism	Människa
Kön	Man
Tillväxtegenskaper	Adhärens och suspension
Biosäkerhetsnivå	1

EGENSKAPER

Morfologi	Runda celler
Celltyp	Epiteliala celler
Tumörframkallande	Ja; Ja, cellerna bildar tumörer i athymiska nakenmöss och växer vanligtvis som omskrivna knölar utan tecken på metastaser
Fördubblingstid	85 timmar

IDENTIFIERARE

Källa

SHP-77 (Cytion katalognummer 305498)

NCBI-skattenummer	9606

Cytion GmbH
Nikola-Tesla-Str. 3
69124 Heidelberg
Tel: +49 (0)6221 405780
info@cytion.com
cytion.com

Registered office Heidelberg
VAT ID: DE283292917
Local court Mannheim - HRB 714394
CEO / Geschäftsführer: Jonathan Steubing

Banking information
Sparkasse Heidelberg
IBAN: DE35 6725 0020 0009 2076 86
BIC: SOLADES1HDB

Cellosaurus	CVCL_1693

UTTRYCK OCH MOTTAGLIGHET

Antigenuttryck

Blodgrupp O; Rh +; CD56; CD57 (HNK-1,Leu-7)

Mutationsprofil

Mutation: ABL1, Simple, p.Val1128Glu (c.3383T>A), Zygositet=Heterozygot; Mutation: KRAS, enkel, p.Gly12Val (c.35G>T), homozygot; Mutation: RAC1, Simple, p.Tyr32Cys (c.95A>G), Heterozygot; Mutation: TP53, enkel, p.Cys176Trp (c.528C>G), homozygot

HANTERING OCH ODLING

Odlingsmedium

RPMI 1640, med: 2,0 mM stabilt glutamin, med: 2,0 g/L NaHCO3 (Cytion artikelnummer 820700a)

Inkubationsatmosfär	37°C, 5%CO2, befuktad atmosfär.

Kosttillskott

Komplettera mediet med 10% FBS

Vätskeförnyelse	2 till 3 gånger per vecka

Upptining och odling

Confirm that the vial remains deeply frozen upon delivery, as cells are shipped on dry ice to maintain optimal temperatures during transit.
Upon receipt, either store the cryovial immediately at temperatures below -150°C to ensure the preservation of cellular integrity, or proceed to step 3 if immediate culturing is required.
For immediate culturing, swiftly thaw the vial by immersing it in a 37°C water bath with clean water and an antimicrobial agent, agitating gently for 40-60 seconds until a small ice clump remains.
Perform all subsequent steps under sterile conditions in a flow hood, disinfecting the cryovial with 70% ethanol before opening.
Carefully open the disinfected vial and transfer the cell suspension into a 15 ml centrifuge tube containing 8 ml of room-temperature culture medium, mixing gently.
Centrifuge the mixture at 300 x g for 3 minutes to separate the cells and carefully discard the supernatant containing residual freezing medium.
Gently resuspend the cell pellet in 10 ml of fresh culture medium. For adherent cells, divide the suspension between two T25 culture flasks; for suspension cultures, transfer all the medium into one T25 flask to promote effective cell interaction and growth.
Adhere to established subculture protocols for continued growth and maintenance of the cell line, ensuring reliable experimental outcomes.

KVALITETSKONTROLL OCH KRYOKONSERVERING

Sterilitet

Mykoplasmakontaminering utesluts med hjälp av både PCR-baserade analyser och luminiscensbaserade metoder för mykoplasmadiagnostik. För att säkerställa att det inte finns någon kontaminering av bakterier, svamp eller jäst utsätts cellkulturerna för dagliga visuella inspektioner.

Frysmedel	Som kryokonserveringsmedium använder vi komplett tillväxtmedium (inklusive FBS) + 10% DMSO för adekvat viabilitet efter upptining, eller CM-1 (Cytion katalognummer 800100), som innehåller optimerade osmoprotektanter och metaboliska stabilisatorer för att förbättra återhämtningen och minska kryoinducerad stress.

Förvaringsförhållanden

För långtidsförvaring, placera flaskorna i flytande kväve i ångfas vid ca -150 till -196 °C. Förvaring vid -80 °C är acceptabelt endast som ett kort mellanliggande steg innan överföring till flytande kväve.

Leveransvillkor

Kryopreserverade cellinjer skickas på torris i validerade, isolerade förpackningar med tillräckligt med kylmedel för att hålla cirka -78 °C under hela transporten. Vid mottagandet ska behållaren omedelbart inspekteras och flaskorna utan dröjsmål överföras till lämplig förvaring.

DONATOR

Donatorns ålder	54 år
Etnicitet	Kaukasisk

JURIDISKA FRÅGOR OCH SÄKERHET

Säkerhetsföreskrifter

När man planerar att förvara en kryovial i flytande kväve för framtida upptining är det obligatoriskt att följa strikta säkerhetsåtgärder. Lämpliga skyddshandskar och skyddskläder är nödvändiga, och ansiktsmask eller skyddsglasögon måste användas vid överföring av frysta prover till eller från tanken med flytande kväve. Detta för att minska risken för skador på grund av eventuella explosioner i frysbehållaren vid borttagning, vilket kan leda till att vassa fragment projiceras.

Garanti

På Cytіon står vi bakom våra produkters kvalitet och livskraft.
Vi garanterar att våra celler är livsdugliga vid odlingens början i 60 dagar efter leverans från våra anläggningar.
Vi försäkrar att allt material överensstämmer med de specifikationer som beskrivs i analyscertifikatet och/eller produktbladet
För fullständig information, se vår <a href=""/Who-we-are/Warranty/"" hreflang=""x-default"">Garantiförklaring

Avtal om materialöverföring krävs	Yes