HCC-LM3

305504

معلومات عامة

الوصف

لا سيما نظرًا لقدرته العالية على الانتشار. وقد لعب هذا الخط الخلوي دورًا ،(HCC) نموذجًا راسخًا لدراسة سرطان الخلايا الكبدية HCC-LM3 يُعد خط الخلايا عن دورها في استكشاف HCC-LM3 أساسيًا في الكشف عن الآليات المرتبطة بتكاثر الورم وهجرته ومقاومته للعلاج. كشفت الأبحاث التي أجريت على خلايا يلعب دورًا circMRPS35 استجابات الأدوية والمسارات الجزيئية التي تؤثر على عدوانية السرطان. على سبيل المثال، ثبت أن الحمض النووي الريبي الدائري حيث يعزز تكاثر الخلايا وهجرتها وغزوها ومقاومتها للعلاج الكيميائي، لا سيما للسيسبلاتين. من الناحية الميكانيكية، يعمل HCC-LM3، مسرطنًا في الذي ينظم استقرار نظير الفوسفاتاز والتينسين، Syntaxin 3 (STX3) مما يؤدي إلى زيادة تنظيم microRNA-148a-3p، عن طريق امتصاص circMRPS35 (PTEN) من خلال التوبيقيتين والتحلل.

HCC ترتبط بنمو الورم وبقائه. يُظهر هذا الخط الخلوي، إلى جانب نماذج HCC-LM3 بالإضافة إلى ذلك، حددت الدراسات تغيرات استقلابية مهمة في خلايا أخرى، تغيرات ملحوظة في استقلاب الجلوكوز والدهون، والتي تدعم التكاثر السريع للورم وتُعتبر من السمات المميزة لسرطان الكبد. وقد ألقى البحث الذي استخدم تسلسل الحمض النووي الريبي للخلية الواحدة الضوء على كيفية تأثير التباين الاستقلابي داخل المجموعات الفرعية لخلايا الكبد على التشخيص كانت أساسية لتحديد المؤشرات الحيوية المحتملة والأهداف العلاجية لتحسين HCC-LM3 والنتائج العلاجية. والجدير بالذكر أن تحليلات المسارات الأيضية في الاستراتيجيات السريرية.

الأنسجة	الكبد
المرض	سرطان الخلايا الكبدية لدى البالغين
موقع الانتشار	الرئة

المرادفات

- HCCLM-3
- HCC-LM3
- LM3
- MHCC-LM3
- MHCCLM3

التصنيف

كائن حي	إنسان
الجنس	ذكر
خصائص النمو	الملتزم
مستوى السلامة البيولوجية	2

الخصائص

المورفولوجيا	شبيه بالظهارة
نوع الخلية	الخلايا الظهارية

النمط الكروموسومي

نمط كروموسومي ثلاثي الصبغيات ناقص؛ متوسط عدد الكروموسومات: 55-58

المعرّفات

المرجع

HCC-LM3 (رقم الكتالوج لدى Cytion: 305504)

Cytion GmbH
Nikola-Tesla-Str. 3
69124 Heidelberg
Tel: +49 (0)6221 405780
info@cytion.com
cytion.com

Registered office Heidelberg
VAT ID: DE283292917
Local court Mannheim - HRB 714394
CEO / Geschäftsführer: Jonathan Steubing

Banking information
Sparkasse Heidelberg
IBAN: DE35 6725 0020 0009 2076 86
BIC: SOLADES1HDB

رقم التعريف الضريبي لدى NCBI	9606
سيلوصور	CVCL_6832

التعبير والقابلية للإصابة

التعبير البروتيني

+ألبومين+، سي كيه 8

التعبير عن المستضد

HBsAg-

الجينات المسرطنة

AFP+، P53-، P16+، nm23-

الأنماط الطفريّة

طفرة: BRD7، p.Glu277Glyfs*18 (c.830_831delAG)؛ طفرة: KEAP1، p.Pro445Glnfs*13 (c.1334delC)؛ طفرة: TP53، p.Glu51Ter (c.151G>T)

الفيروسات

فيروس التهاب الكبد B المتحول (HBV)

التعامل مع النباتات وزراعتها

وسط الاستزراع

DMEM، ت: 3.7 جم/لتر (من سايتيون aرقم المادة 820300) ت: 1.0 مليمتر بيروفات الصوديوم، NaHCO3 ت: 4.5 جم/لتر جلوكوز، ت: 4 مليمتر جلوتامين،

بيئة الحضانة	37 درجة مئوية، و5% من ثاني أكسيد الكربون في جو مرطب.

المكملات الغذائية

قم بتزويد الوسط ب 10٪ من ال FBS

كاشف التفكك	أكوتاس

إعادة الاستنبات

استخدم 3-5 مل من T25، الذي يفتقر إلى الكالسيوم والمغنيسيوم. بالنسبة لقوارير PBS قم بإزالة الوسط القديم من الخلايا الملتصقة واغسلها باستخدام PBS، وبالنسبة لقوارير T75، استخدم 5-10 مل. ثم، قم بتغطية الخلايا بالكامل باستخدام أكوتاز، باستخدام 1-2 مل لقوارير T75. دع الخلايا تحتضن في درجة حرارة الغرفة لمدة 8-10 دقائق لفصلها. بعد الحضانة، اخلط الخلايا برفق مع 10 مل من الوسط لإعادة ترسيبها، ثم اطردها مركزيًا بسرعة 300 xg لمدة 3 دقائق. تخلص من المادة الطافية، وأعد غمر الخلايا في وسط جديد وانقلها إلى قوارير جديدة تحتوي بالفعل على وسط جديد.

إذابة الثلج والزراعة

Confirm that the vial remains deeply frozen upon delivery, as cells are shipped on dry ice to maintain optimal temperatures during transit.
Upon receipt, either store the cryovial immediately at temperatures below -150°C to ensure the preservation of cellular integrity, or proceed to step 3 if immediate culturing is required.
For immediate culturing, swiftly thaw the vial by immersing it in a 37°C water bath with clean water and an antimicrobial agent, agitating gently for 40-60 seconds until a small ice clump remains.
Perform all subsequent steps under sterile conditions in a flow hood, disinfecting the cryovial with 70% ethanol before opening.
Carefully open the disinfected vial and transfer the cell suspension into a 15 ml centrifuge tube containing 8 ml of room-temperature culture medium, mixing gently.
Centrifuge the mixture at 300 x g for 3 minutes to separate the cells and carefully discard the supernatant containing residual freezing medium.
Gently resuspend the cell pellet in 10 ml of fresh culture medium. For adherent cells, divide the suspension between two T25 culture flasks; for suspension cultures, transfer all the medium into one T25 flask to promote effective cell interaction and growth.
Adhere to established subculture protocols for continued growth and maintenance of the cell line, ensuring reliable experimental outcomes.

مراقبة الجودة والحفظ بالتبريد

العقم

وطرق الكشف عن الميكوبلازما القائمة على (PCR) يُستبعد التلوث بالميكوبلازما باستخدام كل من المقايسات القائمة على تفاعل البوليميراز المتسلسل التألق.
ولضمان عدم وجود تلوث بكتيري أو فطري أو خميرة يتم إخضاع مزارع الخلايا للفحص البصري اليومي.

وسط التجميد	من أجل الحفاظ DMSO 10% + (FBS بما في ذلك) كوسيط للحفظ بالتبريد، نستخدم وسط نمو كامل والذي يتضمن مواد حماية ،(رقم Cytion 800100 كتالوج) CM-1 على حيوية كافية بعد ذوبان الجليد أو أسموزموبيروتيكتية ومثبتات أيضية مُحسّنة لتعزيز التعافي وتقليل الإجهاد الناجم عن التبريد.

شروط التخزين

للحفظ طويل الأمد، ضع القوارير في نيتروجين سائل في طور البخار عند درجة حرارة تتراوح بين -150 و -196 درجة مئوية تقريباً. يُقبل التخزين عند درجة حرارة -80 درجة مئوية فقط كخطوة مؤقتة قصيرة قبل النقل إلى النيتروجين السائل.

شروط الشحن

تُشحن خطوط الخلايا المحفوظة بالتبريد على ثلج جاف في عبوات معزولة وموثوقة مع مبرد كافٍ للحفاظ على درجة حرارة -78 درجة مئوية تقريبًا طوال فترة النقل. عند الاستلام، افحص الحاوية على الفور وانقل القوارير دون تأخير إلى المخزن المناسب.

المانح

عمر المتبرع	39 سنة
الأصل العرقي	صيني

الشؤون القانونية والسلامة

احتياطات السلامة

عند التخطيط لتخزين القارورة المبردة في النيتروجين السائل لإذابتها في المستقبل، من الضروري الالتزام بتدابير السلامة الصارمة. من الضروري ارتداء قفازات وملابس واقية مناسبة، كما يلزم استخدام قناع الوجه أو نظارات السلامة أثناء نقل العينات المجمدة من خزان النيتروجين السائل أو إليه. وذلك للتخفيف من خطر الإصابة من الانفجارات المحتملة للنيتروجين المبرد عند الإزالة، والتي يمكن أن تؤدي إلى قذف شظايا حادة.

الضمان

نلتزم في Cytion، في Cytion بجودة منتجاتنا وحيويتها.
نحن نضمن أن تكون خلايانا قابلة للحياة في بداية الاستزراع لمدة 60 يومًا بعد الشحن من منشآتنا.
نؤكد أن جميع المواد مطابقة للمواصفات الموضحة في شهادة التحليل و/أو ورقة المنتج
بيان الضمان<a href=""/Who-we-are/Warranty/"" hreflang=""x-default"">للحصول على التفاصيل الكاملة، يُرجى الرجوع إلى

يلزم إبرام اتفاقية نقل المواد	Yes

Cytion GmbH
Nikola-Tesla-Str. 3
69124 Heidelberg
Tel: +49 (0)6221 405780
info@cytion.com
cytion.com

Registered office Heidelberg
VAT ID: DE283292917
Local court Mannheim - HRB 714394
CEO / Geschäftsführer: Jonathan Steubing

Banking information
Sparkasse Heidelberg
IBAN: DE35 6725 0020 0009 2076 86
BIC: SOLADES1HDB