HCC-LM3

305504

GENERAL INFORMATION

Description

בעיקר בשל הפוטנציאל הגבוה שלו ליצירת גרורות. לקו תאים זה היה מהווה מודל מקובל לחקר קרצינומה הפטוצלולרית (HCC), קו התאים HCC-LM3 תפקיד מכריע בחשיפת מנגנונים הקשורים להתפשטות הגידול, לנדידתו ולעמידותו לטיפול. מחקר על תאי HCC-LM3 ממלא תפקיד אונקוגני ב circMRPS35 המעגלי RNA-לתרופות והמסלולים המולקולריים המשפיעים על אגרסיביות הסרטן. לדוגמה, הוכח כי ה HCC-LM3, microRNA-148a-3p, פועל על ידי ספיגת circMRPS35, ומקדם התרבות תאים, נדידה, פלישה ועמידות לכימותרפיה, במיוחד לציספלטין. מבחינה מכנית באמצעות יוביקוויטינציה ופירוק PTEN (phosphatase and tensin homolog)-המווסת את יציבות ה Syntaxin 3 (STX3), מה שמוביל לעלייה ברגולציה של המתואמים עם צמיחת הגידול והישרדות. קו תאים זה, יחד עם מודלים אחרים של HCC-LM3 בנוסף, מחקרים זיהו שינויים מטבוליים משמעותיים בתאי HCC, מדגים שינויים בולטים במטבוליזם של הגלוקוז והשומנים, התומכים בשגשוג מהיר של הגידול ונחשבים לסימני היכר של סרטן הכבד. מחקרים של תא בודד האיר כיצד ההטרוגניות המטבולית בתוך תת-אוכלוסיות של תאי כבד משפיעה על הפרוגנוזה ועל תוצאות הטיפול. יש RNA המשתמשים ברצף היו חיוניים לזיהוי סמנים ביולוגיים פוטנציאליים ויעדים טיפוליים לשיפור האסטרטגיות הקליניות HCC-LM3-לציין כי ניתוחי מסלולי חילוף החומרים ב.

Tissue	כבד
Disease	קרצינומה הפטוצלולרית במבוגרים
Metastatic site	ריאה

Synonyms

- HCCLM-3
- HCC-LM3
- LM3
- MHCC-LM3
- MHCCLM3

CLASSIFICATION

Organism	Human
Sex	Male
Growth properties	Adherent
Biosafety level	2

CHARACTERISTICS

Morphology	דמוי אפיתל
Cell type	תאי אפיתל

Karyotype

קריוטיפ היפוטריפלואידי; מספר כרומוזומים ממוצע: 55–58

IDENTIFIERS

Citation

HCC-LM3 (מספר קטלוגי של Cytion: 305504)

NCBI TaxID	9606

Cytion GmbH
Nikola-Tesla-Str. 3
69124 Heidelberg
Tel: +49 (0)6221 405780
info@cytion.com
cytion.com

Registered office Heidelberg
VAT ID: DE283292917
Local court Mannheim - HRB 714394
CEO / Geschäftsführer: Jonathan Steubing

Banking information
Sparkasse Heidelberg
IBAN: DE35 6725 0020 0009 2076 86
BIC: SOLADES1HDB

Cellosaurus	CVCL_6832

EXPRESSION AND SUSCEPTIBILITY

Protein expression

חיובי אלבומין חיובי, CK8

Antigen expression

HBsAg-

Oncogenes

AFP+, P53-, P16+, nm23-

Mutational profile

מוטציה: BRD7, p.Glu277Glyfs*18 (c.830_831delAG); מוטציה: KEAP1, p.Pro445Glnfs*13 (c.1334delC); מוטציה: TP53, p.Glu51Ter (c.151G>T)

Viruses

נגיף הפטיטיס: טרנספורמנט B (HBV)

HANDLING AND CULTURE

Culture medium

DMEM, w: 4.5 g/L גלוקוז, w: 4 mM L-גלוטמין, w: 3.7 g/L NaHCO3, w: 1.0 mM נתרן פירובט (מספר קטלוגי Cytion 820300a)

Incubation atmosphere	37°C, 5%CO2, אווירה לחה.

Supplements

10% הוסף לתווך FBS

Dissociation reagent	אקוטאז

Subculturing

השתמש ב-3-5 מ"ל T25, ללא סידן ומגנזיום. עבור בקבוקי PBS-הסר את המדיום הישן מהתאים הדבוקים ושטוף אותם ב PBS, ועבור בקבוקי T75, השאר את T75. ו-2.5 מ"ל עבור בקבוקי T25 תוך שימוש ב-1-2 מ"ל עבור בקבוקי Accutase-השתמש ב-5-10 מ"ל. לאחר מכן, כסה את התאים לחלוטין ב התאים לדגירה בטמפרטורת החדר למשך 8-10 דקות כדי לנתק אותם. לאחר הדגירה, ערבב בעדינות את התאים עם 10 מ"ל של מדיום כדי להחזיר אותם למשך 3 דקות. השלך את הנוזל העליון, החזר את התאים לתמיסה במדיום טרי והעבר אותם לצלחות חדשות xgלתמיסה, ואז סובב בצנטריפוגה ב-300 שכבר מכילות מדיום טרי.

Thawing and culturing

Confirm that the vial remains deeply frozen upon delivery, as cells are shipped on dry ice to maintain optimal temperatures during transit.
Upon receipt, either store the cryovial immediately at temperatures below -150°C to ensure the preservation of cellular integrity, or proceed to step 3 if immediate culturing is required.
For immediate culturing, swiftly thaw the vial by immersing it in a 37°C water bath with clean water and an antimicrobial agent, agitating gently for 40-60 seconds until a small ice clump remains.
Perform all subsequent steps under sterile conditions in a flow hood, disinfecting the cryovial with 70% ethanol before opening.
Carefully open the disinfected vial and transfer the cell suspension into a 15 ml centrifuge tube containing 8 ml of room-temperature culture medium, mixing gently.
Centrifuge the mixture at 300 x g for 3 minutes to separate the cells and carefully discard the supernatant containing residual freezing medium.
Gently resuspend the cell pellet in 10 ml of fresh culture medium. For adherent cells, divide the suspension between two T25 culture flasks; for suspension cultures, transfer all the medium into one T25 flask to promote effective cell interaction and growth.
Adhere to established subculture protocols for continued growth and maintenance of the cell line, ensuring reliable experimental outcomes.

QUALITY CONTROL AND CRYOPRESERVATION

Sterility

ושיטות זיהוי מיקופלסמה מבוססות לומניסצנציה PCR זיהום במיקופלסמה נשלל באמצעות בדיקות מבוססות.
כדי להבטיח שאין זיהום חיידקי, פטרייתי או שמרי, תרבויות התאים עוברות בדיקות ויזואליות יומיות.

Freeze medium	כדי להבטיח 10% DMSO + (FBS כולל) כמדיום לשימור בקירור, אנו משתמשים במדיום גידול מלא הכולל חומרים אוסמו- ,(Cytion 800100 מספר קטלוגי) CM-1 חיוניות נאותה לאחר ההפשרה, או מגנים ומייצבי מטבוליזם משופרים כדי לשפר את ההתאוששות ולהפחית את הלחץ הנגרם מהקפאה.

Storage conditions

לשימור לטווח ארוך, יש להניח את הבקבוקונים בחנקן נוזלי במצב של אדי בטמפרטורה של כ-150 עד 196 מעלות צלזיוס. אחסון בטמפרטורה של 80 מעלות צלזיוס מקובל רק כצעד ביניים קצר לפני העברה לחנקן נוזלי.

Shipping conditions

במהלך -Cשורות תאים שהוקפאו נשלחות בקרח יבש באריזה מאושרת ומבודדת עם כמות מספקת של חומר קירור כדי לשמור על טמפרטורה של כ-78°. ההובלה. עם קבלת המשלוח, יש לבדוק את המכל מיד ולהעביר את הבקבוקונים ללא דיחוי לאחסון מתאים.

DONOR

Donor age	שנים 39
Ethnicity	סינית

LEGAL AND SAFETY

Safety precautions

כאשר מתכננים לאחסן קריוביאל בחנקן נוזלי להפשרה עתידית, חובה להקפיד על אמצעי בטיחות מחמירים. יש להקפיד על שימוש בכפפות ובבגדים מגנים מתאימים, וכן על שימוש במסכת פנים או משקפי מגן בעת העברת דגימות קפואות אל מיכל החנקן הנוזלי או ממנו. זאת כדי להפחית את הסיכון לפציעה כתוצאה מפיצוץ אפשרי של הקריוביאל בעת הוצאתו, העלול לגרום להתזת רסיסים חדים.

Warranty

אנו עומדים מאחורי האיכות והכדאיות של המוצרים שלנו, ב-Cytion.
אנו מבטיחים שתאינו יהיו קיימים בתחילת התרבית למשך
60 יום לאחר המשלוח מהמתקנים שלנו.
אנו מבטיחים שכל החומרים תואמים למפרטים המתוארים
בתעודת הניתוח ו/או בדף המוצר.
לפרטים מלאים, אנא עיינו ב
הצהרת האחריות שלנו<a href=""/Who-we-are/Warranty/"" hreflang=""x-default"">

Material Transfer Agreement required	Yes

Cytion GmbH
Nikola-Tesla-Str. 3
69124 Heidelberg
Tel: +49 (0)6221 405780
info@cytion.com
cytion.com

Registered office Heidelberg
VAT ID: DE283292917
Local court Mannheim - HRB 714394
CEO / Geschäftsführer: Jonathan Steubing

Banking information
Sparkasse Heidelberg
IBAN: DE35 6725 0020 0009 2076 86
BIC: SOLADES1HDB