AKATA

305510

INFORMAZIONI GENERALI

Descrizione

La linea cellulare AKATA, derivata dal linfoma di Burkitt, è un modello ampiamente utilizzato per studiare la latenza e la riattivazione del virus di Epstein-Barr (EBV). L'EBV è un herpesvirus ubiquitario legato a una serie di tumori, tra cui il linfoma di Burkitt, e di solito stabilisce un'infezione latente all'interno delle cellule B. Nelle cellule AKATA, l'EBV è mantenuto in uno stato episomale con un programma di latenza di tipo I, che esprime un insieme limitato di geni virali come EBNA-1, RNA EBER e BamHI-A rightward transcripts (BART). Questa espressione genica limitata consente al virus di persistere nell'ospite senza avviare un ciclo litico completo. Tuttavia, le cellule AKATA possono essere riattivate per entrare nella fase litica, dove il virus si replica attivamente e produce progenie. Questa riattivazione è comunemente indotta attraverso il cross-linking delle immunoglobuline di superficie, il che rende le cellule AKATA uno strumento eccellente per studiare le dinamiche di riattivazione dell'EBV e la regolazione dei geni virali.
La ricerca che utilizza la linea cellulare AKATA ha anche esaminato l'impatto degli agenti chemioterapici sulla riattivazione dell'EBV. Ad esempio, è stato dimostrato che farmaci come l'etoposide e la doxorubicina influenzano la latenza virale. L'etoposide induce l'apoptosi nelle cellule AKATA ma riattiva l'EBV in modo meno efficace rispetto alla doxorubicina, che promuove livelli più elevati di espressione genica litica e di produzione di progenie virale. Inoltre, studi che hanno coinvolto tecniche di editing genico, come CRISPR/Cas9, hanno esplorato il ruolo dei regolatori epigenetici nelle cellule AKATA. Ad esempio, il knockout dell'istone metiltransferasi EZH2 nelle cellule AKATA interrompe il mantenimento della latenza riducendo la trimetilazione dell'istone H3K27, con conseguente aumento dell'espressione dei geni EBV latenti e litici, nonché una maggiore replicazione virale e proliferazione cellulare.
Le cellule AKATA mostrano anche caratteristiche fenotipiche distinte in base alla presenza di EBV, come una maggiore sensibilità agli agenti che inducono l'apoptosi e variazioni nell'espressione dei geni correlati alle vie apoptotiche. Queste differenze rendono le cellule AKATA EBV-positive un modello potente per analizzare l'influenza dell'EBV sulla sopravvivenza delle cellule ospiti, l'espressione genica e il ciclo di vita del virus, in particolare nel contesto dello sviluppo del cancro e di potenziali interventi terapeutici mirati alle neoplasie associate all'EBV.

Tessuto	Sangue
Malattia	Linfoma di Burkitt

Sinonimi

- Akata
- Akata-BL
- Akata BL
- Akata-EC
- Akata-Early Culture

CLASSIFICAZIONE

Organismo	Umano
Sesso	Donna
Proprietà di crescita	Sospensione
Livello di biosicurezza	2

CARATTERISTICHE

Morfologia	Linfoblasto
Tipo di cellula	Cella B

Cytion GmbH
Nikola-Tesla-Str. 3
69124 Heidelberg
Tel: +49 (0)6221 405780
info@cytion.com
cytion.com

Registered office Heidelberg
VAT ID: DE283292917
Local court Mannheim - HRB 714394
CEO / Geschäftsführer: Jonathan Steubing

Banking information
Sparkasse Heidelberg
IBAN: DE35 6725 0020 0009 2076 86
BIC: SOLADES1HDB

IDENTIFICATORI

Riferimento bibliografico

AKATA (numero di catalogo Cytion 305510)

Codice fiscale NCBI	9606
Cellosaurus	CVCL_0148

ESPRESSIONE E SUSCETTIBILITÀ

Virus

Trasformante: EBV

MANIPOLAZIONE E COLTURA

Terreno di coltura

RPMI 1640, w: 2,0 mM di glutammina stabile, w: 2,0 g/L di NaHCO3 (articolo Cytion numero 820700a)

Atmosfera di incubazione	37°C, 5%CO2, atmosfera umidificata.

Integratori

Integrare il terreno di coltura con il 10% di FBS

Subcoltura

Raccogliere le cellule in sospensione in una provetta da 15 ml e lavare delicatamente le cellule aderenti con PBS privo di calcio e magnesio (utilizzare 3-5 ml per le fiasche T25 e 5-10 ml per le fiasche T75). Applicare Accutase (1-2 ml per le beute T25, 2,5 ml per le beute T75) assicurando la copertura completa dello strato cellulare. Lasciare incubare le cellule a temperatura ambiente per 10 minuti. Dopo l'incubazione, unire e centrifugare sia la sospensione che le cellule aderenti. Dopo la centrifugazione, risospendere accuratamente il pellet cellulare e trasferire la sospensione cellulare in nuove fiasche contenenti terreno fresco.

Scongelamento e coltura

Confirm that the vial remains deeply frozen upon delivery, as cells are shipped on dry ice to maintain optimal temperatures during transit.
Upon receipt, either store the cryovial immediately at temperatures below -150°C to ensure the preservation of cellular integrity, or proceed to step 3 if immediate culturing is required.
For immediate culturing, swiftly thaw the vial by immersing it in a 37°C water bath with clean water and an antimicrobial agent, agitating gently for 40-60 seconds until a small ice clump remains.
Perform all subsequent steps under sterile conditions in a flow hood, disinfecting the cryovial with 70% ethanol before opening.
Carefully open the disinfected vial and transfer the cell suspension into a 15 ml centrifuge tube containing 8 ml of room-temperature culture medium, mixing gently.
Centrifuge the mixture at 300 x g for 3 minutes to separate the cells and carefully discard the supernatant containing residual freezing medium.
Gently resuspend the cell pellet in 10 ml of fresh culture medium. For adherent cells, divide the suspension between two T25 culture flasks; for suspension cultures, transfer all the medium into one T25 flask to promote effective cell interaction and growth.
Adhere to established subculture protocols for continued growth and maintenance of the cell line, ensuring reliable experimental outcomes.

CONTROLLO DI QUALITÀ E CRIOCONSERVAZIONE

Sterilità

La contaminazione da micoplasma viene esclusa utilizzando sia saggi basati sulla PCR sia metodi di rilevamento del micoplasma basati sulla luminescenza.
Per garantire l'assenza di contaminazione batterica, fungina o da lieviti, le colture cellulari sono sottoposte a ispezioni visive quotidiane.

Terreno di coltura congelato	Come terreno di crioconservazione, utilizziamo un terreno di crescita completo (incluso FBS) + 10% DMSO per un'adeguata vitalità post-scongelamento, o CM-1 (numero di catalogo Cytion 800100), che include osmoprotettori e stabilizzatori metabolici ottimizzati per migliorare il recupero e ridurre lo stress crio-indotto.

Condizioni di conservazione

Per la conservazione a lungo termine, porre le fiale in azoto liquido in fase vapore a una temperatura compresa tra -150 e -196 °C circa. La conservazione a -80 °C è accettabile solo come breve fase intermedia prima del trasferimento in azoto liquido.

Condizioni di spedizione

Le linee cellulari crioconservate vengono spedite su ghiaccio secco in confezioni isolate e convalidate, con una quantità di refrigerante sufficiente a mantenere circa -78 °C durante il trasporto. Al ricevimento, ispezionare immediatamente il contenitore e trasferire immediatamente le fiale in un luogo di conservazione appropriato.

DONATORE

Età dei donatori	4 anni
Etnia	Giapponese

ASPETTI LEGALI E DI SICUREZZA

Misure di sicurezza

Quando si prevede di conservare una crioviale in azoto liquido per un futuro scongelamento, è obbligatorio attenersi a rigorose misure di sicurezza. Guanti e indumenti protettivi appropriati sono essenziali e l'uso di una maschera facciale o di occhiali di sicurezza è richiesto durante il trasferimento dei campioni congelati da o verso il serbatoio di azoto liquido. Questo per ridurre il rischio di lesioni dovute a potenziali esplosioni di crioviali al momento della rimozione, che possono provocare la proiezione di frammenti taglienti.

Garanzia

Noi di Cytion garantiamo la qualità e la vitalità dei nostri prodotti.
Garantiamo che le nostre cellule saranno vitali all'inizio della coltura per 60 giorni dopo la spedizione dai nostri stabilimenti.
Assicuriamo che tutti i materiali sono conformi alle specifiche descritte nel Certificato di Analisi e/o nella Scheda Prodotto
Per tutti i dettagli, consultare la nostra <a href=""/Chi-siamo/Garanzia/"" hreflang=""x-default"">Dichiarazione di Garanzia

È richiesto un accordo di trasferimento di materiale	Yes