MINO

305513

YLEISTÄ TIETOA

Kuvaus

MINO-solulinja on ihmisestä peräisin oleva malli manttelisolulymfoomasta (MCL), joka on harvinainen ja aggressiivinen B-soluisen non-Hodgkin-lymfooman alatyyppi. Tämä solulinja perustettiin 64-vuotiaasta naispotilaasta, jolla oli pitkälle edennyt MCL. Sille on ominaista sykliini D1:n yliekspressio, joka johtuu kromosomitranslokaatiosta t(11;14)(q13;q32), joka on MCL:n tunnusmerkki. MINO-soluilla on CD5+CD20+CD23-immunofenotyyppi, joka vastaa MCL-diagnoosia, ja niissä on muita geneettisiä muutoksia, kuten hyperdiploidia ja TP53-mutaatio kodonissa 147 (valiini glysiiniksi), jotka voivat vaikuttaa sen patogeneesiin.
MINO-solut kasvavat yksittäisinä soluina tai pieninä rykelminä, ja niillä on MCL:lle tyypillisiä piirteitä, kuten korkea fosforyloidun retinoblastoomaproteiinin (pRB) määrä ja anti-apoptoottisten proteiinien, kuten Bcl-2:n ja Bcl-xL:n, ilmentyminen. Näitä soluja on käytetty MCL:n etenemisen ja hoitoresistenssin taustalla olevien molekyylimekanismien tutkimiseen. Tutkimukset ovat erityisesti osoittaneet, että sykliini D1 edistää solusyklin etenemistä ja apoptoosin välttämistä olemalla vuorovaikutuksessa Baxin kaltaisten pro-apoptoottisten proteiinien kanssa, mikä edistää lymfoomasolujen selviytymistä.
MINO-solulinja on arvokas väline prekliiniseen tutkimukseen, mukaan lukien lääketestaus ja geneettiset tutkimukset. Sitä on käytetty arvioitaessa kohdennettuja hoitoja, jotka estävät sykliini D1:n aktiivisuutta tai häiritsevät MCL:n eloonjäämisen kannalta kriittisiä reittejä, kuten PI3K/Akt- ja Bcl-2-reittejä. Tämä solulinja auttaa edelleen ymmärtämään MCL:n biologiaa ja parantamaan tämän haastavan taudin hoitostrategioita.

Kudos	Perifeerinen veri
Sairaus	Mantelin solulymfooma

Synonyymit

- Mino

LUOKITTELU

Organismi	Ihminen
Sukupuoli	Mies
Kasvuominaisuudet	Jousitus
Bioturvallisuustaso	1

OMINAISUUDET

Morfologia	Lymfoblastien kaltaiset
Solutyyppi	Lymfoblastit

TUNNISTEET

Lähdeviite

MINO (Cytionin luettelonumero 305513)

NCBI-verotunnus	9606
Cellosaurus	CVCL_1872

Cytion GmbH
Nikola-Tesla-Str. 3
69124 Heidelberg
Tel: +49 (0)6221 405780
info@cytion.com
cytion.com

Registered office Heidelberg
VAT ID: DE283292917
Local court Mannheim - HRB 714394
CEO / Geschäftsführer: Jonathan Steubing

Banking information
Sparkasse Heidelberg
IBAN: DE35 6725 0020 0009 2076 86
BIC: SOLADES1HDB

ILMENTYMINEN JA ALTTIUS

Mutaatioprofiili

Mutaatio: CDKN2A, p.Glu88Lys (c.262G>A), homotsygoottinen; Mutaatio: CDKN2A, p.Glu88Lys (c.262G>A), homotsygoottinen; Mutaatio: CDKN2A, p.Glu88Lys (c.262G>A), homotsygoottinen: NRAS, p.Gly13Asp (c.38G>A), heterotsygoottinen; Mutaatio: p.Val147Gly (c.440T>G), homotsygoottinen

KÄSITTELY JA VILJELY

Viljelyalusta

RPMI 1640, w: 2,0 mM stabiilia glutamiinia, w: 2,0 g/L $NaHCO_3$ (Cytionin artikkelinumero 820700a)

Inkubaatioilma	37 °C, 5 %CO_2, kostutettu ilmakehä.

Ravintolisät

Täydennetään elatusainetta 10 % lämpöinaktivoidulla FBS:llä

Kylvötiheys	1 x 10^6 solua/ml

Sulatus ja viljely

Confirm that the vial remains deeply frozen upon delivery, as cells are shipped on dry ice to maintain optimal temperatures during transit.
Upon receipt, either store the cryovial immediately at temperatures below -150°C to ensure the preservation of cellular integrity, or proceed to step 3 if immediate culturing is required.
For immediate culturing, swiftly thaw the vial by immersing it in a 37°C water bath with clean water and an antimicrobial agent, agitating gently for 40-60 seconds until a small ice clump remains.
Perform all subsequent steps under sterile conditions in a flow hood, disinfecting the cryovial with 70% ethanol before opening.
Carefully open the disinfected vial and transfer the cell suspension into a 15 ml centrifuge tube containing 8 ml of room-temperature culture medium, mixing gently.
Centrifuge the mixture at 300 x g for 3 minutes to separate the cells and carefully discard the supernatant containing residual freezing medium.
Gently resuspend the cell pellet in 10 ml of fresh culture medium. For adherent cells, divide the suspension between two T25 culture flasks; for suspension cultures, transfer all the medium into one T25 flask to promote effective cell interaction and growth.
Adhere to established subculture protocols for continued growth and maintenance of the cell line, ensuring reliable experimental outcomes.

LAADUNVALVONTA JA KRYOSÄILYTYS

Hedelmättömyys

Mykoplasmakontaminaatio suljetaan pois sekä PCR-pohjaisilla määrityksillä että luminesenssiin perustuvilla mykoplasman osoitusmenetelmillä.
Bakteeri-, sieni- tai hiivakontaminaation välttämiseksi soluviljelmät tarkastetaan päivittäin silmämääräisesti.

Jäädytysaine	Kryosäilytysmediana käytämme täydellistä kasvualustaa (mukaan lukien FBS) + 10 % DMSO:ta riittävän sulatuksen jälkeisen elinkelpoisuuden varmistamiseksi tai CM-1:tä (Cytionin luettelonumero 800100), joka sisältää optimoituja osmoprotectantteja ja metabolisia stabilisaattoreita, jotka parantavat elpymistä ja vähentävät kryosäilytyksen aiheuttamaa stressiä.

Säilytysolosuhteet

Pitkäaikaissäilytystä varten injektiopullot asetetaan höyryfaasissa olevaan nestemäiseen typpeen noin -150 - -196 °C:een. Säilytys -80 °C:ssa on hyväksyttävää vain lyhyenä välivaiheena ennen siirtoa nestemäiseen typpeen.

Toimitusehdot

Kryosäilytetyt solulinjat kuljetetaan kuivajäässä validoidussa, eristetyssä pakkauksessa, jossa on riittävästi kylmäainetta, jotta lämpötila pysyy noin -78 °C:ssa koko kuljetuksen ajan. Pakkaus on tarkastettava välittömästi sen vastaanottamisen jälkeen ja injektiopullot on siirrettävä viipymättä asianmukaiseen varastoon.

LAHJOITTAJA

Luovuttajan ikä	68 vuotta

Etnisyys	Kaukasialainen

OIKEUDELLISET JA TURVALLISUUSASIAT

Turvallisuusohjeet

Kun suunnitellaan kryoputken säilyttämistä nestemäisessä typessä sulatusta varten, on noudatettava tiukkoja turvatoimenpiteitä. Asianmukaiset suojakäsineet ja -vaatteet ovat välttämättömiä, ja kasvonaamarin tai suojalasien käyttö on välttämätöntä siirrettäessä jäädytettyjä näytteitä nestetyppisäiliöön tai siitä pois. Tällä pyritään pienentämään loukkaantumisriskiä, joka aiheutuu kryoputkien mahdollisista räjähdyksistä, jotka voivat aiheuttaa terävien sirpaleiden sinkoutumisen.

Takuu

Me Cytionilla seisomme tuotteidemme laadun ja elinkelpoisuuden takana.
Takaamme, että solumme ovat elinkelpoisia viljelyn alkaessa 60 päivän ajan sen jälkeen, kun ne on lähetetty laitoksestamme.
Vakuutamme, että kaikki materiaalit ovat analyysitodistuksessa ja/tai tuoteselosteessa kuvattujen eritelmien mukaisia
Lisätietoja on <a href=""/Who-we-are/Warranty/"" hreflang=""""x-default"""">Takuulausumassa

Aineiden siirtoa koskeva sopimus vaaditaan	Yes