MINO

305513

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Description

La lignée cellulaire MINO est un modèle humain de lymphome à cellules du manteau (LCM), un sous-type rare et agressif de lymphome non hodgkinien à cellules B. Cette lignée cellulaire a été établie à partir d'une patiente de 64 ans atteinte d'un LCM avancé. Cette lignée cellulaire a été créée à partir d'une patiente de 64 ans atteinte d'un MCL avancé. Elle se caractérise par une surexpression de la cycline D1 due à la translocation chromosomique t(11;14)(q13;q32), caractéristique du MCL. Les cellules MINO présentent un immunophénotype CD5+CD20+CD23-, compatible avec le diagnostic de MCL, et présentent des altérations génétiques supplémentaires, notamment une hyperdiploïdie et une mutation TP53 au codon 147 (valine à glycine), qui peuvent contribuer à sa pathogenèse.
Les cellules MINO se développent en tant que cellules uniques ou en petits amas et présentent des caractéristiques typiques de la MCL, telles que des niveaux élevés de protéine de rétinoblastome phosphorylée (pRB) et l'expression de protéines anti-apoptotiques telles que Bcl-2 et Bcl-xL. Ces cellules ont été utilisées pour étudier les mécanismes moléculaires qui sous-tendent la progression du MCL et la résistance à la thérapie. En particulier, des études ont montré que la cycline D1 joue un rôle dans la promotion de la progression du cycle cellulaire et l'évasion de l'apoptose en interagissant avec des protéines pro-apoptotiques comme Bax, favorisant ainsi la survie des cellules de lymphome.
La lignée cellulaire MINO est un outil précieux pour la recherche préclinique, notamment pour les tests de médicaments et les études génétiques. Elle a été utilisée pour évaluer des thérapies ciblées qui inhibent l'activité de la cycline D1 ou perturbent des voies essentielles à la survie du MCL, telles que les voies PI3K/Akt et Bcl-2. Cette lignée cellulaire continue de contribuer à la compréhension de la biologie de la MCL et à l'amélioration des stratégies thérapeutiques pour cette maladie difficile.

Tissu	Sang périphérique
Maladie	Lymphome à cellules du manteau

Synonymes

- Mino

CLASSIFICATION

Organisme	Humain
Sexe	Homme
Propriétés de croissance	Suspension
Niveau de biosécurité	1

CARACTÉRISTIQUES

Morphologie	De type lymphoblaste
Type de cellule	Lymphoblaste

IDENTIFIANTS

Référence

MINO (numéro de catalogue Cytion 305513)

Numéro d'identification fiscale NCBI	9606
Cellosaurus	CVCL_1872

Cytion GmbH
Nikola-Tesla-Str. 3
69124 Heidelberg
Tel: +49 (0)6221 405780
info@cytion.com
cytion.com

Registered office Heidelberg
VAT ID: DE283292917
Local court Mannheim - HRB 714394
CEO / Geschäftsführer: Jonathan Steubing

Banking information
Sparkasse Heidelberg
IBAN: DE35 6725 0020 0009 2076 86
BIC: SOLADES1HDB

EXPRESSION ET SENSIBILITÉ

Profil mutationnel

Mutation : CDKN2A, p.Glu88Lys (c.262G>A), homozygote ; Mutation : NRAS, p.Gly13Asp (c.38G>A), hétérozygote ; Mutation : p.Val147Gly (c.440T>G), homozygote

MANIPULATION ET CULTURE

Milieu de culture

RPMI 1640, w : 2.0 mM Glutamine stable, w : 2.0 g/L NaHCO3 (numéro d'article Cytion 820700a)

Atmosphère d'incubation	37°C, 5%CO2, atmosphère humidifiée.

Compléments alimentaires

Compléter le milieu avec 10 % de FBS inactivé à la chaleur

Densité de semis	1 x 10^6 cellules/mL

Décongélation et mise en culture

Confirm that the vial remains deeply frozen upon delivery, as cells are shipped on dry ice to maintain optimal temperatures during transit. Upon receipt, either store the cryovial immediately at temperatures below -150°C to ensure the preservation of cellular integrity, or proceed to step 3 if immediate culturing is required.
For immediate culturing, swiftly thaw the vial by immersing it in a 37°C water bath with clean water and an antimicrobial agent, agitating gently for 40-60 seconds until a small ice clump remains.
Perform all subsequent steps under sterile conditions in a flow hood, disinfecting the cryovial with 70% ethanol before opening.
Carefully open the disinfected vial and transfer the cell suspension into a 15 ml centrifuge tube containing 8 ml of room-temperature culture medium, mixing gently.
Centrifuge the mixture at 300 x g for 3 minutes to separate the cells and carefully discard the supernatant containing residual freezing medium.
Gently resuspend the cell pellet in 10 ml of fresh culture medium. For adherent cells, divide the suspension between two T25 culture flasks; for suspension cultures, transfer all the medium into one T25 flask to promote effective cell interaction and growth.
Adhere to established subculture protocols for continued growth and maintenance of the cell line, ensuring reliable experimental outcomes.

CONTRÔLE QUALITÉ ET CRYOCONSERVATION

Stérilité

La contamination par les mycoplasmes est exclue à l'aide de tests basés sur la PCR et de méthodes de détection des mycoplasmes basées sur la luminescence.
Pour s'assurer de l'absence de contamination bactérienne, fongique ou levurienne, les cultures cellulaires font l'objet d'inspections visuelles quotidiennes.

Milieu de congélation	Comme milieu de cryoconservation, nous utilisons un milieu de croissance complet (comprenant du FBS) + 10 % de DMSO pour une viabilité adéquate après décongélation, ou CM-1 (numéro de catalogue 800100 de Cytion), qui comprend des osmoprotectants et des stabilisateurs métaboliques optimisés pour améliorer la récupération et réduire le stress induit par la cryogénisation.

Conditions de stockage

Pour une conservation à long terme, placer les flacons dans de l'azote liquide en phase vapeur à une température comprise entre -150 et -196 °C environ. Le stockage à -80 °C n'est acceptable qu'en tant qu'étape intermédiaire de courte durée avant le transfert dans l'azote liquide.

Conditions de livraison

Les lignées cellulaires cryoconservées sont expédiées sur glace sèche dans des emballages isolés et validés, avec suffisamment de réfrigérant pour maintenir une température d'environ -78 °C tout au long du transport. À la réception, inspecter immédiatement le conteneur et transférer sans délai les flacons dans un lieu de stockage approprié.

DONATEUR

Âge du donneur	68 ans
Origine ethnique	Caucasien

ASPECTS JURIDIQUES ET SÉCURITÉ

Consignes de sécurité

Lorsque l'on envisage de stocker un cryovial dans l'azote liquide en vue d'une décongélation ultérieure, il est obligatoire de respecter des mesures de sécurité rigoureuses. Des gants et des vêtements de protection appropriés sont indispensables, et l'utilisation d'un masque facial ou de lunettes de sécurité est requise pendant le transfert des échantillons congelés vers ou depuis le réservoir d'azote liquide. Ceci afin de réduire le risque de blessures dues à l'explosion potentielle des cryoviaux lors de leur retrait, qui peut entraîner la projection de fragments tranchants.

Garantie

Chez Cytion, nous nous portons garants de la qualité et de la viabilité de nos produits.
Nous garantissons que nos cellules seront viables au début de la culture pendant 60 jours après l'expédition de nos installations.
Nous assurons que tous les matériaux sont conformes aux spécifications décrites dans le certificat d'analyse et/ou la fiche produit
Pour plus de détails, veuillez consulter notre <a href=""/Who-we-are/Warranty/"" hreflang=""x-default""> Déclaration de garantie

Un accord de transfert de matériel est requis	Yes