MINO

305513

INFORMASI UMUM

Deskripsi

Lini sel MINO adalah model limfoma sel mantel (MCL) yang berasal dari manusia, subtipe limfoma non-Hodgkin sel B yang langka dan agresif. Garis sel ini dibuat dari pasien wanita berusia 64 tahun dengan MCL stadium lanjut. Hal ini ditandai dengan ekspresi berlebih dari cyclin D1 akibat translokasi kromosom t(11;14) (q13;q32), yang merupakan ciri khas MCL. Sel MINO menunjukkan imunofenotipe CD5 + CD20 + CD23-, konsisten dengan diagnosis MCL, dan menunjukkan perubahan genetik tambahan, termasuk hiperdiploidi dan mutasi TP53 pada kodon 147 (valin menjadi glisin), yang dapat berkontribusi pada patogenesisnya.
Sel MINO tumbuh sebagai sel tunggal atau dalam gumpalan kecil dan menunjukkan ciri-ciri khas MCL, seperti tingginya kadar protein retinoblastoma terfosforilasi (pRB) dan ekspresi protein anti-apoptosis seperti Bcl-2 dan Bcl-xL. Sel-sel ini telah digunakan untuk mempelajari mekanisme molekuler yang mendasari perkembangan MCL dan resistensi terhadap terapi. Secara khusus, penelitian telah menunjukkan bahwa cyclin D1 berperan dalam mendorong perkembangan siklus sel dan penghindaran apoptosis dengan berinteraksi dengan protein pro-apoptosis seperti Bax, yang mendukung kelangsungan hidup sel limfoma.
Garis sel MINO adalah alat yang berharga untuk penelitian praklinis, termasuk pengujian obat dan studi genetik. Ini telah digunakan dalam mengevaluasi terapi yang ditargetkan yang menghambat aktivitas cyclin D1 atau mengganggu jalur yang penting untuk kelangsungan hidup MCL, seperti jalur PI3K / Akt dan Bcl-2. Garis sel ini terus berkontribusi untuk memahami biologi MCL dan meningkatkan strategi terapeutik untuk penyakit yang menantang ini.

Tisu	Darah tepi
Penyakit	Limfoma sel mantel

Sinonim

- Mino

KLASIFIKASI

Organisme	Manusia
Seks	Laki-laki
Sifat-sifat pertumbuhan	Penangguhan
Tingkat keamanan hayati	1

KARAKTERISTIK

Morfologi	Seperti limfoblas
Jenis sel	Limfoblas

PENGIDENTIFIKASI

Referensi

MINO (nomor katalog Cytion 305513)

Nomor Identifikasi Pajak NCBI	9606
Cellosaurus	CVCL_1872

Cytion GmbH
Nikola-Tesla-Str. 3
69124 Heidelberg
Tel: +49 (0)6221 405780
info@cytion.com
cytion.com

Registered office Heidelberg
VAT ID: DE283292917
Local court Mannheim - HRB 714394
CEO / Geschäftsführer: Jonathan Steubing

Banking information
Sparkasse Heidelberg
IBAN: DE35 6725 0020 0009 2076 86
BIC: SOLADES1HDB

EKSPRESI DAN KERENTANAN

Profil mutasi

Mutasi: CDKN2A, p.Glu88Lys (c.262G>A), homozigot; Mutasi: NRAS, p.Gly13Asp (c.38G>A), heterozigot; Mutasi: p.Val147Gly (c.440T>G), homozigot

PENANGANAN DAN BUDIDAYA

Media kultur

RPMI 1640, w: 2,0 mM Glutamin stabil, w: 2,0 g/L NaHCO3 (Nomor artikel Cytion 820700a)

Suasana inkubasi	37°C, 5%CO2, atmosfer yang dilembabkan.

Suplemen

Lengkapi media dengan 10% FBS yang dinonaktifkan dengan panas

Kepadatan penanaman	1 x 10^6 sel/mL

Pencairan dan pembiakan

Confirm that the vial remains deeply frozen upon delivery, as cells are shipped on dry ice to maintain optimal temperatures during transit.
Upon receipt, either store the cryovial immediately at temperatures below -150°C to ensure the preservation of cellular integrity, or proceed to step 3 if immediate culturing is required.
For immediate culturing, swiftly thaw the vial by immersing it in a 37°C water bath with clean water and an antimicrobial agent, agitating gently for 40-60 seconds until a small ice clump remains.
Perform all subsequent steps under sterile conditions in a flow hood, disinfecting the cryovial with 70% ethanol before opening.
Carefully open the disinfected vial and transfer the cell suspension into a 15 ml centrifuge tube containing 8 ml of room-temperature culture medium, mixing gently.
Centrifuge the mixture at 300 x g for 3 minutes to separate the cells and carefully discard the supernatant containing residual freezing medium.
Gently resuspend the cell pellet in 10 ml of fresh culture medium. For adherent cells, divide the suspension between two T25 culture flasks; for suspension cultures, transfer all the medium into one T25 flask to promote effective cell interaction and growth.
Adhere to established subculture protocols for continued growth and maintenance of the cell line, ensuring reliable experimental outcomes.

PENGENDALIAN MUTU DAN KRIOPRESERVASI

Kemandulan

Kontaminasi mikoplasma disingkirkan dengan menggunakan tes berbasis PCR dan metode deteksi mikoplasma berbasis pendaran.
Untuk memastikan tidak ada kontaminasi bakteri, jamur, atau ragi, kultur sel menjalani inspeksi visual setiap hari.

Media pembekuan	Sebagai media kriopreservasi, kami menggunakan media pertumbuhan lengkap (termasuk FBS) + 10% DMSO untuk viabilitas pasca-pencairan yang memadai, atau CM-1 (nomor katalog Cytion 800100), yang mencakup osmoprotektan yang dioptimalkan dan penstabil metabolisme untuk meningkatkan pemulihan dan mengurangi stres yang diinduksi kriopreservasi.

Kondisi penyimpanan

Untuk pengawetan jangka panjang, tempatkan botol dalam nitrogen cair fase uap pada suhu sekitar -150 hingga -196 °C. Penyimpanan pada suhu -80 °C hanya dapat diterima sebagai langkah sementara sebelum dipindahkan ke nitrogen cair.

Ketentuan pengiriman

Lini sel kriopreservasi dikirim di atas es kering dalam kemasan terisolasi yang divalidasi dengan refrigeran yang cukup untuk mempertahankan suhu sekitar -78 ° C selama perjalanan. Setelah diterima, segera periksa wadah dan pindahkan botol tanpa penundaan ke tempat penyimpanan yang sesuai.

DONATUR

Usia donor	68 tahun
Etnis	Kaukasia

HUKUM DAN KESELAMATAN

Tindakan pencegahan keselamatan

Ketika berencana menyimpan kriovial dalam nitrogen cair untuk pencairan di masa mendatang, Anda wajib mematuhi langkah-langkah keamanan yang ketat. Sarung tangan dan pakaian pelindung yang tepat sangat penting, dan penggunaan masker wajah atau kacamata pengaman diperlukan selama pemindahan sampel beku ke atau dari tangki nitrogen cair. Hal ini untuk mengurangi risiko cedera akibat potensi ledakan cryovial pada saat pemindahan, yang dapat mengakibatkan proyeksi fragmen tajam.

Garansi

Di Cytion, kami mendukung kualitas dan kelangsungan hidup produk kami.
Kami menjamin bahwa sel kami akan dapat bertahan hidup pada awal kultur selama 60 hari setelah pengiriman dari fasilitas kami.
Kami menjamin bahwa semua bahan sesuai dengan spesifikasi yang dijelaskan dalam Sertifikat Analisis dan / atau Lembar Produk
Untuk detail lengkap, silakan merujuk ke <a href=""/Siapa-kami-Garansi/Garansi/"" hreflang=""x-default"">Pernyataan Jaminan kami

Diperlukan Perjanjian Transfer Material	Yes