HT-3

305521

BENDRA INFORMACIJA

Aprašymas

HT-3 – tai žmogaus gimdos kaklelio vėžio ląstelių linija, išskirta iš plokščialąstelinės karcinomos, kuri pasižymi tuo, kad yra HPV-neigiama. Ši ląstelių linija plačiai naudojama tyrimuose, skirtuose ląstelių fiziologijai, ypač susijusiems su jonų kanalų reguliavimu, signalų perdavimu ir citoskeleto dinamikos vaidmeniu ląstelių procesuose. HT-3 ląstelėse stebimas tūriui jautrių chlorido (Cl^-) kanalų aktyvavimas, kuris yra itin svarbus jų reguliuojamo tūrio sumažėjimo (RVD) reakcijoms esant osmosiniam stresui. Šis mechanizmas yra esminis palaikant ląstelių homeostazę, nes leidžia Cl^- ir K^+ jonams ištekėti, taip palengvindamas vandens judėjimą iš ląstelės, kad po patinimo būtų atkurtas normalus tūris.

Tyrimai su HT-3 ląstelių linija atskleidė, kad tūrio reguliavime dalyvauja tam tikros proteinkinazės C (PKC) izoformos. Ypač svarbu tai, kad PKC-α yra susijusi su tūriui jautrių Cl^- kanalų aktyvacija ir RVD reakcijomis. Eksperimentiniai duomenys rodo, kad PKC-α slopinimas, naudojant cheminius blokatorius arba izoformoms specifinius antikūnus, žymiai sutrikdo šių kanalų funkciją, o tai lemia užsitęsusį ląstelių patinimą ir sutrikusį RVD. Tai pabrėžia PKC-α, kaip reguliuojančio veiksnio, vaidmenį HT-3 ląstelių reakcijoje į hipotoninį stresą.

Be to, įrodyta, kad citoskeleto, ypač aktino filamentų ir mikrotubulių, vientisumas yra būtinas tinkamai Cl^- kanalų aktyvacijai ir veiksmingam tūrio reguliavimui HT-3 ląstelėse. Aktino filamentų sutrikdymas tokiais agentais kaip citochalazinas B padidina Cl^- laidumą ir paveikia ląstelių tūrio atkūrimą, o stabilizuojantys agentai, tokie kaip faloidinas, slopina šių kanalų aktyvumą ir uždelsta RVD. Mikrotubulius modifikuojantys junginiai, tokie kaip kolchicinas ir taksolis, turi skirtingą poveikį, o tai pabrėžia sudėtingą sąveiką tarp citocкeleto struktūrų ir jonų kanalų funkcijos šiose vėžio ląstelėse.

Audinys	Gimdos kaklelis
Liga	Karcinoma
Metastazių vieta	Limfmazgis

Sinonimai

- HT3

KLASIFIKACIJA

Organizmas	Žmogus
Seksas	Moteris
Augimo savybės	Prisijungęs
Biologinio saugumo lygis	1

CHARAKTERISTIKOS

Morfologija	Į epitelį panašus
Tumorogeninis	Taip, su nuogomis pelėmis

IDENTIFIKATORIAI

Nuoroda

HT-3 (Cytion katalogo numeris 305521)

NCBI mokesčių identifikavimo kodas	9606
Cellosaurus	CVCL_1293

Cytion GmbH
Nikola-Tesla-Str. 3
69124 Heidelberg
Tel: +49 (0)6221 405780
info@cytion.com
cytion.com

Registered office Heidelberg
VAT ID: DE283292917
Local court Mannheim - HRB 714394
CEO / Geschäftsführer: Jonathan Steubing

Banking information
Sparkasse Heidelberg
IBAN: DE35 6725 0020 0009 2076 86
BIC: SOLADES1HDB

IŠRAIŠKA IR JAUTRUMAS

Antigeno ekspresija

Išreikšti genai: A kraujo grupė, Rh+

Onkogenai

P53+, pRB+

Mutacijų profilis

Mutacija: TP53, p.Gly245Val (c.734G>T)

LAIKYMAS IR AUGINIMAS

Maitinamoji terpė

McCoys 5a, w: 3,0 g/l gliukozės, w: stabilus glutaminas, w: 2,0 mM natrio piruvatas, w: 2,2 g/l NaHCO3 (Cytion gaminio numeris 820200a)

Inkubacijos aplinka	37 °C, 5 %CO2, drėkintoje atmosferoje.

Maisto papildai

Papildykite terpę 10 % FBS

Disociacijos reagentas	Accutase

Subkultūrinis auginimas

Pašalinkite seną terpę nuo prilipusių ląstelių ir nuplaukite jas PBS, kuriame nėra kalcio ir magnio. T25 kolboms naudokite 3-5 ml PBS, o T75 kolboms - 5-10 ml. Tuomet visiškai užpilkite ląsteles "Accutase", naudodami 1-2 ml T25 kolboms ir 2,5 ml T75 kolboms. Leiskite ląstelėms inkubuotis kambario temperatūroje 8-10 minučių, kad jos atsiskirtų. Po inkubacijos atsargiai sumaišykite ląsteles su 10 ml terpės, kad jos vėl suspenduotų, tada 3 minutes centrifuguokite 300xg greičiu. Išmeskite supernatantą, vėl sutirpinkite ląsteles šviežioje terpėje ir perkelkite jas į naujas kolbas, kuriose jau yra šviežia terpė.

Skysčių atnaujinimas	2-3 kartus per savaitę

Atšildymas ir auginimas

Confirm that the vial remains deeply frozen upon delivery, as cells are shipped on dry ice to maintain optimal temperatures during transit.
Upon receipt, either store the cryovial immediately at temperatures below -150°C to ensure the preservation of cellular integrity, or proceed to step 3 if immediate culturing is required.
For immediate culturing, swiftly thaw the vial by immersing it in a 37°C water bath with clean water and an antimicrobial agent, agitating gently for 40-60 seconds until a small ice clump remains.
Perform all subsequent steps under sterile conditions in a flow hood, disinfecting the cryovial with 70% ethanol before opening.
Carefully open the disinfected vial and transfer the cell suspension into a 15 ml centrifuge tube containing 8 ml of room-temperature culture medium, mixing gently.
Centrifuge the mixture at 300 x g for 3 minutes to separate the cells and carefully discard the supernatant containing residual freezing medium.
Gently resuspend the cell pellet in 10 ml of fresh culture medium. For adherent cells, divide the suspension between two T25 culture flasks; for suspension cultures, transfer all the medium into one T25 flask to promote effective cell interaction and growth.
Adhere to established subculture protocols for continued growth and maintenance of the cell line, ensuring reliable experimental outcomes.

KOKYBĖS KONTROLĖ IR KRIOKONSERVAVIMAS

Sterilumas

Mikoplazmos užterštumas atmetamas taikant PGR pagrįstus tyrimus ir liuminescencinius mikoplazmos aptikimo metodus.
Siekiant užtikrinti, kad nebūtų užteršimo bakterijomis, grybeliais ar mielėmis, ląstelių kultūros kasdien vizualiai tikrinamos.

Šaldymo terpė	Kaip kriokonservavimo terpę naudojame visišką augimo terpę (įskaitant FBS) + 10 % DMSO, kad būtų užtikrintas tinkamas gyvybingumas po atšildymo, arba CM-1 (Cytion katalogo numeris 800100), kurioje yra optimizuotų osmoprotektorių ir medžiagų apykaitos stabilizatorių, kad būtų pagerintas atsigavimas ir sumažintas kriokonservavimo sukeltas stresas.

Laikymo sąlygos

Norėdami ilgai saugoti, įdėkite buteliukus į garų fazės skystą azotą maždaug -150-196 °C temperatūroje. Laikymas -80 °C temperatūroje yra priimtinas tik kaip trumpas tarpinis etapas prieš perkeliant į skystąjį azotą.

Pristatymo sąlygos

Kriokonservuotos ląstelių linijos gabenamos ant sauso ledo patvirtintoje, izoliuotoje pakuotėje su pakankamu kiekiu šaldymo skysčio, kad pervežimo metu būtų palaikoma maždaug -78 °C temperatūra. Gavę pakuotę, nedelsdami ją apžiūrėkite ir nedelsdami perkelkite mėgintuvėlius į tinkamą saugyklą.

DONORAS

Donoro amžius	58 metai
Etninė priklausomybė	Kaukaziečių

TEISINIAI IR SAUGOS KLAUSIMAI

Saugos priemonės

Planuojant saugoti kriovaistinę skystame azote, kad ateityje ją būtų galima atšildyti, būtina laikytis griežtų saugos priemonių. Būtina mūvėti tinkamas apsaugines pirštines ir drabužius, o perkeliant užšaldytus mėginius į skystojo azoto talpyklą arba iš jos būtina naudoti veido kaukę arba apsauginius akinius. Taip siekiama sumažinti sužeidimų riziką dėl galimo kriokomponentų sprogimo išėmimo metu, kai gali išsiveržti aštrūs fragmentai.

Garantija

" Cytion" garantuoja savo produktų kokybę ir gyvybingumą.
Garantuojame, kad mūsų ląstelės bus gyvybingos kultūrų auginimo pradžioje 60 dienų po išsiuntimo iš mūsų gamyklos.
Užtikriname, kad visos medžiagos atitinka analizės sertifikate ir (arba) gaminio lape aprašytas specifikacijas
Išsamią informaciją rasite mūsų <a href=""/Kas mes esame/garantijos/" hreflang=""x-default"">Garantijos pareiškime

Reikalinga medžiagų perdavimo sutartis	Yes

Cytion GmbH
Nikola-Tesla-Str. 3
69124 Heidelberg
Tel: +49 (0)6221 405780
info@cytion.com
cytion.com

Registered office Heidelberg
VAT ID: DE283292917
Local court Mannheim - HRB 714394
CEO / Geschäftsführer: Jonathan Steubing

Banking information
Sparkasse Heidelberg
IBAN: DE35 6725 0020 0009 2076 86
BIC: SOLADES1HDB