A-253

305524

GENERAL INFORMATION

Description

הוא קו תאים אפיתליאלי אנושי שמקורו בקרצינומה אפידרמואידית של בלוטת הרוק התת-לסתית. מודל תאי זה נמצא בשימוש נרחב A-253 קו התאים היא מחלה אוטואימונית (SS) תסמונת סיוגרן .(SS) לחקר הפתופיזיולוגיה של בלוטות הרוק, במיוחד בהקשר של מחלות אוטואימוניות כגון תסמונת סיוגרן כרונית הפוגעת בבלוטות האקסוקריניות, וגורמת לתסמינים של יובש בפה (קסרוסטומיה) ויובש בעיניים (קרטוקונג'ונקטיביטיס סיקה), וכן לנזק ברקמת יכולים לעורר אפופטוזיס הן באמצעות ,La-ואנטי Ro-כגון נוגדני אנטי ,SS הראו כי נוגדנים עצמיים מסוימים הקיימים בחולי A-253 הבלוטות. מחקרים בתאי על פני התא, מה שמוביל (Fcγ) גמא Fc מסלולים פנימיים והן באמצעות מסלולים חיצוניים. תהליך זה מתרחש באמצעות אינטראקציות עם קולטני .לאינטרינליזציה של נוגדנים עצמיים אלה ולהפעלת שרשראות איתות אפופטוטיות הכוללות קספאזות, ובפרט קספאזה-3, קספאזה-8 וקספאזה-9
שהראו השפעות מגנות ,Dendrobium officinale-במיוחד אלה שמקורם ב ,A-253 מחקרים בחנו גם את ההשפעות של פוליסכרידים צמחיים על קו התאים הראו ירידה בסמנים A-253 כאשר טופלו מראש בפוליסכרידים אלה, תאי .(TNF-α) פוטנציאליות כנגד אפופטוזיס המושרה על ידי גורם נמק הגידול-אלפא שימור פוטנציאל קרום המיטוכונדריה וירידה במעבר של הגורם ,(ROS) כגון ירידה בייצור מינים תגובתיים של חמצן ,TNF-α אפופטוטיים המושרים על ידי אל הגרעין. תצפיות אלו מצביעות על תפקיד פוטנציאלי של פוליסכרידים מסוג זה בהפחתת הנזק הקשור למערכת החיסון (NF-κB) B הגרעיני קאפה שבה אפופטוזיס מוגבר תורם לתפקוד לקוי של הבלוטות ,(SS) בבלוטות הרוק, ובמתן גישה טיפולית חדשנית למחלות אוטואימוניות כגון תסמונת סיוגרן .ולדלקת
משמשים כמודל חשוב להבנת האפופטוזיס בתאי בלוטות הרוק והמנגנונים המולקולריים העומדים בבסיס הנזק האוטואימוני לבלוטות A-253 בסך הכל, תאי הרוק. זה כולל את חקר הפעלת הקספאז, חוסר היציבות המיטוכונדריאלית והשפעות הציטוקינים הפרו-דלקתיים, הרלוונטיים הן בתסמונת סיוגרן והן .במחקרים רחבים יותר על חוסן תאי האפיתל ועל האינטראקציות החיסוניות

Tissue	בלוטות תת-לסתיות
Disease	קרצינומה של תאי קשקש

Synonyms

- A 253
- A253

CLASSIFICATION

Organism	Human
Sex	Male
Growth properties	Adherent
Biosafety level	1

CHARACTERISTICS

Morphology	אפיתל
Tumourigenic	כן, בעכברים עירומים ובעכברים שזה עתה נולדו שטופלו בסרום נגד תאי תימוס

IDENTIFIERS

Citation

A-253 (מספר קטלוג Cytion 305524)

NCBI TaxID	9606
Cellosaurus	CVCL_1060

Cytion GmbH
Nikola-Tesla-Str. 3
69124 Heidelberg
Tel: +49 (0)6221 405780
info@cytion.com
cytion.com

Registered office Heidelberg
VAT ID: DE283292917
Local court Mannheim - HRB 714394
CEO / Geschäftsführer: Jonathan Steubing

Banking information
Sparkasse Heidelberg
IBAN: DE35 6725 0020 0009 2076 86
BIC: SOLADES1HDB

HANDLING AND CULTURE

Culture medium

McCoys 5a, w: 3.0 g/L גלוקוז, w: יציב גלוטמין, w: 2.0 mM נתרן פירובט, w: 2.2 g/L NaHCO3 (מספר פריט Cytion 820200a)

Incubation atmosphere	37°C, 5%CO2, אווירה לחה.

Supplements

FBS הוסף לתווך 10%

Dissociation reagent	אקוטאז

Subculturing

T75, PBS ועבור בקבוקי השתמש ב-3-5 מ"ל T25, ללא סידן ומגנזיום. עבור בקבוקי PBS-הסר את המדיום הישן מהתאים הדבוקים ושטוף אותם ב השאר את .T75 ו-2.5 מ"ל עבור בקבוקי T25 תוך שימוש ב-1-2 מ"ל עבור בקבוקי Accutase-השתמש ב-5-10 מ"ל. לאחר מכן, כסה את התאים לחלוטין ב התאים לדגירה בטמפרטורת החדר למשך 8-10 דקות כדי לנתק אותם. לאחר הדגירה, ערבב בעדינות את התאים עם 10 מ"ל של מדיום כדי להחזיר אותם למשך 3 דקות. השלך את הנוזל העליון, החזר את התאים לתמיסה במדיום טרי והעבר אותם לצלחות חדשות xgלתמיסה, ואז סובב בצנטריפוגה ב-300 שכבר מכילות מדיום טרי.

Seeding density	2–4*10^4/סמ"ר

Thawing and culturing

Confirm that the vial remains deeply frozen upon delivery, as cells are shipped on dry ice to maintain optimal temperatures during transit.
Upon receipt, either store the cryovial immediately at temperatures below -150°C to ensure the preservation of cellular integrity, or proceed to step 3 if immediate culturing is required.
For immediate culturing, swiftly thaw the vial by immersing it in a 37°C water bath with clean water and an antimicrobial agent, agitating gently for 40-60 seconds until a small ice clump remains.
Perform all subsequent steps under sterile conditions in a flow hood, disinfecting the cryovial with 70% ethanol before opening.
Carefully open the disinfected vial and transfer the cell suspension into a 15 ml centrifuge tube containing 8 ml of room-temperature culture medium, mixing gently.
Centrifuge the mixture at 300 x g for 3 minutes to separate the cells and carefully discard the supernatant containing residual freezing medium.
Gently resuspend the cell pellet in 10 ml of fresh culture medium. For adherent cells, divide the suspension between two T25 culture flasks; for suspension cultures, transfer all the medium into one T25 flask to promote effective cell interaction and growth.
Adhere to established subculture protocols for continued growth and maintenance of the cell line, ensuring reliable experimental outcomes.

QUALITY CONTROL AND CRYOPRESERVATION

Sterility

ושיטות זיהוי מיקופלסמה מבוססות לומניסצנציה PCR זיהום במיקופלסמה נשלל באמצעות בדיקות מבוססות.
כדי להבטיח שאין זיהום חיידקי, פטרייתי או שמרי, תרבויות התאים עוברות בדיקות ויזואליות יומיות.

Freeze medium	כדי להבטיח DMSO + 10% (FBS כולל) כמדיום לשימור בקירור, אנו משתמשים במדיום גידול מלא הכולל חומרים אוסמו- (Cytion 800100 מספר קטלוגי) CM-1 חיוניות נאותה לאחר ההפשרה, או מגנים ומייצבי מטבוליזם משופרים כדי לשפר את ההתאוששות ולהפחית את הלחץ הנגרם מהקפאה.

Storage conditions

לשימור לטווח ארוך, יש להניח את הבקבוקונים בחנקן נוזלי במצב של אדי בטמפרטורה של כ-150 עד 196 מעלות צלזיוס. אחסון בטמפרטורה של 80 מעלות צלזיוס מקובל רק כצעד ביניים קצר לפני העברה לחנקן נוזלי.

Shipping conditions

במהלך C-שורות תאים שהוקפאו נשלחות בקרח יבש באריזה מאושרת ומבודדת עם כמות מספקת של חומר קירור כדי לשמור על טמפרטורה של כ-78° ההובלה. עם קבלת המשלוח, יש לבדוק את המכל מיד ולהעביר את הבקבוקונים ללא דיחוי לאחסון מתאים.

DONOR

Donor age	54 שנים
Ethnicity	אירופאי

LEGAL AND SAFETY

Safety precautions

כאשר מתכננים לאחסן קריוביאל בחנקן נוזלי להפשרה עתידית, חובה להקפיד על אמצעי בטיחות מחמירים. יש להקפיד על שימוש בכפפות ובבגדים מגנים מתאימים, וכן על שימוש במסכת פנים או משקפי מגן בעת העברת דגימות קפואות אל מיכל החנקן הנוזלי או ממנו. זאת כדי להפחית את הסיכון לפציעה כתוצאה מפיצוץ אפשרי של הקריוביאל בעת הוצאתו, העלול לגרום להתזת רסיסים חדים.

Warranty

אנו עומדים מאחורי האיכות והכדאיות של המוצרים שלנו, ב-Cytion.
אנו מבטיחים שתאינו יהיו קיימים בתחילת התרבית למשך
60 יום לאחר המשלוח מהמתקנים שלנו.
אנו מבטיחים שכל החומרים תואמים למפרטים המתוארים
בתעודת הניתוח ו/או בדף המוצר.
לפרטים מלאים, אנא עיינו ב
<a href=""/Who-we-are/Warranty/"" hreflang=""x-default"">הצהרת האחריות שלנו

Material Transfer Agreement required	Yes

Cytion GmbH
Nikola-Tesla-Str. 3
69124 Heidelberg
Tel: +49 (0)6221 405780
info@cytion.com
cytion.com

Registered office Heidelberg
VAT ID: DE283292917
Local court Mannheim - HRB 714394
CEO / Geschäftsführer: Jonathan Steubing

Banking information
Sparkasse Heidelberg
IBAN: DE35 6725 0020 0009 2076 86
BIC: SOLADES1HDB