AMO-1

305525

BENDRA INFORMACIJA

Aprašymas

AMO-1 ląstelių linija yra dauginės mielomos modelis, gautas iš piktybinio plazminių ląstelių naviko. Ji plačiai naudojama tyrimuose, kuriuose nagrinėjami vaistų jautrumo, apoptozės ir navikinių ląstelių signalizacijos mechanizmai mielomos atveju. AMO-1 ląstelės yra jautrios įvairiems chemoterapiniams preparatams ir tikslinio gydymo priemonėms, pavyzdžiui, proteasomų inhibitoriams ir tirozino kinazės inhibitoriams, kurie tapo itin svarbūs dauginės mielomos gydyme. Tyrimai parodė, kad gydymas blužnies tirozino kinazės (Syk) inhibitoriais sukelia reikšmingą antiproliferacinį ir proapoptozinį poveikį AMO-1 ląstelėse. Šis poveikis pasireiškia slopinant svarbiausius signalizavimo kelius, įskaitant MAPK ir NF-kappaB, ir jam būdingas padidėjęs citochromo c išsiskyrimas bei apoptozės žymenų, tokių kaip kaspazė-3 ir PARP-1, aktyvacija. Be to, Syk slopinimas mažina ląstelių migraciją ir sąveiką su kaulų čiulpų stromos komponentais, dar labiau ribodamas mielomos ląstelių išlikimą. AMO-1 ląstelės taip pat pasirodė jautrios natūraliems junginiams, veikiantiems „Notch3-p53“ ašį, pavyzdžiui, sofokarpino dariniams. Šie junginiai mažina ląstelių gyvybingumą, slopindami antiapoptozinių baltymų (pvz., Bcl-2) ekspresiją ir stiprindami proapoptozinių veiksnių (pvz., Bax ir suskaidytos kaspazės-3) ekspresiją. Be to, gydymas sofokarpinu sumažina Notch3 ekspresiją – šis signalinis kelias yra susijęs su naviko progresavimu mielomoje ir kitose vėžio formose. Dėl to AMO-1 yra veiksmingas modelis vaistams, skirtiems modifikuoti Notch signalizaciją ir p53 mediuojamus apoptozės kelius, tirti. Imunoterapijos kontekste AMO-1 ląstelės atpažįstamos γδ T ląstelių per tarpląstelinės adhezijos molekulės-1 (ICAM-1) ekspresiją, o transfekcija, skirta padidinti ICAM-1 ekspresiją, sustiprina jų jautrumą T ląstelių tarpininkaujamai lizės reakcijai. Ši savybė remia tyrimus, skirtus mielomai nukreiptoms imunoterapijoms kaip alternatyviam požiūriui į atsparius gydymui atvejus.

Audinys	Ascitas
Liga	Daugybinė mieloma

Sinonimai

- AMo1
- AMO1

KLASIFIKACIJA

Organizmas	Žmogus
Seksas	Moteris
Augimo savybės	Pakaba
Biologinio saugumo lygis	1

CHARAKTERISTIKOS

Morfologija	Apvalios ląstelės

IDENTIFIKATORIAI

Nuoroda

AMO-1 (Cytion katalogo numeris 305525)

NCBI mokesčių identifikavimo kodas	9606
Cellosaurus	CVCL_1806

Cytion GmbH
Nikola-Tesla-Str. 3
69124 Heidelberg
Tel: +49 (0)6221 405780
info@cytion.com
cytion.com

Registered office Heidelberg
VAT ID: DE283292917
Local court Mannheim - HRB 714394
CEO / Geschäftsführer: Jonathan Steubing

Banking information
Sparkasse Heidelberg
IBAN: DE35 6725 0020 0009 2076 86
BIC: SOLADES1HDB

IŠRAIŠKA IR JAUTRUMAS

Mutacijų profilis

Genų susijungimas: IGKV1-8-IGKJ1; Genų susijungimas: IGKV3-20-IGKJ2; Mutacija: BCOR, p.Gln312del (c.932_934AGC[1]) (c.935_937delAGC), heterozigotinė; Mutacija: KRAS, p.Ala146Thr (c.436G>A), heterozigotinė; Mutacija: STAT3, p.Cys712Tyr (c.2135G>A), heterozigotinė; Mutacija: TET2, p.Gln1699Ter (c.5095C>T), heterozigotė

LAIKYMAS IR AUGINIMAS

Maitinamoji terpė

RPMI 1640, š: 2,0 mM stabilus glutaminas, š: 2,0 g/L NaHCO3 (Cytion gaminio numeris 820700a)

Inkubacijos aplinka	37 °C, 5 %CO2, drėkintoje atmosferoje.

Maisto papildai

Papildykite terpę 20 % FBS

Subkultūrinis auginimas

Surinkite ląstelių suspensiją į 15 ml mėgintuvėlį ir švelniai nuplaukite prilipusias ląsteles PBS, kuriame nėra kalcio ir magnio (naudokite 3-5 ml T25 kolboms ir 5-10 ml T75 kolboms). Užtepkite "Accutase" (1-2 ml T25 kolboms, 2,5 ml T75 kolboms), kad visiškai padengtumėte ląstelių sluoksnį. Leiskite ląstelėms 10 minučių inkubuotis kambario temperatūroje. Po inkubacijos sumaišykite ir centrifuguokite suspensiją ir prilipusias ląsteles. Po centrifugavimo atsargiai resuspenduokite ląstelių granules ir perkelkite ląstelių suspensiją į naujas kolbas su šviežia terpe.

Sėjos tankis	3–5 × 10^5/ml
Skysčių atnaujinimas	2-3 kartus per savaitę

Atšildymas ir auginimas

Confirm that the vial remains deeply frozen upon delivery, as cells are shipped on dry ice to maintain optimal temperatures during transit.
Upon receipt, either store the cryovial immediately at temperatures below -150°C to ensure the preservation of cellular integrity, or proceed to step 3 if immediate culturing is required.
For immediate culturing, swiftly thaw the vial by immersing it in a 37°C water bath with clean water and an antimicrobial agent, agitating gently for 40-60 seconds until a small ice clump remains.
Perform all subsequent steps under sterile conditions in a flow hood, disinfecting the cryovial with 70% ethanol before opening.
Carefully open the disinfected vial and transfer the cell suspension into a 15 ml centrifuge tube containing 8 ml of room-temperature culture medium, mixing gently.
Centrifuge the mixture at 300 x g for 3 minutes to separate the cells and carefully discard the supernatant containing residual freezing medium.
Gently resuspend the cell pellet in 10 ml of fresh culture medium. For adherent cells, divide the suspension between two T25 culture flasks; for suspension cultures, transfer all the medium into one T25 flask to promote effective cell interaction and growth.
Adhere to established subculture protocols for continued growth and maintenance of the cell line, ensuring reliable experimental outcomes.

KOKYBĖS KONTROLĖ IR KRIOKONSERVAVIMAS

Sterilumas

Mikoplazmos užterštumas atmetamas taikant PGR pagrįstus tyrimus ir liuminescencinius mikoplazmos aptikimo metodus.
Siekiant užtikrinti, kad nebūtų užteršimo bakterijomis, grybeliais ar mielėmis, ląstelių kultūros kasdien vizualiai tikrinamos.

Šaldymo terpė	Kaip kriokonservavimo terpę naudojame visišką augimo terpę (įskaitant FBS) + 10 % DMSO, kad būtų užtikrintas tinkamas gyvybingumas po atšildymo, arba CM-1 (Cytion katalogo numeris 800100), kurioje yra optimizuotų osmoprotektorių ir medžiagų apykaitos stabilizatorių, kad būtų pagerintas atsigavimas ir sumažintas kriokonservavimo sukeltas stresas.

Laikymo sąlygos

Norėdami ilgai saugoti, įdėkite buteliukus į garų fazės skystą azotą maždaug -150-196 °C temperatūroje. Laikymas -80 °C temperatūroje yra priimtinas tik kaip trumpas tarpinis etapas prieš perkeliant į skystąjį azotą.

Pristatymo sąlygos

Kriokonservuotos ląstelių linijos gabenamos ant sauso ledo patvirtintoje, izoliuotoje pakuotėje su pakankamu kiekiu šaldymo skysčio, kad pervežimo metu būtų palaikoma maždaug -78 °C temperatūra. Gavę pakuotę, nedelsdami ją apžiūrėkite ir nedelsdami perkelkite mėgintuvėlius į tinkamą saugyklą.

DONORAS

Donoro amžius	64 metai
Etninė priklausomybė	Japonų

TEISINIAI IR SAUGOS KLAUSIMAI

Saugos priemonės

Planuojant saugoti kriovaistinę skystame azote, kad ateityje ją būtų galima atšildyti, būtina laikytis griežtų saugos priemonių. Būtina mūvėti tinkamas apsaugines pirštines ir drabužius, o perkeliant užšaldytus mėginius į skystojo azoto talpyklą arba iš jos būtina naudoti veido kaukę arba apsauginius akinius. Taip siekiama sumažinti sužeidimų riziką dėl galimo kriokomponentų sprogimo išėmimo metu, kai gali išsiveržti aštrūs fragmentai.

Garantija

" Cytion" garantuoja savo produktų kokybę ir gyvybingumą.
Garantuojame, kad mūsų ląstelės bus gyvybingos kultūrų auginimo pradžioje 60 dienų po išsiuntimo iš mūsų gamyklos.
Užtikriname, kad visos medžiagos atitinka analizės sertifikate ir (arba) gaminio lape aprašytas specifikacijas
Išsamią informaciją rasite mūsų <a href=""/Kas mes esame/garantijos/" hreflang=""x-default"">Garantijos pareiškime

Reikalinga medžiagų perdavimo sutartis	Yes

PRODUKTO APRAŠYMAS

Sudėties lentelė