CMK

305533

GENERAL INFORMATION

Description

□□□□□□□□ CMK □□□□□□□□□

EXPRESSION AND SUSCEPTIBILITY

Mutational profile

□□□□□□□□□□□□□□: TP53, p.Asp49His (c.145G>C), □□□□□□□□□□□□□□□□; □□□□□□□□□□: TP53-FXR2

HANDLING AND CULTURE

Culture medium

DMEM, w: 4.5 □□□□/□□□□ □□□□□□, w: 4 □□□□□□□□□□□ □□□-□□□□□□□□, w: 3.7 □□□□/□□□□ NaHCO3, w: 1.0 □□□□□□□□ □□□□ □□□□□□□□□□□□□□□ (□□□□□□□□□□□□□□□ Cytion 820300a)

Incubation atmosphere	37°C, 5%CO2, □□□□□□□□□□□□□

Supplements

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ FBS 20%

Subculturing

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ 15 □□□□□□□□□ □□ PBS □□□ □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ (□□□ 3-5 □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ T25 □□□ 5-10 □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ T75)□□□ Accutase (1-2 □□. □□□□□□□□□□ T25, 2.5 □□. □□□□□□□□□□ T75) □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

Storage conditions

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□