EBC-1

305539

VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE

Popis

EBC-1 je ľudská bunková línia pľúcneho skvamózneho karcinómu, ktorá je známa predovšetkým pre svoj význam pri štúdiu mechanizmov súvisiacich s rakovinou pľúc, najmä s nemalobunkovým karcinómom pľúc (NSCLC). Táto bunková línia sa vyznačuje amplifikáciou génu MET, ktorý je zapojený do onkogénnych signálnych dráh, ktoré podporujú rast nádoru a rezistenciu na liečbu. Aktivácia receptorovej tyrozínkinázy MET, zvyčajne indukovaná hepatocytárnym rastovým faktorom (HGF), zohráva významnú úlohu pri proliferácii, prežívaní a metastázovaní týchto buniek. Aberácie v signalizácii MET sú kľúčové pre agresívny profil nádoru EBC-1, čo z neho robí základný model pre štúdium cielených terapií zameraných na inhibíciu MET.
Vo výskume využívajúcom bunky EBC-1 sa skúmali rôzne mechanizmy rezistencie voči inhibítorom MET, ako je napríklad crizotinib. Táto bunková línia preukázala získanú rezistenciu prostredníctvom ciest zahŕňajúcich reguláciu PAI-1 a epiteliálno-mezenchýmový prechod (EMT), čo prispieva k terapeutickým výzvam. Okrem toho sa ukázalo, že butyrát sodný moduluje expresiu génov v bunkách EBC-1, čo naznačuje potenciálnu užitočnosť inhibítorov históndeacetylázy pri ovplyvňovaní transkripcie génov. Tieto zistenia zdôrazňujú význam EBC-1 vo výskume terapeutickej rezistencie aj vo vývoji nových stratégií liečby rakoviny pľúc s amplifikáciou MET.

Tkanivo	Pľúca
Choroba	Spinocelulárny karcinóm
Miesto metastáz	Koža

Synonymá

- EBC-1/original
- EBC1

KLASIFIKÁCIA

Organizmus	Človek
Sex	Muž
Rastové vlastnosti	Prívrženec
Úroveň biologickej bezpečnosti	1

IDENTIFIKÁTORY

Citácia

EBC-1 (katalógové číslo Cytion 305539)

Daňové identifikačné číslo NCBI	9606
Cellosaurus	CVCL_2891

PREJAV A NÁCHYLNOSŤ

Mutčný profil

Mutácia: Thr681Ile (c.2042C>T), heterozygotná; Mutácia: DDR2, p.Thr681Ile (c.2042C>T), heterozygotná: (c.2573T>G), heterozygotná; mutácia: EGFR, p.Leu858Arg (c.2573T>G): TP53, p.Glu171Ter (c.511G>T), homozygotná

MANIPULÁCIA A KULTIVÁCIA

Kultivačné médium

EMEM (MEM Eagle), w: 2 mM L-Glutamín, w: 2,2 g/L NaHCO3, w: EBSS (Cytion číslo článku 820100a)

Inkubačná atmosféra	37 °C, 5 %CO2, zvlhčená atmosféra.

Doplnky stravy

Doplňte médium o 10% FBS a 1% NEAA

Disociačné činidlo	Accutase

Rozmnožovanie kultúr

Odstráňte staré médium z adherovaných buniek a premyte ich PBS, ktorý neobsahuje vápnik a horčík. Pre banky T25 použite 3 - 5 ml PBS a pre banky T75 použite 5 - 10 ml. Potom bunky úplne pokryte Accutase, pričom použite 1 - 2 ml pre banky T25 a 2,5 ml pre banky T75. Nechajte bunky inkubovať pri izbovej teplote 8-10 minút, aby sa oddelili. Po inkubácii jemne premiešajte bunky s 10 ml média, aby boli znovu suspendované, a potom ich 3 minúty odstreďujte pri 300xg. Supernatant zlikvidujte, bunky znovu rozmiešajte v čerstvom médiu a preneste ich do nových fliaš, ktoré už obsahujú čerstvé médium.

Rozmrazovanie a kultivácia

Confirm that the vial remains deeply frozen upon delivery, as cells are shipped on dry ice to maintain optimal temperatures during transit. Upon receipt, either store the cryovial immediately at temperatures below -150°C to ensure the preservation of cellular integrity, or proceed to step 3 if immediate culturing is required.
For immediate culturing, swiftly thaw the vial by immersing it in a 37°C water bath with clean water and an antimicrobial agent, agitating gently for 40-60 seconds until a small ice clump remains.
Perform all subsequent steps under sterile conditions in a flow hood, disinfecting the cryovial with 70% ethanol before opening.
Carefully open the disinfected vial and transfer the cell suspension into a 15 ml centrifuge tube containing 8 ml of room-temperature culture medium, mixing gently.
Centrifuge the mixture at 300 x g for 3 minutes to separate the cells and carefully discard the supernatant containing residual freezing medium.
Gently resuspend the cell pellet in 10 ml of fresh culture medium. For adherent cells, divide the suspension between two T25 culture flasks; for suspension cultures, transfer all the medium into one T25 flask to promote effective cell interaction and growth.
Adhere to established subculture protocols for continued growth and maintenance of the cell line, ensuring reliable experimental outcomes.

KONTROLA KVALITY A KRYOKONZERVÁCIA

Sterilita

Kontaminácia mykoplazmami sa vylučuje pomocou testov založených na PCR a metód detekcie mykoplaziem založených na luminiscencii. Aby sa zabezpečilo, že nedošlo ku kontaminácii baktériami, hubami alebo kvasinkami, bunkové kultúry sa denne vizuálne kontrolujú.

Mrazové médium	Ako kryokonzervačné médium používame kompletné rastové médium (vrátane FBS) + 10 % DMSO na zabezpečenie primeranej životaschopnosti po rozmrazení alebo CM-1 (katalógové číslo 800100 spoločnosti Cytion), ktoré obsahuje optimalizované osmoprotektanty a metabolické stabilizátory na zlepšenie obnovy a zníženie stresu spôsobeného kryo.

Podmienky skladovania

Na dlhodobé uchovávanie umiestnite injekčné liekovky do kvapalnej fázy dusíka v pare pri teplote približne -150 až -196 °C. Skladovanie pri teplote -80 °C je prijateľné len ako krátky prechodný krok pred presunom do tekutého dusíka.

Dopravné podmienky

Kryokonzervované bunkové línie sa prepravujú na suchom ľade v overených, izolovaných obaloch s dostatočným množstvom chladiva na udržanie teploty približne -78 °C počas celej prepravy. Po prijatí ihneď skontrolujte obal a bezodkladne premiestnite injekčné liekovky do vhodného skladu.

DARCA

Vek darcu	69 rokov
Etnická príslušnosť	Taiwanské

PRÁVNE INFORMÁCIE A BEZPEČNOSŤ

Bezpečnostné opatrenia

Pri plánovaní uskladnenia kryovírusu v kvapalnom dusíku na budúce rozmrazenie je potrebné dodržiavať prísne bezpečnostné opatrenia. Vhodné ochranné rukavice a odev sú nevyhnutné a počas prenosu zmrazených vzoriek do nádrže s tekutým dusíkom alebo z nej sa vyžaduje používanie tvárovej masky alebo ochranných okuliarov. Je to z dôvodu zníženia rizika poranenia v dôsledku možnej explózie kryovírusu pri vyberaní, ktorá môže mať za následok vymrštenie ostrých úlomkov.

Záruka

V spoločnosti Cytion si stojíme za kvalitou a životaschopnosťou našich produktov.
Garantujeme, že naše bunky budú životaschopné na začiatku kultivácie počas 60 dní po odoslaní z našich zariadení.
Zaručujeme, že všetky materiály zodpovedajú špecifikáciám opísaným v certifikáte analýzy a/alebo v produktovom liste
Úplné informácie nájdete v našom <a href=""/Kto sme/záruka/"" hreflang=""x-default"">Vyhlásení o záruke

Je potrebná dohoda o prenose materiálu	Yes