EFM-19

305540

ΓΕΝΙΚΈΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΊΕΣ

Περιγραφή

Η EFM-19 είναι μια σειρά κυττάρων ανθρώπινου καρκίνου του μαστού θετική στον υποδοχέα οιστρογόνων (ER+), η οποία έχει χρησιμοποιηθεί για τη μελέτη των επιδράσεων των οιστρογόνων και των αντιστοιχικών, όπως η ταμοξιφαίνη, στην έκφραση γονιδίων. Αυτή η σειρά κυττάρων παρουσιάζει ισχυρή ανταπόκριση στη διέγερση από οιστρογόνα, η οποία ρυθμίζει την έκφραση διαφόρων RNA που ρυθμίζονται από τα οιστρογόνα. Αξίζει να σημειωθεί ότι τα κύτταρα EFM-19 εκφράζουν υψηλότερα επίπεδα mRNA του υποδοχέα οιστρογόνων σε σύγκριση με άλλες κυτταρικές σειρές καρκίνου του μαστού, όπως η MCF-7.
Η έρευνα σχετικά με την EFM-19 έχει αναδείξει το μοναδικό προφίλ έκφρασης RNA που ρυθμίζεται από τα οιστρογόνα. Για παράδειγμα, έχει αποδειχθεί ότι RNA όπως τα pNR-1, pNR-2, pNR-25 και pNR-100 επάγονται από την οιστραδιόλη. Αυτή η επαγωγή κυμαίνεται από μέτρια (3 φορές για το pNR-100) έως σημαντική (πάνω από 100 φορές για το pNR-2). Είναι ενδιαφέρον ότι η απόκριση αυτών των RNA στην ταμοξιφαίνη ποικίλλει· ενώ η ταμοξιφαίνη δρα ως μερικός αγωνιστής οιστρογόνων για ορισμένα RNA (π.χ. το pNR-1), η αποτελεσματικότητά της είναι χαμηλότερη για άλλα (π.χ. το pNR-2). Αυτή η κυτταρική σειρά είναι επομένως πολύτιμη για τη μελέτη των διαφοροποιημένων επιδράσεων των οιστρογόνων και των αντιοιστρογόνων στη ρύθμιση των γονιδίων.
Τα κύτταρα EFM-19 ξεχωρίζουν επίσης για τη χρήση τους στην έρευνα που διερευνά τους ευρύτερους ρόλους των οιστρογόνων στη βιολογία του καρκίνου του μαστού. Τα προφίλ έκφρασής τους συμβάλλουν στην κατανόηση του τρόπου με τον οποίο τα οιστρογόνα και η σηματοδότηση των υποδοχέων οιστρογόνων επηρεάζουν την ογκογένεση και τις ανταποκρίσεις στη θεραπεία. Αυτή η κυτταρική σειρά, μαζί με άλλες όπως η MCF-7, συμβάλλει στην αποκάλυψη των μηχανισμών που καθοδηγούνται από τα οιστρογόνα, προσφέροντας ενδεχομένως πληροφορίες για θεραπευτικές στρατηγικές που περιλαμβάνουν ορμονικές παρεμβάσεις.

Ιστός	Στήθος
Ασθένεια	Καρκίνωμα του μαστού
Θέση μετάστασης	Υπεζωκοτική συλλογή

Συνώνυμα

- EFM19

ΤΑΞΙΝΌΜΗΣΗ

Οργανισμός	Άνθρωπος
Σεξ	Γυναίκα
Ιδιότητες ανάπτυξης	Πιστός
Επίπεδο βιοασφάλειας	1

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΆ

Μορφολογία	Επιθηλιοειδής

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΆ

Παραπομπή

EFM-19 (αριθμός καταλόγου Cytion 305540)

Αριθμός φορολογικού μητρώου NCBI	9606
Κελλοσαύρος	CVCL_0253

Cytion GmbH
Nikola-Tesla-Str. 3
69124 Heidelberg
Tel: +49 (0)6221 405780
info@cytion.com
cytion.com

Registered office Heidelberg
VAT ID: DE283292917
Local court Mannheim - HRB 714394
CEO / Geschäftsführer: Jonathan Steubing

Banking information
Sparkasse Heidelberg
IBAN: DE35 6725 0020 0009 2076 86
BIC: SOLADES1HDB

ΈΚΦΡΑΣΗ ΚΑΙ ΕΥΑΙΣΘΗΣΊΑ

Έκφραση αντιγόνου

HER2+, ER++, AR++, PR++

Προφίλ μεταλλάξεων

Μεταλλαγή: PIK3CA, p.His1047Leu (c.3140A>T), ομόζυγη· Μεταλλαγή: TP53, p.His193Arg (c.578A>G), ομόζυγη

ΧΕΙΡΙΣΜΌΣ ΚΑΙ ΚΑΛΛΙΈΡΓΕΙΑ

Θρεπτικό μέσο

RPMI 1640, w: 2,0 mM σταθερής γλουταμίνης, w: 2,0 g/L NaHCO3 (αριθμός άρθρου Cytion 820700a)

Ατμόσφαιρα επώασης	37°C, 5%CO2, υγροποιημένη ατμόσφαιρα.

Συμπληρώματα

Συμπληρώστε το μέσο με 20% FBS

Αντιδραστήριο αποσύνδεσης	Accutase

Αναπαραγωγή σε υποκαλλιέργεια

Αφαιρέστε το παλιό μέσο από τα προσκολλημένα κύτταρα και πλύντε τα με PBS που δεν περιέχει ασβέστιο και μαγνήσιο. Για φιάλες T25, χρησιμοποιήστε 3-5 ml PBS και για φιάλες T75, χρησιμοποιήστε 5-10 ml. Στη συνέχεια, καλύψτε πλήρως τα κύτταρα με Accutase, χρησιμοποιώντας 1-2 ml για φιάλες T25 και 2,5 ml για φιάλες T75. Αφήστε τα κύτταρα να επωαστούν σε θερμοκρασία δωματίου για 8-10 λεπτά για να αποκολληθούν. Μετά την επώαση, αναμείξτε απαλά τα κύτταρα με 10 ml μέσου για να ανασυσταθούν και, στη συνέχεια, φυγοκεντρίστε στα 300xg για 3 λεπτά. Απορρίψτε το υπερκείμενο υγρό, ανασυστάστε τα κύτταρα σε φρέσκο μέσο και μεταφέρετέ τα σε νέες φιάλες που περιέχουν ήδη φρέσκο μέσο.

Ανανέωση υγρών	Διαχωρίστε την συνεκτική καλλιέργεια 2 φορές την εβδομάδα.

Απόψυξη και καλλιέργεια

Confirm that the vial remains deeply frozen upon delivery, as cells are shipped on dry ice to maintain optimal temperatures during transit. Upon receipt, either store the cryovial immediately at temperatures below -150°C to ensure the preservation of cellular integrity, or proceed to step 3 if immediate culturing is required.
For immediate culturing, swiftly thaw the vial by immersing it in a 37°C water bath with clean water and an antimicrobial agent, agitating gently for 40-60 seconds until a small ice clump remains.
Perform all subsequent steps under sterile conditions in a flow hood, disinfecting the cryovial with 70% ethanol before opening.
Carefully open the disinfected vial and transfer the cell suspension into a 15 ml centrifuge tube containing 8 ml of room-temperature culture medium, mixing gently.
Centrifuge the mixture at 300 x g for 3 minutes to separate the cells and carefully discard the supernatant containing residual freezing medium.
Gently resuspend the cell pellet in 10 ml of fresh culture medium. For adherent cells, divide the suspension between two T25 culture flasks; for suspension cultures, transfer all the medium into one T25 flask to promote effective cell interaction and growth.
Adhere to established subculture protocols for continued growth and maintenance of the cell line, ensuring reliable experimental outcomes.

ΈΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΌΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΚΡΥΟΣΥΝΤΉΡΗΣΗ

Στειρότητα

Η μόλυνση από μυκόπλασμα αποκλείεται με τη χρήση τόσο των δοκιμασιών που βασίζονται στην PCR όσο και των μεθόδων ανίχνευσης μυκοπλάσματος με βάση τη φωταύγεια.
Για να διασφαλιστεί ότι δεν υπάρχει μόλυνση από βακτήρια, μύκητες ή ζύμες, οι κυτταροκαλλιέργειες υποβάλλονται σε καθημερινές οπτικές επιθεωρήσεις.

Μέσο κατάψυξης	Ως μέσο κρυοσυντήρησης, χρησιμοποιούμε πλήρες μέσο ανάπτυξης (συμπεριλαμβανομένου του FBS) + 10% DMSO για επαρκή βιωσιμότητα μετά την απόψυξη, ή CM-1 (αριθμός καταλόγου Cytion 800100), το οποίο περιλαμβάνει βελτιστοποιημένα ωσμοπροστατευτικά και μεταβολικούς σταθεροποιητές για την ενίσχυση της ανάκαμψης και τη μείωση του στρες που προκαλείται από την κρυοσυντήρηση.

Συνθήκες αποθήκευσης

Για μακροχρόνια συντήρηση, τοποθετήστε τα φιαλίδια σε υγρό άζωτο σε φάση ατμών σε θερμοκρασία περίπου -150 έως -196 °C. Η αποθήκευση στους -80 °C είναι αποδεκτή μόνο ως σύντομο ενδιάμεσο βήμα πριν από τη μεταφορά σε υγρό άζωτο.

Όροι αποστολής

Οι κρυοσυντηρημένες κυτταρικές σειρές αποστέλλονται σε ξηρό πάγο σε επικυρωμένη, μονωμένη συσκευασία με επαρκές ψυκτικό μέσο για τη διατήρηση περίπου των -78 °C καθ' όλη τη διάρκεια της μεταφοράς. Κατά την παραλαβή, επιθεωρήστε αμέσως τον περιέκτη και μεταφέρετε τα φιαλίδια χωρίς καθυστέρηση στην κατάλληλη αποθήκη.

ΔΩΡΗΤΉΣ

Ηλικία δωρητή	50 χρόνια

ΝΟΜΙΚΆ ΘΈΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΣΦΆΛΕΙΑ

Μέτρα ασφαλείας

Όταν σχεδιάζετε να αποθηκεύσετε ένα κρυοφιαλίδιο σε υγρό άζωτο για μελλοντική απόψυξη, είναι υποχρεωτικό να τηρείτε αυστηρά μέτρα ασφαλείας. Τα κατάλληλα προστατευτικά γάντια και ο κατάλληλος προστατευτικός ρουχισμός είναι απαραίτητα, ενώ απαιτείται η χρήση μάσκας προσώπου ή γυαλιών ασφαλείας κατά τη μεταφορά κατεψυγμένων δειγμάτων προς ή από τη δεξαμενή υγρού αζώτου. Αυτό γίνεται για να μετριαστεί ο κίνδυνος τραυματισμού από πιθανές εκρήξεις κρυοσωλήνων κατά την απομάκρυνση, οι οποίες μπορεί να οδηγήσουν στην προβολή αιχμηρών θραυσμάτων.

Εγγύηση

Στην Cytion, υποστηρίζουμε την ποιότητα και τη βιωσιμότητα των προϊόντων μας.
Εγγυόμαστε ότι τα κύτταρά μας θα είναι βιώσιμα κατά την έναρξη της καλλιέργειας για 60 ημέρες μετά την αποστολή από τις εγκαταστάσεις μας.
Διαβεβαιώνουμε ότι όλα τα υλικά συμμορφώνονται με τις προδιαγραφές που περιγράφονται στο Πιστοποιητικό Ανάλυσης ή/και στο Φύλλο Προϊόντος
Για πλήρεις λεπτομέρειες, ανατρέξτε στην <a href=""/Who-we-are/Warranty/"" hreflang=""""x-default"""">Δήλωση εγγύησης

Απαιτείται συμφωνία μεταφοράς υλικού	Yes