EFM-19

305540

GENERAL INFORMATION

Description

A EFM-19 é uma linhagem celular de câncer de mama humano positiva para o receptor de estrogênio (ER+) que tem sido utilizada para investigar os efeitos do estrogênio e de antiestrogênios, como o tamoxifeno, na expressão gênica. Essa linhagem celular apresenta uma resposta robusta à estimulação pelo estrogênio, o que modula a expressão de vários RNAs regulados pelo estrogênio. Notavelmente, as células EFM-19 expressam níveis mais elevados de mRNA do receptor de estrogênio em comparação com outras linhagens celulares de câncer de mama, como a MCF-7.
Pesquisas sobre a EFM-19 destacaram seu perfil único de expressão de RNAs regulados pelo estrogênio. Por exemplo, demonstrou-se que RNAs como pNR-1, pNR-2, pNR-25 e pNR-100 são induzidos pelo estradiol. Essa indução varia de moderada (3 vezes para o pNR-100) a significativa (mais de 100 vezes para o pNR-2). Curiosamente, a resposta desses RNAs ao tamoxifeno varia; enquanto o tamoxifeno atua como um agonista parcial do estrogênio para alguns RNAs (por exemplo, o pNR-1), sua eficácia é menor para outros (por exemplo, o pNR-2). Essa linhagem celular é, portanto, valiosa para o estudo dos efeitos diferenciados do estrogênio e dos antiestrogênios na regulação gênica.
As células EFM-19 também se destacam por sua aplicação em pesquisas que exploram os papéis mais amplos do estrogênio na biologia do câncer de mama. Seus perfis de expressão contribuem para a compreensão de como o estrogênio e a sinalização do receptor de estrogênio afetam a tumorigênese e as respostas ao tratamento. Essa linhagem celular, juntamente com outras, como a MCF-7, auxilia no desvendamento de mecanismos impulsionados pelo estrogênio, podendo orientar estratégias terapêuticas que incluem intervenções hormonais.

Tissue	Mama
Disease	Carcinoma ductal da mama
Metastatic site	Derrame pleural

Synonyms

- EFM19

CLASSIFICATION

Organism	Human
Sex	Female
Growth properties	Adherent
Biosafety level	1

CHARACTERISTICS

Morphology	De tipo epitelial

IDENTIFIERS

Citation

EFM-19 (número de catálogo da Cytion 305540)

NCBI TaxID	9606
Cellosaurus	CVCL_0253

EXPRESSION AND SUSCEPTIBILITY

Antigen expression

HER2+, ER++, AR++, PR++

Mutational profile

Mutação: PIK3CA, p.His1047Leu (c.3140A>T), homozigótica; Mutação: TP53, p.His193Arg (c.578A>G), homozigótica

HANDLING AND CULTURE

Culture medium

RPMI 1640, com 2,0 mM de glutamina estável e 2,0 g/L de $NaHCO_3$ (número de artigo da Cytion: 820700a)

Incubation atmosphere	37 °C, 5% de CO_2, atmosfera umidificada.

Supplements

Adicione 20% de FBS ao meio

Dissociation reagent	Accutase

Subculturing

Remova o meio antigo das células aderentes e lave-as com PBS sem cálcio nem magnésio. Para frascos T25, use 3 a 5 ml de PBS; para frascos T75, use 5 a 10 ml. Em seguida, cubra as células completamente com Accutase, utilizando 1 a 2 ml para frascos T25 e 2,5 ml para frascos T75. Deixe as células incubarem à temperatura ambiente por 8 a 10 minutos para que se desprendam. Após a incubação, misture delicadamente as células com 10 ml de meio para ressuspender, depois centrifugue a 300xg por 3 minutos. Descarte o sobrenadante, ressuspenda as células em meio fresco e transfira-as para novos frascos que já contenham meio fresco.

Fluid renewal	Divida a cultura confluente duas vezes por semana.

Thawing and culturing

Confirm that the vial remains deeply frozen upon delivery, as cells are shipped on dry ice to maintain optimal temperatures during transit.
Upon receipt, either store the cryovial immediately at temperatures below -150°C to ensure the preservation of cellular integrity, or proceed to step 3 if immediate culturing is required.
For immediate culturing, swiftly thaw the vial by immersing it in a 37°C water bath with clean water and an antimicrobial agent, agitating gently for 40-60 seconds until a small ice clump remains.
Perform all subsequent steps under sterile conditions in a flow hood, disinfecting the cryovial with 70% ethanol before opening.
Carefully open the disinfected vial and transfer the cell suspension into a 15 ml centrifuge tube containing 8 ml of room-temperature culture medium, mixing gently.
Centrifuge the mixture at 300 x g for 3 minutes to separate the cells and carefully discard the supernatant containing residual freezing medium.
Gently resuspend the cell pellet in 10 ml of fresh culture medium. For adherent cells, divide the suspension between two T25 culture flasks; for suspension cultures, transfer all the medium into one T25 flask to promote effective cell interaction and growth.
Adhere to established subculture protocols for continued growth and maintenance of the cell line, ensuring reliable experimental outcomes.

QUALITY CONTROL AND CRYOPRESERVATION

Sterility

A contaminação por micoplasma é descartada por meio de ensaios baseados em PCR e de métodos de detecção de micoplasma baseados em luminescência.
Para garantir que não haja contaminação por bactérias, fungos ou leveduras, as culturas celulares são submetidas a inspeções visuais diárias.

Freeze medium	Como meio de criopreservação, utilizamos meio de crescimento completo (incluindo FBS) + 10% de DMSO para garantir viabilidade adequada após o descongelamento, ou CM-1 (número de catálogo da Cytion 800100), que inclui osmoprotetores e estabilizadores metabólicos otimizados para melhorar a recuperação e reduzir o estresse induzido pela criopreservação.

Storage conditions

Para preservação a longo prazo, coloque os frascos em nitrogênio líquido em fase de vapor a uma temperatura entre aproximadamente −150 e −196 °C. O armazenamento a −80 °C é aceitável apenas como uma etapa intermediária de curta duração antes da transferência para o nitrogênio líquido.

Shipping conditions

As linhagens celulares criopreservadas são enviadas em gelo seco, em embalagens isoladas e validadas, com refrigerante suficiente para manter a temperatura em aproximadamente −78 °C durante todo o transporte. Ao receber a remessa, inspecione o recipiente imediatamente e transfira os frascos sem demora para o local de armazenamento adequado.

DONOR

Donor age	50 anos

LEGAL AND SAFETY

Safety precautions

Ao planejar o armazenamento de um criotubo em nitrogênio líquido para descongelamento futuro, é obrigatório seguir medidas de segurança rigorosas. É essencial o uso de luvas e roupas de proteção adequadas, além do uso obrigatório de máscara facial ou óculos de proteção durante a transferência de amostras congeladas para dentro ou para fora do tanque de nitrogênio líquido. Isso visa mitigar o risco de ferimentos decorrentes de possíveis explosões dos criotubos durante a remoção, o que pode resultar na projeção de fragmentos pontiagudos.

Warranty

Na Cytion, garantimos a qualidade e a viabilidade de nossos produtos.
Garantimos que nossas células permanecerão viáveis no início da cultura por
60 dias após o envio de nossas instalações.
Asseguramos que todos os materiais estão em conformidade com as especificações descritas no
Certificado de Análise e/ou na Ficha Técnica do Produto.
Para obter todos os detalhes, consulte nossa
Declaração de Garantia.

Material Transfer Agreement required	Yes