EFM-19

305540

VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE

Popis

EFM-19 je ľudská bunková línia rakoviny prsníka s pozitívnym estrogénovým receptorom (ER+), ktorá sa využíva na skúmanie vplyvu estrogénu a antiestrogénov, ako je napríklad tamoxifén, na génovú expresiu. Táto bunková línia vykazuje výraznú odozvu na stimuláciu estrogénom, čo moduluje expresiu rôznych estrogénom regulovaných RNA. Je zaujímavé, že bunky EFM-19 exprimujú vyššie hladiny mRNA estrogénového receptora v porovnaní s inými bunkovými líniami rakoviny prsníka, ako je napríklad MCF-7.
Výskum EFM-19 poukázal na jej jedinečný profil expresie RNA regulovanej estrogénom. Ukázalo sa napríklad, že RNA, ako sú pNR-1, pNR-2, pNR-25 a pNR-100, sú indukované estradiolom. Táto indukcia sa pohybuje od miernej (3-násobná u pNR-100) po výraznú (viac ako 100-násobná u pNR-2). Zaujímavé je, že reakcia týchto RNA na tamoxifén sa líši; zatiaľ čo tamoxifén pôsobí ako čiastočný agonista estrogénu u niektorých RNA (napr. pNR-1), u iných (napr. pNR-2) je jeho účinnosť nižšia. Táto bunková línia je preto cenná pre štúdium diferencovaných účinkov estrogénu a antiestrogénov na reguláciu génov.
Bunky EFM-19 sú tiež významné vďaka svojmu využitiu vo výskume, ktorý skúma širšie úlohy estrogénu v biológii rakoviny prsníka. Ich expresné profily prispievajú k pochopeniu toho, ako estrogén a signalizácia estrogénových receptorov ovplyvňujú tumorigenézu a reakcie na liečbu. Táto bunková línia, spolu s ďalšími, ako je MCF-7, pomáha odhaľovať mechanizmy riadené estrogénom, čo môže prispieť k tvorbe terapeutických stratégií zahŕňajúcich hormonálne intervencie.

Tkanivo	Prsia
Choroba	Duktálny karcinóm prsníka
Miesto metastáz	Pleurálny výpotok

Synonymá

- EFM19

KLASIFIKÁCIA

Organizmus	Človek
Sex	Žena
Rastové vlastnosti	Prívrženec
Úroveň biologickej bezpečnosti	1

CHARAKTERISTIKY

Morfológia	Epitelu podobné

IDENTIFIKÁTORY

Citácia

EFM-19 (katalógové číslo Cytion 305540)

Daňové identifikačné číslo NCBI	9606
Cellosaurus	CVCL_0253

PREJAV A NÁCHYLNOSŤ

Expresia antigénu

HER2+, ER++, AR++, PR++

Mutčný profil

Mutácia: PIK3CA, p.His1047Leu (c.3140A>T), homozygotná; Mutácia: TP53, p.His193Arg (c.578A>G), homozygotná

MANIPULÁCIA A KULTIVÁCIA

Kultivačné médium

RPMI 1640, w: 2,0 mM stabilný glutamín, w: 2,0 g/L $NaHCO_3$ (číslo výrobku Cytion 820700a)

Inkubačná atmosféra	37 °C, 5 %CO_2, zvlhčená atmosféra.

Doplnky stravy

Doplňte médium o 20 % FBS

Disociačné činidlo	Accutase

Rozmnožovanie kultúr

Odstráňte staré médium z adherovaných buniek a premyte ich PBS, ktorý neobsahuje vápnik a horčík. Pre banky T25 použite 3 - 5 ml PBS a pre banky T75 použite 5 - 10 ml. Potom bunky úplne pokryte Accutase, pričom použite 1 - 2 ml pre banky T25 a 2,5 ml pre banky T75. Nechajte bunky inkubovať pri izbovej teplote 8-10 minút, aby sa oddelili. Po inkubácii jemne premiešajte bunky s 10 ml média, aby boli znovu suspendované, a potom ich 3 minúty odstreďujte pri 300xg. Supernatant zlikvidujte, bunky znovu rozmiešajte v čerstvom médiu a preneste ich do nových fliaš, ktoré už obsahujú čerstvé médium.

Obnova kvapaliny	Rozdeľujte konfluentnú kultúru dvakrát týždenne.

Rozmrazovanie a kultivácia

Confirm that the vial remains deeply frozen upon delivery, as cells are shipped on dry ice to maintain optimal temperatures during transit.
Upon receipt, either store the cryovial immediately at temperatures below -150°C to ensure the preservation of cellular integrity, or proceed to step 3 if immediate culturing is required.
For immediate culturing, swiftly thaw the vial by immersing it in a 37°C water bath with clean water and an antimicrobial agent, agitating gently for 40-60 seconds until a small ice clump remains.
Perform all subsequent steps under sterile conditions in a flow hood, disinfecting the cryovial with 70% ethanol before opening.
Carefully open the disinfected vial and transfer the cell suspension into a 15 ml centrifuge tube containing 8 ml of room-temperature culture medium, mixing gently.
Centrifuge the mixture at 300 x g for 3 minutes to separate the cells and carefully discard the supernatant containing residual freezing medium.
Gently resuspend the cell pellet in 10 ml of fresh culture medium. For adherent cells, divide the suspension between two T25 culture flasks; for suspension cultures, transfer all the medium into one T25 flask to promote effective cell interaction and growth.
Adhere to established subculture protocols for continued growth and maintenance of the cell line, ensuring reliable experimental outcomes.

KONTROLA KVALITY A KRYOKONZERVÁCIA

Sterilita

Kontaminácia mykoplazmami sa vylučuje pomocou testov založených na PCR a metód detekcie mykoplaziem založených na luminiscencii. Aby sa zabezpečilo, že nedošlo ku kontaminácii baktériami, hubami alebo kvasinkami, bunkové kultúry sa denne vizuálne kontrolujú.

Mrazové médium	Ako kryokonzervačné médium používame kompletné rastové médium (vrátane FBS) + 10 % DMSO na zabezpečenie primeranej životaschopnosti po rozmrazení alebo CM-1 (katalógové číslo 800100 spoločnosti Cytion), ktoré obsahuje optimalizované osmoprotektanty a metabolické stabilizátory na zlepšenie obnovy a zníženie stresu spôsobeného kryo.

Podmienky skladovania

Na dlhodobé uchovávanie umiestnite injekčné liekovky do kvapalnej fázy dusíka v pare pri teplote približne -150 až -196 °C. Skladovanie pri teplote -80 °C je prijateľné len ako krátky prechodný krok pred presunom do tekutého dusíka.

Dopravné podmienky

Kryokonzervované bunkové línie sa prepravujú na suchom ľade v overených, izolovaných obaloch s dostatočným množstvom chladiva na udržanie teploty približne -78 °C počas celej prepravy. Po prijatí ihneď skontrolujte obal a bezodkladne premiestnite injekčné liekovky do vhodného skladu.

DARCA

Vek darcu	50 rokov

PRÁVNE INFORMÁCIE A BEZPEČNOSŤ

Bezpečnostné opatrenia

Pri plánovaní uskladnenia kryovírusu v kvapalnom dusíku na budúce rozmrazenie je potrebné dodržiavať prísne bezpečnostné opatrenia. Vhodné ochranné rukavice a odev sú nevyhnutné a počas prenosu zmrazených vzoriek do nádrže s tekutým dusíkom alebo z nej sa vyžaduje používanie tvárovej masky alebo ochranných okuliarov. Je to z dôvodu zníženia rizika poranenia v dôsledku možnej explózie kryovírusu pri vyberaní, ktorá môže mať za následok vymrštenie ostrých úlomkov.

Záruka

V spoločnosti Cytion si stojíme za kvalitou a životaschopnosťou našich produktov.
Garantujeme, že naše bunky budú životaschopné na začiatku kultivácie počas 60 dní po odoslaní z našich zariadení.
Zaručujeme, že všetky materiály zodpovedajú špecifikáciám opísaným v certifikáte analýzy a/alebo v produktovom liste
Úplné informácie nájdete v našom <a href=""/Kto sme/záruka/"" hreflang=""x-default"">Vyhlásení o záruke

Je potrebná dohoda o prenose materiálu	Yes