HCC1143

305545

GENERAL INFORMATION

Description

La línea celular HCC1143 se deriva de un cáncer de mama triple negativo (TNBC) humano, que carece específicamente de la expresión del receptor de estrógeno (ER), del receptor de progesterona (PR) y de HER2. Esta línea celular es conocida por su uso en la modelación de fenotipos agresivos de cáncer de mama y en la comprensión de los mecanismos subyacentes a la resistencia al tratamiento. La línea HCC1143 presenta características distintivas, entre ellas la heterogeneidad en las subpoblaciones celulares, lo que contribuye a su relevancia en investigaciones centradas en la plasticidad fenotípica y las transiciones de estado de las células tumorales. Los estudios que utilizan la línea HCC1143 han demostrado que los diferentes estados celulares dentro de la línea pueden transicionar entre los estados de diferenciación luminal, basal y mesenquimal bajo presiones terapéuticas, lo que resalta su papel en el estudio de los cambios fenotípicos inducidos por la terapia y los mecanismos de resistencia a los fármacos.
Las células HCC1143 se han utilizado en diversos contextos experimentales, incluyendo investigaciones sobre los mecanismos de resistencia a agentes quimioterapéuticos como el paclitaxel. La secuenciación de ARN de célula única (scRNA-seq) ha revelado subpoblaciones con perfiles de expresión génica diferenciados relacionados con la resistencia al tratamiento. Por ejemplo, subpoblaciones específicas como las células AKR1C3+, IDO1+ y HEY1+ han mostrado una mayor representación tras un tratamiento prolongado con paclitaxel, lo que sugiere su papel como fenotipos resistentes a los fármacos. Estos subtipos están asociados con vías que involucran especies reactivas de oxígeno (ROS), respuestas inflamatorias y regulación del ciclo celular, lo que indica adaptaciones complejas que facilitan la supervivencia bajo estrés quimioterapéutico.
La investigación sobre la línea celular HCC1143 también se ha extendido a estudios de terapia dirigida. La aplicación de inhibidores dirigidos a componentes como ADAM-17 ha demostrado potencial para reducir la invasividad y la proliferación de esta línea celular, lo que respalda su uso como modelo para evaluar nuevas estrategias contra el cáncer. Estos hallazgos resaltan el valor de HCC1143 para explorar tanto las respuestas terapéuticas como la dinámica celular subyacente que impulsa la resistencia a los medicamentos en el cáncer de mama triple negativo (TNBC).

Tissue	Mama
Disease	Carcinoma

Synonyms

- HCC-1143
- Hamon Cancer Center 1144

CLASSIFICATION

Organism	Human
Sex	Female
Growth properties	Adherent
Biosafety level	1

CHARACTERISTICS

Morphology	De tipo epitelial
Cell type	Célula epitelial

Cytion GmbH
Nikola-Tesla-Str. 3
69124 Heidelberg
Tel: +49 (0)6221 405780
info@cytion.com
cytion.com

Registered office Heidelberg
VAT ID: DE283292917
Local court Mannheim - HRB 714394
CEO / Geschäftsführer: Jonathan Steubing

Banking information
Sparkasse Heidelberg
IBAN: DE35 6725 0020 0009 2076 86
BIC: SOLADES1HDB

IDENTIFIERS

Citation

HCC1143 (número de catálogo de Cytion 305545)

NCBI TaxID	9606
Cellosaurus	CVCL_1245

EXPRESSION AND SUSCEPTIBILITY

Protein expression

Glicoproteína epitelial 2 (EGP2), citoqueratina 19

Oncogenes

Her2/neu negativo, p53 positivo

Mutational profile

Mutación: TP53, p.Arg248Gln (c.743G>A), homocigótica

HANDLING AND CULTURE

Culture medium

RPMI 1640, con 2,0 mM de glutamina estable y 2,0 g/L de $NaHCO_3$ (número de artículo de Cytion: 820700a)

Incubation atmosphere	37 °C, 5 % de CO_2, atmósfera humidificada.

Supplements

Añade al medio un 10 % de FBS

Dissociation reagent	Accutase

Subculturing

Retira el medio usado de las células adheridas y lávalas con PBS sin calcio ni magnesio. Para los frascos T25, usa de 3 a 5 ml de PBS, y para los frascos T75, usa de 5 a 10 ml. Luego, cubra las células por completo con TrypLE Express, utilizando de 1 a 2 ml para los frascos T25 y 2,5 ml para los frascos T75. Deje que las células se incuben a temperatura ambiente durante 8 a 10 minutos para desprenderse. Después de la incubación, mezcla suavemente las células con 10 ml de medio para resuspendarlas y, a continuación, centrifuga a 300xg durante 3 minutos. Deseche el sobrenadante, resuspenda las células en medio fresco y transfiéralas a frascos nuevos que ya contengan medio fresco.

Fluid renewal	De 3 a 4 veces por semana

Thawing and culturing

Confirm that the vial remains deeply frozen upon delivery, as cells are shipped on dry ice to maintain optimal temperatures during transit.
Upon receipt, either store the cryovial immediately at temperatures below -150°C to ensure the preservation of cellular integrity, or proceed to step 3 if immediate culturing is required.
For immediate culturing, swiftly thaw the vial by immersing it in a 37°C water bath with clean water and an antimicrobial agent, agitating gently for 40-60 seconds until a small ice clump remains.
Perform all subsequent steps under sterile conditions in a flow hood, disinfecting the cryovial with 70% ethanol before opening.
Carefully open the disinfected vial and transfer the cell suspension into a 15 ml centrifuge tube containing 8 ml of room-temperature culture medium, mixing gently.
Centrifuge the mixture at 300 x g for 3 minutes to separate the cells and carefully discard the supernatant containing residual freezing medium.
Gently resuspend the cell pellet in 10 ml of fresh culture medium. For adherent cells, divide the suspension between two T25 culture flasks; for suspension cultures, transfer all the medium into one T25 flask to promote effective cell interaction and growth.
Adhere to established subculture protocols for continued growth and maintenance of the cell line, ensuring reliable experimental outcomes.

QUALITY CONTROL AND CRYOPRESERVATION

Sterility

Se descarta la contaminación por micoplasmas mediante ensayos basados en PCR y métodos de detección de micoplasmas basados en luminiscencia.
Para garantizar que no haya contaminación bacteriana, fúngica o por levaduras, los cultivos celulares se someten a inspecciones visuales diarias.

Freeze medium	Como medio de criopreservación, utilizamos un medio de crecimiento completo (que incluye FBS) + 10 % de DMSO para garantizar una viabilidad adecuada tras la descongelación, o CM-1 (número de catálogo de Cytion 800100), que incluye osmoprotectores y estabilizadores metabólicos optimizados para mejorar la recuperación y reducir el estrés inducido por la criopreservación.

Storage conditions

Para la conservación a largo plazo, coloque los viales en nitrógeno líquido en fase de vapor a una temperatura de entre −150 y −196 °C, aproximadamente. El almacenamiento a −80 °C solo es aceptable como un paso intermedio breve antes de transferirlos al nitrógeno líquido.

Shipping conditions

Las líneas celulares criopreservadas se envían en hielo seco, en un embalaje aislante validado que contiene suficiente refrigerante para mantener una temperatura de aproximadamente −78 °C durante todo el transporte. Al recibir el envío, revise el contenedor de inmediato y traslade los viales sin demora al lugar de almacenamiento adecuado.

DONOR

Donor age	52 años
Ethnicity	caucásico

LEGAL AND SAFETY

Safety precautions

Cuando se planea almacenar un criovial en nitrógeno líquido para su descongelación futura, es obligatorio cumplir con estrictas medidas de seguridad. Es esencial contar con guantes y ropa de protección adecuados, y se requiere el uso de una mascarilla o lentes de seguridad durante la transferencia de muestras congeladas hacia o desde el tanque de nitrógeno líquido. Esto tiene como objetivo mitigar el riesgo de lesiones por posibles explosiones de los criotubos al retirarlos, lo que puede provocar la proyección de fragmentos afilados.

Warranty

En Cytion, respaldamos la calidad y la viabilidad de nuestros productos.
Garantizamos que nuestras células serán viables al inicio del cultivo durante
60 días a partir de la fecha de envío desde nuestras instalaciones.
Aseguramos que todos los materiales cumplen con las especificaciones descritas en el
Certificado de Análisis y/o la Ficha del Producto.
Para obtener más detalles, consulte nuestra
Declaración de garantía.

Material Transfer Agreement required	Yes