HCC1143

305545

GENERAL INFORMATION

Description

A linhagem celular HCC1143 é derivada de um câncer de mama triplo-negativo (TNBC) humano, que apresenta ausência específica do receptor de estrogênio (ER), do receptor de progesterona (PR) e da expressão de HER2. Essa linhagem celular é conhecida por seu uso na modelagem de fenótipos agressivos do câncer de mama e na compreensão dos mecanismos subjacentes à resistência ao tratamento. A HCC1143 apresenta características distintas, incluindo heterogeneidade nas subpopulações celulares, o que contribui para sua relevância em pesquisas focadas na plasticidade fenotípica e nas transições de estado das células tumorais. Estudos que utilizaram a HCC1143 demonstraram que diferentes estados celulares dentro da linhagem podem transitar entre os estados de diferenciação luminal, basal e mesenquimal sob pressões terapêuticas, destacando seu papel no estudo de alterações fenotípicas induzidas por terapia e dos mecanismos de resistência a medicamentos.
As células HCC1143 têm sido utilizadas em vários contextos experimentais, incluindo investigações sobre mecanismos de resistência a agentes quimioterápicos como o paclitaxel. O sequenciamento de RNA de célula única (scRNA-seq) revelou subpopulações com perfis diferenciados de expressão gênica associados à resistência ao tratamento. Por exemplo, subpopulações específicas, como as células AKR1C3+, IDO1+ e HEY1+, apresentaram maior representatividade após tratamento prolongado com paclitaxel, sugerindo seu papel como fenótipos resistentes a medicamentos. Esses subtipos estão associados a vias que envolvem espécies reativas de oxigênio (ROS), respostas inflamatórias e regulação do ciclo celular, indicando adaptações complexas que facilitam a sobrevivência sob estresse quimioterápico.
A pesquisa sobre a HCC1143 também se estendeu a estudos de terapia direcionada. A aplicação de inibidores direcionados a componentes como o ADAM-17 demonstrou potencial na redução da invasividade e da proliferação dessa linhagem celular, corroborando sua aplicação como modelo para o teste de novas estratégias anticâncer. Essas descobertas ressaltam o valor da HCC1143 para a exploração tanto das respostas terapêuticas quanto da dinâmica celular subjacente que impulsiona a resistência aos medicamentos no TNBC.

Tissue	Mama
Disease	Carcinoma

Synonyms

- HCC-1143
- Hamon Cancer Center 1144

CLASSIFICATION

Organism	Human
Sex	Female
Growth properties	Adherent
Biosafety level	1

CHARACTERISTICS

Morphology	De tipo epitelial
Cell type	Célula epitelial

IDENTIFIERS

Citation

HCC1143 (número de catálogo da Cytion 305545)

Cytion GmbH
Nikola-Tesla-Str. 3
69124 Heidelberg
Tel: +49 (0)6221 405780
info@cytion.com
cytion.com

Registered office Heidelberg
VAT ID: DE283292917
Local court Mannheim - HRB 714394
CEO / Geschäftsführer: Jonathan Steubing

Banking information
Sparkasse Heidelberg
IBAN: DE35 6725 0020 0009 2076 86
BIC: SOLADES1HDB

NCBI TaxID	9606
Cellosaurus	CVCL_1245

EXPRESSION AND SUSCEPTIBILITY

Protein expression

Glicoproteína epitelial 2 (EGP2), citoqueratina 19

Oncogenes

Her2/neu negativo, p53 positivo

Mutational profile

Mutação: TP53, p.Arg248Gln (c.743G>A), homozigótica

HANDLING AND CULTURE

Culture medium

RPMI 1640, com 2,0 mM de glutamina estável e 2,0 g/L de $NaHCO_3$ (número de artigo da Cytion: 820700a)

Incubation atmosphere	37 °C, 5% de CO_2, atmosfera umidificada.

Supplements

Adicione 10% de FBS ao meio

Dissociation reagent	Accutase

Subculturing

Remova o meio antigo das células aderentes e lave-as com PBS sem cálcio e magnésio. Para frascos T25, use 3 a 5 ml de PBS; para frascos T75, use 5 a 10 ml. Em seguida, cubra as células completamente com TrypLE Express, utilizando 1 a 2 ml para frascos T25 e 2,5 ml para frascos T75. Deixe as células incubarem à temperatura ambiente por 8 a 10 minutos para que se desprendam. Após a incubação, misture delicadamente as células com 10 ml de meio para ressuspender, depois centrifugue a 300xg por 3 minutos. Descarte o sobrenadante, ressuspenda as células em meio fresco e transfira-as para novos frascos que já contenham meio fresco.

Fluid renewal	3 a 4 vezes por semana

Thawing and culturing

Confirm that the vial remains deeply frozen upon delivery, as cells are shipped on dry ice to maintain optimal temperatures during transit.
Upon receipt, either store the cryovial immediately at temperatures below -150°C to ensure the preservation of cellular integrity, or proceed to step 3 if immediate culturing is required.
For immediate culturing, swiftly thaw the vial by immersing it in a 37°C water bath with clean water and an antimicrobial agent, agitating gently for 40-60 seconds until a small ice clump remains.
Perform all subsequent steps under sterile conditions in a flow hood, disinfecting the cryovial with 70% ethanol before opening.
Carefully open the disinfected vial and transfer the cell suspension into a 15 ml centrifuge tube containing 8 ml of room-temperature culture medium, mixing gently.
Centrifuge the mixture at 300 x g for 3 minutes to separate the cells and carefully discard the supernatant containing residual freezing medium.
Gently resuspend the cell pellet in 10 ml of fresh culture medium. For adherent cells, divide the suspension between two T25 culture flasks; for suspension cultures, transfer all the medium into one T25 flask to promote effective cell interaction and growth.
Adhere to established subculture protocols for continued growth and maintenance of the cell line, ensuring reliable experimental outcomes.

QUALITY CONTROL AND CRYOPRESERVATION

Sterility

A contaminação por micoplasma é descartada por meio de ensaios baseados em PCR e de métodos de detecção de micoplasma baseados em luminescência.
Para garantir que não haja contaminação por bactérias, fungos ou leveduras, as culturas celulares são submetidas a inspeções visuais diárias.

Freeze medium	Como meio de criopreservação, utilizamos meio de crescimento completo (incluindo FBS) + 10% de DMSO para garantir viabilidade adequada após o descongelamento, ou CM-1 (número de catálogo da Cytion 800100), que inclui osmoprotetores e estabilizadores metabólicos otimizados para melhorar a recuperação e reduzir o estresse induzido pela criopreservação.

Storage conditions

Para preservação a longo prazo, coloque os frascos em nitrogênio líquido em fase de vapor a uma temperatura entre aproximadamente −150 e −196 °C. O armazenamento a −80 °C é aceitável apenas como uma etapa intermediária de curta duração antes da transferência para o nitrogênio líquido.

Shipping conditions

As linhagens celulares criopreservadas são enviadas em gelo seco, em embalagens isoladas e validadas, com refrigerante suficiente para manter a temperatura em aproximadamente −78 °C durante todo o transporte. Ao receber a remessa, inspecione o recipiente imediatamente e transfira os frascos sem demora para o local de armazenamento adequado.

DONOR

Donor age	52 anos
Ethnicity	caucasiano

LEGAL AND SAFETY

Safety precautions

Ao planejar o armazenamento de um criotubo em nitrogênio líquido para descongelamento futuro, é obrigatório seguir medidas de segurança rigorosas. É essencial o uso de luvas e roupas de proteção adequadas, além do uso obrigatório de máscara facial ou óculos de proteção durante a transferência de amostras congeladas para dentro ou para fora do tanque de nitrogênio líquido. Isso visa mitigar o risco de ferimentos decorrentes de possíveis explosões dos criotubos durante a remoção, o que pode resultar na projeção de fragmentos pontiagudos.

Warranty

Na Cytion, garantimos a qualidade e a viabilidade de nossos produtos.
Garantimos que nossas células permanecerão viáveis no início da cultura por
60 dias após o envio de nossas instalações.
Asseguramos que todos os materiais estão em conformidade com as especificações descritas no
Certificado de Análise e/ou na Ficha Técnica do Produto.
Para obter todos os detalhes, consulte nossa
Declaração de Garantia.

Material Transfer Agreement required	Yes

Cytion GmbH
Nikola-Tesla-Str. 3
69124 Heidelberg
Tel: +49 (0)6221 405780
info@cytion.com
cytion.com

Registered office Heidelberg
VAT ID: DE283292917
Local court Mannheim - HRB 714394
CEO / Geschäftsführer: Jonathan Steubing

Banking information
Sparkasse Heidelberg
IBAN: DE35 6725 0020 0009 2076 86
BIC: SOLADES1HDB