HUH-1

305553

ΓΕΝΙΚΈΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΊΕΣ

Περιγραφή

Η κυτταρική σειρά HuH-1 προέρχεται από ανθρώπινο ηπατοκυτταρικό καρκίνωμα (HCC) και χρησιμοποιείται ευρέως στην έρευνα για τον καρκίνο του ήπατος. Αυτή η κυτταρική σειρά έχει δείξει την ικανότητα να παράγει και να εκκρίνει διάφορες πρωτεΐνες ειδικές για το ήπαρ, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που απαντώνται συνήθως στο ανθρώπινο πλάσμα. Αξίζει να σημειωθεί ότι τα κύτταρα HuH-1, όπως και άλλες ανθρώπινες κυτταρικές σειρές ηπατώματος, μπορούν να εκφράζουν και να απελευθερώνουν το επιφανειακό αντιγόνο της ηπατίτιδας B (HBsAg) σε καλλιέργεια, παρέχοντας ένα μοντέλο για τη μελέτη των μηχανισμών του HCC που σχετίζονται με τον ιό της ηπατίτιδας B. Η ικανότητα παραγωγής του HBsAg σε καλλιέργεια υποδηλώνει ότι τα κύτταρα HuH-1 διατηρούν διαφοροποιημένες λειτουργίες παρόμοιες με αυτές των ηπατικών κυττάρων in vivo.
Τα κύτταρα HuH-1 διαδραματίζουν επίσης καθοριστικό ρόλο στη διερεύνηση των ρυθμιστικών μηχανισμών στον καρκίνο του ήπατος, ιδίως εκείνων που αφορούν τα μικρο-RNA και τους στόχους τους. Για παράδειγμα, μελέτες έχουν δείξει ότι η αύξηση της έκφρασης του miR-182 μπορεί να ενισχύσει το μεταστατικό δυναμικό των κυττάρων HCC, συμπεριλαμβανομένων των HuH-1, μέσω της υπορύθμισης του καταστολέα μεταστάσεων 1 (MTSS1). Αυτή η υπορύθμιση προάγει την εισβαλτική συμπεριφορά και αναδεικνύει τον ρόλο συγκεκριμένων μικρο-RNA στη ρύθμιση της γονιδιακής έκφρασης και στην επίδραση της συμπεριφοράς των καρκινικών κυττάρων. Τέτοιες γνώσεις είναι πολύτιμες για την κατανόηση της εξέλιξης του HCC και την ανάπτυξη στοχευμένων θεραπευτικών στρατηγικών.
Η χρησιμότητα της κυτταρικής σειράς HuH-1 επεκτείνεται στην έρευνα σχετικά με το μικροπεριβάλλον του όγκου και τις αλληλεπιδράσεις του με ιικά στοιχεία, καθιστώντας την ένα κατάλληλο μοντέλο για τη διερεύνηση των περίπλοκων σχέσεων μεταξύ ογκογονιδίων, γονιδίων καταστολής και ιικών πρωτεϊνών. Αυτή η κυτταρική σειρά συμβάλλει στην αποσαφήνιση των πολύπλευρων οδών της ηπατοκαρκινογένεσης και στην ανάπτυξη αντικαρκινικών θεραπειών προσαρμοσμένων στις μοριακές βάσεις του καρκίνου του ήπατος.

Ιστός	Ήπαρ
Ασθένεια	Ηπατοκυτταρικό καρκίνωμα ενηλίκων

Συνώνυμα

- huH-1
- HuH-1
- huH 1
- HuH1
- HUh1
- HUH1
- huH1

ΤΑΞΙΝΌΜΗΣΗ

Οργανισμός	Άνθρωπος
Σεξ	Άνδρας
Ιδιότητες ανάπτυξης	Πιστός
Επίπεδο βιοασφάλειας	2

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΆ

Μορφολογία	Επιθηλιοειδής

Cytion GmbH
Nikola-Tesla-Str. 3
69124 Heidelberg
Tel: +49 (0)6221 405780
info@cytion.com
cytion.com

Registered office Heidelberg
VAT ID: DE283292917
Local court Mannheim - HRB 714394
CEO / Geschäftsführer: Jonathan Steubing

Banking information
Sparkasse Heidelberg
IBAN: DE35 6725 0020 0009 2076 86
BIC: SOLADES1HDB

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΆ

Παραπομπή

HUH-1 (αριθμός καταλόγου Cytion 305553)

Αριθμός φορολογικού μητρώου NCBI	9606
Κελλοσαύρος	CVCL_2956

ΈΚΦΡΑΣΗ ΚΑΙ ΕΥΑΙΣΘΗΣΊΑ

Προφίλ μεταλλάξεων

Μετάλλαξη: AXIN1, p.Asn302Profs*111 (c.904_907delAACC)· Μετάλλαξη: TP53, p.Arg110Leu (c.329G>T), ομόζυγη

Ιοί

Μετασχηματισμένο στέλεχος: Ιός της ηπατίτιδας B (HBV). Τα κύτταρα παράγουν συνεχώς το αντιγόνο HBs στο καλλιεργητικό μέσο.

ΧΕΙΡΙΣΜΌΣ ΚΑΙ ΚΑΛΛΙΈΡΓΕΙΑ

Θρεπτικό μέσο

DMEM, w: 4,5 g/L γλυκόζη, w: 4 mM L-γλουταμίνη, w: 3,7 g/L NaHCO3, w: 1,0 mM πυρουβικό νάτριο (αριθμός άρθρου Cytion 820300a)

Ατμόσφαιρα επώασης	37°C, 5%CO2, υγροποιημένη ατμόσφαιρα.

Συμπληρώματα

Συμπληρώστε το μέσο με 10% FBS

Αντιδραστήριο αποσύνδεσης	Accutase

Αναπαραγωγή σε υποκαλλιέργεια

Αφαιρέστε το παλιό μέσο από τα προσκολλημένα κύτταρα και πλύντε τα με PBS που δεν περιέχει ασβέστιο και μαγνήσιο. Για φιάλες T25, χρησιμοποιήστε 3-5 ml PBS και για φιάλες T75, χρησιμοποιήστε 5-10 ml. Στη συνέχεια, καλύψτε πλήρως τα κύτταρα με TrypLE Express, χρησιμοποιώντας 1-2 ml για φιάλες T25 και 2,5 ml για φιάλες T75. Αφήστε τα κύτταρα να επωαστούν σε θερμοκρασία δωματίου για 8-10 λεπτά για να αποκολληθούν. Μετά την επώαση, αναμείξτε απαλά τα κύτταρα με 10 ml μέσου για να ανασυσταθούν και, στη συνέχεια, φυγοκεντρίστε στα 300xg για 3 λεπτά. Απορρίψτε το υπερκείμενο υγρό, ανασυστάστε τα κύτταρα σε φρέσκο μέσο και μεταφέρετέ τα σε νέες φιάλες που περιέχουν ήδη φρέσκο μέσο.

Πυκνότητα σποράς	2-4*10⁴/cm²

Απόψυξη και καλλιέργεια

Confirm that the vial remains deeply frozen upon delivery, as cells are shipped on dry ice to maintain optimal temperatures during transit. Upon receipt, either store the cryovial immediately at temperatures below -150°C to ensure the preservation of cellular integrity, or proceed to step 3 if immediate culturing is required.
For immediate culturing, swiftly thaw the vial by immersing it in a 37°C water bath with clean water and an antimicrobial agent, agitating gently for 40-60 seconds until a small ice clump remains.
Perform all subsequent steps under sterile conditions in a flow hood, disinfecting the cryovial with 70% ethanol before opening.
Carefully open the disinfected vial and transfer the cell suspension into a 15 ml centrifuge tube containing 8 ml of room-temperature culture medium, mixing gently.
Centrifuge the mixture at 300 x g for 3 minutes to separate the cells and carefully discard the supernatant containing residual freezing medium.
Gently resuspend the cell pellet in 10 ml of fresh culture medium. For adherent cells, divide the suspension between two T25 culture flasks; for suspension cultures, transfer all the medium into one T25 flask to promote effective cell interaction and growth.
Adhere to established subculture protocols for continued growth and maintenance of the cell line, ensuring reliable experimental outcomes.

ΈΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΌΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΚΡΥΟΣΥΝΤΉΡΗΣΗ

Στειρότητα

Η μόλυνση από μυκόπλασμα αποκλείεται με τη χρήση τόσο των δοκιμασιών που βασίζονται στην PCR όσο και των μεθόδων ανίχνευσης μυκοπλάσματος με βάση τη φωταύγεια.
Για να διασφαλιστεί ότι δεν υπάρχει μόλυνση από βακτήρια, μύκητες ή ζύμες, οι κυτταροκαλλιέργειες υποβάλλονται σε καθημερινές οπτικές επιθεωρήσεις.

Μέσο κατάψυξης	Ως μέσο κρυοσυντήρησης, χρησιμοποιούμε πλήρες μέσο ανάπτυξης (συμπεριλαμβανομένου του FBS) + 10% DMSO για επαρκή βιωσιμότητα μετά την απόψυξη, ή CM-1 (αριθμός καταλόγου Cytion 800100), το οποίο περιλαμβάνει βελτιστοποιημένα ωσμοπροστατευτικά και μεταβολικούς σταθεροποιητές για την ενίσχυση της ανάκαμψης και τη μείωση του στρες που προκαλείται από την κρυοσυντήρηση.

Συνθήκες αποθήκευσης

Για μακροχρόνια συντήρηση, τοποθετήστε τα φιαλίδια σε υγρό άζωτο σε φάση ατμών σε θερμοκρασία περίπου -150 έως -196 °C. Η αποθήκευση στους -80 °C είναι αποδεκτή μόνο ως σύντομο ενδιάμεσο βήμα πριν από τη μεταφορά σε υγρό άζωτο.

Όροι αποστολής

Οι κρυοσυντηρημένες κυτταρικές σειρές αποστέλλονται σε ξηρό πάγο σε επικυρωμένη, μονωμένη συσκευασία με επαρκές ψυκτικό μέσο για τη διατήρηση περίπου των -78 °C καθ' όλη τη διάρκεια της μεταφοράς. Κατά την παραλαβή, επιθεωρήστε αμέσως τον περιέκτη και μεταφέρετε τα φιαλίδια χωρίς καθυστέρηση στην κατάλληλη αποθήκη.

ΔΩΡΗΤΉΣ

Ηλικία δωρητή	53 χρόνια
Εθνικότητα	Ιαπωνικά

ΝΟΜΙΚΆ ΘΈΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΣΦΆΛΕΙΑ

Μέτρα ασφαλείας

Όταν σχεδιάζετε να αποθηκεύσετε ένα κρυοφιαλίδιο σε υγρό άζωτο για μελλοντική απόψυξη, είναι υποχρεωτικό να τηρείτε αυστηρά μέτρα ασφαλείας. Τα κατάλληλα προστατευτικά γάντια και ο κατάλληλος προστατευτικός ρουχισμός είναι απαραίτητα, ενώ απαιτείται η χρήση μάσκας προσώπου ή γυαλιών ασφαλείας κατά τη μεταφορά κατεψυγμένων δειγμάτων προς ή από τη δεξαμενή υγρού αζώτου. Αυτό γίνεται για να μετριαστεί ο κίνδυνος τραυματισμού από πιθανές εκρήξεις κρυοσωλήνων κατά την απομάκρυνση, οι οποίες μπορεί να οδηγήσουν στην προβολή αιχμηρών θραυσμάτων.

Εγγύηση

Στην Cytion, υποστηρίζουμε την ποιότητα και τη βιωσιμότητα των προϊόντων μας.
Εγγυόμαστε ότι τα κύτταρά μας θα είναι βιώσιμα κατά την έναρξη της καλλιέργειας για 60 ημέρες μετά την αποστολή από τις εγκαταστάσεις μας.
Διαβεβαιώνουμε ότι όλα τα υλικά συμμορφώνονται με τις προδιαγραφές που περιγράφονται στο Πιστοποιητικό Ανάλυσης ή/και στο Φύλλο Προϊόντος
Για πλήρεις λεπτομέρειες, ανατρέξτε στην <a href=""/Who-we-are/Warranty/"" hreflang=""""x-default"">Δήλωση εγγύησης

Απαιτείται συμφωνία μεταφοράς υλικού	Yes