IGROV-1

305556

INFORMAÇÕES GERAIS

Descrição

A linha celular IGROV-1 é uma linha celular de adenocarcinoma do ovário humano amplamente utilizada na investigação, particularmente em estudos que envolvem o cancro do ovário. Derivadas de um carcinoma do ovário, as células IGROV-1 são conhecidas pela sua utilidade na modelação do cancro epitelial do ovário (EOC), que representa a maioria dos tumores malignos do ovário. Esta linha celular tem sido utilizada em vários contextos, incluindo a avaliação das respostas aos medicamentos e dos mecanismos subjacentes à resistência aos medicamentos. Por exemplo, a IGROV-1 tem sido fundamental para testar a eficácia de terapias direcionadas, como o conjugado anticorpo-fármaco mirvetuximab soravtansine (IMGN853) direcionado para o recetor alfa do folato. Este ADC mostrou resultados promissores ao sinergizar com quimioterápicos como a carboplatina e a doxorrubicina, aumentando a eficácia antitumoral através de danos no ADN e paragem do ciclo celular em modelos pré-clínicos.
Para além do seu papel na investigação do cancro, o IGROV-1 tem sido caracterizado como um modelo para estudos de infecções virais. Um trabalho recente destacou a sua suscetibilidade ao SARS-CoV-2, tirando partido da sua expressão de ACE2 para apoiar a replicação viral. Foi demonstrado que a IGROV-1 monta uma resposta imune inata robusta após a infeção, semelhante às células epiteliais nasais humanas primárias, indicando o seu potencial para ensaios serológicos, testes de medicamentos antivirais e isolamento de variantes virais de amostras de doentes. Esta linha celular é considerada vantajosa para a investigação devido à sua replicação eficaz de vírus em comparação com modelos tradicionais como as células Vero, que podem levar a mutações adaptativas.
Globalmente, as células IGROV-1 constituem um modelo valioso tanto em oncologia como em virologia, apoiando estudos de biologia tumoral, resistência a medicamentos e patogénese viral. A sua relevância em experiências de sinergia de medicamentos e a sua compatibilidade com a investigação antiviral sublinham a sua versatilidade e importância neste domínio.

Tecido	Ovário
Doença	Carcinoma endometrióide

Sinónimos

- Igrov-1
- IGROV 1
- IGR-OV1
- IGROV1
- Igrov1
- IGR.OV1
- IGROV
- OV1/P
- OV1/p
- OV1-P

CLASSIFICAÇÃO

Organismo	Humano
Sexo	Feminino
Propriedades de crescimento	Aderente
Nível de biossegurança	1

CARACTERÍSTICAS

Morfologia	De tipo epitelial

Cytion GmbH
Nikola-Tesla-Str. 3
69124 Heidelberg
Tel: +49 (0)6221 405780
info@cytion.com
cytion.com

Registered office Heidelberg
VAT ID: DE283292917
Local court Mannheim - HRB 714394
CEO / Geschäftsführer: Jonathan Steubing

Banking information
Sparkasse Heidelberg
IBAN: DE35 6725 0020 0009 2076 86
BIC: SOLADES1HDB

Tumorigénico	Sim, em ratinhos nus.

IDENTIFICADORES

Referência

IGROV-1 (número de catálogo Cytion 305556)

Número de identificação fiscal do NCBI	9606
Cellosaurus	CVCL_1304

EXPRESSÃO E SUSCETIBILIDADE

Perfil mutacional

Mutação: BRCA1, p.Lys654Serfs*47 (c.1961delA), heterozigótico; Mutação: BRCA2, p.Lys1108Argfs*11 (c.3323delA) (p.Gln1107fs) (c.3320delA); Mutação: PIK3CA, p.Arg38Cys (c.112C>T), heterozigótica; Mutação: PIK3CA, p.Ter1069TrpinsLysAspAsn (c.3207A>G), heterozigótica; Mutação: PTEN, p.Thr319fs*1 (c.955_958delACTT) (p.VL317fs) (V317fs*3), heterozigótica; Mutação: RB1, p.Val654Cysfs*4 (c.1959delA), heterozigótica; Mutação: SMAD4, p.Gly231Alafs*10 (c.692delG), em heterozigotia; Mutação: SMAD4, p.Leu495Pro (c.1484T>C), em heterozigotia; Mutação: TP53, p.Ser90Leufs*59 (c.267dupC) (c.267_268insC), heterozigota; Mutação: TP53, p.Tyr126Cys (c.377A>G), em heterozigotia

MANUSEAMENTO E CULTURA

Meio de cultura

DMEM, com: 4,5 g/L de glucose, com: 4 mM de L-Glutamina, com: 3,7 g/L de NaHCO3, com: 1,0 mM de piruvato de sódio (número de artigo Cytion 820300a)

Atmosfera de incubação	37°C, 5%CO2, atmosfera humidificada.

Suplementos

Completar o meio com 10% de FBS

Reagente de dissociação	Accutase

Subcultura

Retirar o meio antigo das células aderentes e lavá-las com PBS sem cálcio e magnésio. Para frascos T25, utilizar 3-5 ml de PBS e, para frascos T75, utilizar 5-10 ml. De seguida, cobrir completamente as células com TrypLE Express, utilizando 1-2 ml para os frascos T25 e 2,5 ml para os frascos T75. Deixar as células incubar à temperatura ambiente durante 8-10 minutos para as destacar. Após a incubação, misturar suavemente as células com 10 ml de meio para as ressuspender e, em seguida, centrifugar a 300xg durante 3 minutos. Deitar fora o sobrenadante, ressuspender as células em meio fresco e transferi-las para novos frascos que já contenham meio fresco.

Descongelamento e cultura

Confirm that the vial remains deeply frozen upon delivery, as cells are shipped on dry ice to maintain optimal temperatures during transit.
Upon receipt, either store the cryovial immediately at temperatures below -150°C to ensure the preservation of cellular integrity, or proceed to step 3 if immediate culturing is required.
For immediate culturing, swiftly thaw the vial by immersing it in a 37°C water bath with clean water and an antimicrobial agent, agitating gently for 40-60 seconds until a small ice clump remains.
Perform all subsequent steps under sterile conditions in a flow hood, disinfecting the cryovial with 70% ethanol before opening.
Carefully open the disinfected vial and transfer the cell suspension into a 15 ml centrifuge tube containing 8 ml of room-temperature culture medium, mixing gently.
Centrifuge the mixture at 300 x g for 3 minutes to separate the cells and carefully discard the supernatant containing residual freezing medium.
Gently resuspend the cell pellet in 10 ml of fresh culture medium. For adherent cells, divide the suspension between two T25 culture flasks; for suspension cultures, transfer all the medium into one T25 flask to promote effective cell interaction and growth.
Adhere to established subculture protocols for continued growth and maintenance of the cell line, ensuring reliable experimental outcomes.

CONTROLO DE QUALIDADE E CRIOPRESERVAÇÃO

Esterilidade

A contaminação por micoplasma é excluída utilizando ensaios baseados em PCR e métodos de deteção de micoplasma baseados em luminescência.
Para garantir que não há contaminação bacteriana, fúngica ou de leveduras, as culturas de células são sujeitas a inspecções visuais diárias.

Meio de congelação	Como meio de criopreservação, utilizamos um meio de crescimento completo (incluindo FBS) + 10% DMSO para uma viabilidade pós-descongelamento adequada, ou CM-1 (número de catálogo Cytion 800100), que inclui osmoprotectores optimizados e estabilizadores metabólicos para melhorar a recuperação e reduzir o stress induzido pela crio.

Condições de armazenamento

Para conservação a longo prazo, colocar os frascos em azoto líquido em fase de vapor a uma temperatura entre -150 e -196 °C. O armazenamento a -80 °C é aceitável apenas como um curto passo intermédio antes da transferência para azoto líquido.

Condições de envio

As linhas celulares criopreservadas são expedidas em gelo seco em embalagens validadas e isoladas com refrigerante suficiente para manter aproximadamente -78 °C durante o transporte. Aquando da receção, inspecionar imediatamente o recipiente e transferir sem demora os frascos para um local de armazenamento adequado.

DOADOR

Idade do dador	47 anos
Etnia	Caucasiano

ASPECTOS LEGAIS E DE SEGURANÇA

Precauções de segurança

Quando se planeia armazenar um criovial em nitrogénio líquido para descongelação futura, é obrigatório aderir a medidas de segurança rigorosas. Luvas e vestuário de proteção adequados são essenciais, e a utilização de uma máscara facial ou óculos de segurança é necessária durante a transferência de amostras congeladas para ou do tanque de nitrogénio líquido. Isto destina-se a mitigar o risco de ferimentos provocados por potenciais explosões de crioviais após a remoção, que podem resultar na projeção de fragmentos afiados.

Garantia

Na Cytion, nós garantimos a qualidade e a viabilidade de nossos produtos.
Garantimos que nossas células serão viáveis no início da cultura por 60 dias após o envio de nossas instalações.
Asseguramos que todos os materiais estão em conformidade com as especificações descritas no Certificado de Análise e/ou Folha de Produto
Para mais informações, consulte a nossa <a href=""/Who-we-are/Warranty/"" hreflang=""x-default"">Declaração de Garantia

É necessário um Acordo de Transferência de Material	Yes