IGROV-1

305556

VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE

Popis

Bunková línia IGROV-1 je ľudská bunková línia adenokarcinómu vaječníkov, ktorá sa vo veľkej miere využíva vo výskume, najmä v štúdiách týkajúcich sa rakoviny vaječníkov. Bunky IGROV-1, odvodené z karcinómu vaječníkov, sú známe svojou užitočnosťou pri modelovaní epiteliálneho karcinómu vaječníkov (EOC), ktorý predstavuje väčšinu malígnych ochorení vaječníkov. Táto bunková línia sa využíva v rôznych kontextoch vrátane hodnotenia reakcií na lieky a mechanizmov, ktoré sú základom rezistencie na lieky. IGROV-1 bola napríklad dôležitá pri testovaní účinnosti cielených terapií, ako je konjugát protilátky a lieku zameraný na folátový receptor alfa mirvetuximab soravtansín (IMGN853). Tento ADC preukázal sľubné výsledky tým, že synergicky spolupracoval s chemoterapeutikami, ako sú karboplatina a doxorubicín, a zvyšoval protinádorovú účinnosť prostredníctvom poškodenia DNA a zastavenia bunkového cyklu v predklinických modeloch. Okrem úlohy vo výskume rakoviny bol IGROV-1 charakterizovaný ako model pre štúdie vírusových infekcií. Nedávna práca poukázala na jeho náchylnosť na SARS-CoV-2, pričom využila jeho expresiu ACE2 na podporu replikácie vírusu. Ukázalo sa, že IGROV-1 pri infekcii vytvára silnú vrodenú imunitnú odpoveď, podobne ako primárne ľudské nosové epitelové bunky, čo naznačuje jeho potenciál pre sérologické testy, testovanie antivírusových liekov a izoláciu vírusových variantov zo vzoriek pacientov. Táto bunková línia sa považuje za výhodnú pre výskum vďaka účinnej replikácii vírusov v porovnaní s tradičnými modelmi, ako sú bunky Vero, ktoré môžu viesť k adaptívnym mutáciám. Celkovo bunky IGROV-1 slúžia ako cenný model v onkológii aj virológii, ktorý podporuje štúdie biológie nádorov, rezistencie na lieky a vírusovej patogenézy. Ich význam pri experimentoch so synergiou liečiv a ich kompatibilita s antivírusovým výskumom podčiarkujú ich všestrannosť a význam v tejto oblasti.

Tkanivo	Vaječník
Choroba	Endometrioidný karcinóm

Synonymá

- Igrov-1
- IGROV 1
- IGR-OV1
- IGROV1
- Igrov1
- IGR.OV1
- IGROV
- OV1/P
- OV1/p
- OV1-P

KLASIFIKÁCIA

Organizmus	Človek
Sex	Žena
Rastové vlastnosti	Prívrženec
Úroveň biologickej bezpečnosti	1

CHARAKTERISTIKY

Morfológia	Epitelu podobné
Tumorigenický	Áno, na nahých myšiach.

IDENTIFIKÁTORY

Citácia

IGROV-1 (katalógové číslo Cytion 305556)

Daňové identifikačné číslo NCBI	9606
Cellosaurus	CVCL_1304

PREJAV A NÁCHYLNOSŤ

Mutčný profil

Mutácia: Lys654Serfs*47 (c.1961delA), heterozygotná; mutácia: BRCA1, p.Lys654Serfs*47 (c.1961delA), heterozygotná; mutácia: BRCA1, p.Lys654Serfs*47 (c.1961delA), heterozygotná: BRCA2, p.Lys1108Argfs*11 (c.3323delA) (p.Gln1107fs) (c.3320delA); mutácia: PIK3CA, p.Arg38Cys (c.112C>T), heterozygotná; mutácia: PIK3CA, p.Ter1069TrpinsLysAspAsn (c.3207A>G), heterozygotná; mutácia: p.Ter1069TrpinsLysAspAsn (c.3207A>G), heterozygotná: PTEN, p.Thr319fs*1 (c.955_958delACTT) (p.VL317fs) (V317fs*3), heterozygous; Mutation: RB1, p.Val654Cysfs*4 (c.1959delA), heterozygotná; mutácia: SMAD4, p.Gly231Alafs*10 (c.692delG), heterozygotná; mutácia: p.Gly231Alafs*10 (c.692delG), heterozygotná: Leu495Pro (c.1484T>C), heterozygotná; mutácia: SMAD4, p.Leu495Pro (c.1484T>C), heterozygotná: TP53, p.Ser90Leufs*59 (c.267dupC) (c.267_268insC), heterozygotná; mutácia: p.Ser90Leufs*59 (c.267dupC) (c.267_268insC), heterozygotná: TP53, p.Tyr126Cys (c.377A>G), heterozygotná

MANIPULÁCIA A KULTIVÁCIA

Kultivačné médium

DMEM, w: 4,5 g/l glukózy, w: 4 mM L-glutamínu, w: 3,7 g/l NaHCO3, w: 1,0 mM pyruvátu sodného (číslo výrobku Cytion 820300a)

Inkubačná atmosféra	37 °C, 5 %CO2, zvlhčená atmosféra.

Doplnky stravy

Doplňte médium o 10 % FBS

Disociačné činidlo	Accutase

Rozmnožovanie kultúr

Odstráňte staré médium z adherovaných buniek a premyte ich PBS, ktorý neobsahuje vápnik a horčík. Pre banky T25 použite 3 - 5 ml PBS a pre banky T75 použite 5 - 10 ml. Potom bunky úplne zakryte prípravkom TrypLE Express, pričom použite 1 - 2 ml pre banky T25 a 2,5 ml pre banky T75. Nechajte bunky inkubovať pri izbovej teplote 8-10 minút, aby sa oddelili. Po inkubácii jemne premiešajte bunky s 10 ml média, aby boli znovu suspendované, a potom ich 3 minúty odstreďujte pri 300xg. Supernatant zlikvidujte, bunky znovu rozmiešajte v čerstvom médiu a preneste ich do nových fliaš, ktoré už obsahujú čerstvé médium.

Rozmrazovanie a kultivácia

Confirm that the vial remains deeply frozen upon delivery, as cells are shipped on dry ice to maintain optimal temperatures during transit.
Upon receipt, either store the cryovial immediately at temperatures below -150°C to ensure the preservation of cellular integrity, or proceed to step 3 if immediate culturing is required.
For immediate culturing, swiftly thaw the vial by immersing it in a 37°C water bath with clean water and an antimicrobial agent, agitating gently for 40-60 seconds until a small ice clump remains.
Perform all subsequent steps under sterile conditions in a flow hood, disinfecting the cryovial with 70% ethanol before opening.
Carefully open the disinfected vial and transfer the cell suspension into a 15 ml centrifuge tube containing 8 ml of room-temperature culture medium, mixing gently.
Centrifuge the mixture at 300 x g for 3 minutes to separate the cells and carefully discard the supernatant containing residual freezing medium.
Gently resuspend the cell pellet in 10 ml of fresh culture medium. For adherent cells, divide the suspension between two T25 culture flasks; for suspension cultures, transfer all the medium into one T25 flask to promote effective cell interaction and growth.
Adhere to established subculture protocols for continued growth and maintenance of the cell line, ensuring reliable experimental outcomes.

KONTROLA KVALITY A KRYOKONZERVÁCIA

Sterilita

Kontaminácia mykoplazmami sa vylučuje pomocou testov založených na PCR a metód detekcie mykoplaziem založených na luminiscencii. Aby sa zabezpečilo, že nedošlo ku kontaminácii baktériami, hubami alebo kvasinkami, bunkové kultúry sa denne vizuálne kontrolujú.

Mrazové médium	Ako kryokonzervačné médium používame kompletné rastové médium (vrátane FBS) + 10 % DMSO na zabezpečenie primeranej životaschopnosti po rozmrazení alebo CM-1 (katalógové číslo 800100 spoločnosti Cytion), ktoré obsahuje optimalizované osmoprotektanty a metabolické stabilizátory na zlepšenie obnovy a zníženie stresu spôsobeného kryo.

Podmienky skladovania

Na dlhodobé uchovávanie umiestnite injekčné liekovky do kvapalnej fázy dusíka v pare pri teplote približne -150 až -196 °C. Skladovanie pri teplote -80 °C je prijateľné len ako krátky prechodný krok pred presunom do tekutého dusíka.

Dopravné podmienky

Kryokonzervované bunkové línie sa prepravujú na suchom ľade v overených, izolovaných obaloch s dostatočným množstvom chladiva na udržanie teploty približne -78 °C počas celej prepravy. Po prijatí ihneď skontrolujte obal a bezodkladne premiestnite injekčné liekovky do vhodného skladu.

DARCA

Vek darcu	47 rokov
Etnická príslušnosť	Kaukazský

PRÁVNE INFORMÁCIE A BEZPEČNOSŤ

Bezpečnostné opatrenia

Pri plánovaní uskladnenia kryovírusu v kvapalnom dusíku na budúce rozmrazenie je potrebné dodržiavať prísne bezpečnostné opatrenia. Vhodné ochranné rukavice a odev sú nevyhnutné a počas prenosu zmrazených vzoriek do nádrže s tekutým dusíkom alebo z nej sa vyžaduje používanie tvárovej masky alebo ochranných okuliarov. Je to z dôvodu zníženia rizika poranenia v dôsledku možnej explózie kryovírusu pri vyberaní, ktorá môže mať za následok vymrštenie ostrých úlomkov.

Záruka

V spoločnosti Cytion si stojíme za kvalitou a životaschopnosťou našich produktov.
Garantujeme, že naše bunky budú životaschopné na začiatku kultivácie počas 60 dní po odoslaní z našich zariadení.
Zaručujeme, že všetky materiály zodpovedajú špecifikáciám opísaným v certifikáte analýzy a/alebo v produktovom liste
Úplné informácie nájdete v našom <a href=""/Kto sme/záruka/"" hreflang=""x-default"">Vyhlásení o záruke

Je potrebná dohoda o prenose materiálu	Yes