IPEC-J2

305571

SPLOŠNE INFORMACIJE

Opis

Celična linija IPEC-J2 je netransformirana, trajna epitelijska celična linija, pridobljena iz jejunalnega epitelija novorojenega, nedojenega pujskega mladiča. Celice IPEC-J2 ohranjajo strukturne in funkcionalne značilnosti zrelih enterocitov, kar jih naredi odličen model za preučevanje črevesne fiziologije in patologije. Te celice tvorijo polarizirano monosloj z tesnimi spojmi in kažejo visoko transepitelijsko električno upornost (TEER), kar je bistveno za preučevanje funkcij epitelijske pregrade in prepustnosti. Zaradi svojega prašičjega izvora celice IPEC-J2 bolje posnemajo človeško črevesno fiziologijo v primerjavi z linijami, pridobljenimi iz glodalcev, kot sta IEC-6 in IEC-18, kar povečuje njihovo pomembnost v zoonoznih in primerjalnih raziskavah.
Funkcionalno celice IPEC-J2 izražajo ključne markerje in citokine, povezane z imunskimi odzivi, kot sta TNF-α in GM-CSF, ter imajo vrsto toll-podobnih receptorjev (TLR), ki olajšujejo raziskave interakcij med patogeni in gostiteljem. Zaradi tega so neprecenljive za mikrobiološke raziskave, zlasti pri preučevanju interakcij s patogeni, kot sta *Salmonella enterica* in patogena *Escherichia coli*. Uporabljajo se tudi za ocenjevanje učinkov probiotikov in prehranskih dopolnil na zdravje črevesja, pri čemer vključujejo oceno protivnetnih in citoprotektivnih odzivov.
Raziskave z uporabo celic IPEC-J2 so preučevale njihove odzive na oksidativni stres in njihove zaščitne mehanizme. Na primer, pokazalo se je, da eksogeni glutation (GSH) ščiti celice IPEC-J2 pred oksidativno škodo s krepitvijo mitohondrijske funkcije, izboljšanjem mitohondrijskega membranskega potenciala in zmanjšanjem kopičenja reaktivnih kisikovih spojin (ROS). Ti izsledki poudarjajo uporabnost celic IPEC-J2 pri preučevanju epitelijskih odzivov na stres in potencialnih terapevtskih posegov za ohranjanje celovitosti črevesne pregrade.

Tkivo	Tanko črevo, jejunum
Bolezen	Normalno

Sinonimi

- IPECJ2
- Intestinal Porcine Epithelial Cell line-J2

RAZVRSTITEV

Organizem	Prašič
Seks	Ni navedeno
Lastnosti rasti	Pripadnik
Stopnja biološke varnosti	1

ZNAČILNOSTI

Morfologija	Epitelijam podobni
Vrsta celice	Enterocit

IDENTIFIKATORJI

Navajanje vira

IPEC-J2 (kataloška številka Cytion 305571)

Davčna identifikacijska številka NCBI	9823
Cellosaurus	CVCL_2246

RAVNANJE IN GOJENJE

Gojišče

DMEM, w: 4,5 g/L glukoze, w: 4 mM L-glutamina, w: 3,7 g/L NaHCO3, w: 1,0 mM natrijevega piruvata (številka izdelka Cytion 820300a)

Inkubacijska atmosfera	37 °C, 5 %CO2, vlažno ozračje.

Prehranska dopolnila

Gojišče dopolnite z 10 % FBS

Reagenca za disociacijo	Accutase

Preusmeritev v drugo kulturo

Odstranite staro gojišče z adherentnih celic in jih sperite s PBS, ki ne vsebuje kalcija in magnezija. Za bučke T25 uporabite 3-5 ml PBS, za bučke T75 pa 5-10 ml. Nato celice v celoti prekrijte z raztopino TrypLE Express, pri čemer uporabite 1-2 ml za bučke T25 in 2,5 ml za bučke T75. Celice pustite inkubirati pri sobni temperaturi 8-10 minut, da se ločijo. Po inkubaciji celice nežno premešajte z 10 ml gojišča, da se ponovno suspendirajo, nato jih 3 minute centrifugirajte pri 300xg. Zavrzite supernatant, ponovno suspendirajte celice v svežem gojišču in jih prenesite v nove bučke, ki že vsebujejo sveže gojišče.

Gostota setve	1–3 × 10^4/cm^2
Obnova tekočine	1 do 2-krat na teden

Odtaljevanje in gojenje

Confirm that the vial remains deeply frozen upon delivery, as cells are shipped on dry ice to maintain optimal temperatures during transit.
Upon receipt, either store the cryovial immediately at temperatures below -150°C to ensure the preservation of cellular integrity, or proceed to step 3 if immediate culturing is required.
For immediate culturing, swiftly thaw the vial by immersing it in a 37°C water bath with clean water and an antimicrobial agent, agitating gently for 40-60 seconds until a small ice clump remains.
Perform all subsequent steps under sterile conditions in a flow hood, disinfecting the cryovial with 70% ethanol before opening.
Carefully open the disinfected vial and transfer the cell suspension into a 15 ml centrifuge tube containing 8 ml of room-temperature culture medium, mixing gently.
Centrifuge the mixture at 300 x g for 3 minutes to separate the cells and carefully discard the supernatant containing residual freezing medium.
Gently resuspend the cell pellet in 10 ml of fresh culture medium. For adherent cells, divide the suspension between two T25 culture flasks; for suspension cultures, transfer all the medium into one T25 flask to promote effective cell interaction and growth.
Adhere to established subculture protocols for continued growth and maintenance of the cell line, ensuring reliable experimental outcomes.

KONTROLA KAKOVOSTI IN KRIOPREZERVACIJA

Sterilnost

Kontaminacija z mikoplazmo se izključi z uporabo testov na podlagi PCR in metod za odkrivanje mikoplazme na podlagi luminiscence.
Da se zagotovi, da ni kontaminacije z bakterijami, glivami ali kvasovkami, se celične kulture dnevno vizualno pregledujejo.

Medij za zamrzovanje	Kot gojišče za kriokonzervacijo uporabljamo popolno rastno gojišče (vključno s FBS) + 10 % DMSO za ustrezno vitalnost po odmrznitvi ali CM-1 (kataloška številka 800100 podjetja Cytion), ki vključuje optimizirane osmoprotektante in presnovne stabilizatorje za izboljšanje okrevanja in zmanjšanje stresa, povzročenega s kriom.

Pogoji shranjevanja

Za dolgotrajno shranjevanje viale postavite v tekoči dušik v parni fazi pri približno -150 do -196 °C. Shranjevanje pri -80 °C je sprejemljivo le kot kratek vmesni korak pred prenosom v tekoči dušik.

Pogoji dostave

Kriokonzervirane celične linije se pošiljajo na suhem ledu v potrjeni, izolirani embalaži z zadostno količino hladilnega sredstva, da se med prevozom vzdržuje približno -78 °C. Ob prejemu takoj preglejte embalažo in viale nemudoma prenesite v ustrezno skladišče.

DONATOR

Starost darovalca	Novorojenček

PRAVNE ZADEVE IN VARNOST

Varnostni ukrepi

Pri načrtovanju shranjevanja kriovialov v tekočem dušiku za kasnejše odtaljevanje je treba obvezno upoštevati stroge varnostne ukrepe. Nujni so ustrezne zaščitne rokavice in oblačila, med prenosom zamrznjenih vzorcev v rezervoar s tekočim dušikom ali iz njega pa je potrebna uporaba obrazne maske ali zaščitnih očal. S tem se zmanjša tveganje poškodb zaradi morebitnih eksplozij kriovialov pri odstranjevanju, ki lahko povzročijo izstrelitev ostrih delcev.

Garancija

V podjetju Cytіon stojimo za kakovostjo in uporabnostjo svojih izdelkov.
Zagotavljamo, da bodo naše celice ob začetku gojenja še 60 dni po odpremi iz naših obratov vitalne.
Zagotavljamo, da so vsi materiali skladni s specifikacijami, opisanimi v potrdilu o analizi in/ali listu izdelka
Za vse podrobnosti si oglejte našo <a href=""/Kdo smo/Warranty/"" hreflang=""x-default"">Garancijsko izjavo

Potreben je sporazum o prenosu materiala	Yes

Cytіon GmbH
Nikola-Tesla-Str. 3
69124 Heidelberg
Tel: +49 (0)6221 405780
info@cytіon.com
cytіon.com

Registered office Heidelberg
VAT ID: DE283292917
Local court Mannheim - HRB 714394
CEO / Geschäftsführer: Jonathan Steubing

Banking information
Sparkasse Heidelberg
IBAN: DE35 6725 0020 0009 2076 86
BIC: SOLADES1HDB