IPEC-J2

305571

ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ

Опис

Клітинна лінія IPEC-J2 — це нетрансформована постійна епітеліальна клітинна лінія, отримана з епітелію порожньої кишки новонародженого поросяти, яке не годувалося молоком. Клітини IPEC-J2 зберігають структурні та функціональні характеристики зрілих ентероцитів, що робить їх чудовою моделлю для вивчення фізіології та патології кишечника. Ці клітини утворюють поляризований моношар із щільними з'єднаннями та демонструють високий трансепітеліальний електричний опір (TEER), що є необхідним для дослідження функцій епітеліального бар'єру та його проникності. Завдяки своєму свинячому походженню клітини IPEC-J2 точніше імітують фізіологію кишечника людини порівняно з лініями, отриманими від гризунів, такими як IEC-6 та IEC-18, що підвищує їхню актуальність у зоонозологічних та порівняльних дослідженнях.
З функціональної точки зору клітини IPEC-J2 експресують ключові маркери та цитокіни, пов'язані з імунними реакціями, такі як TNF-α та GM-CSF, а також мають ряд толл-подібних рецепторів (TLR), що сприяє дослідженню взаємодій між патогенами та хазяїном. Це зробило їх надзвичайно цінними для мікробіологічних досліджень, зокрема для вивчення взаємодій із такими патогенами, як *Salmonella enterica* та патогенна *Escherichia coli*. Їх також використовують для оцінки впливу пробіотиків та дієтичних добавок на здоров'я кишечника, зокрема для оцінки протизапальних та цитопротекторних реакцій.
У дослідженнях із використанням клітин IPEC-J2 вивчалися їхні реакції на окислювальний стрес та захисні механізми. Наприклад, було показано, що екзогенний глутатіон (GSH) захищає клітини IPEC-J2 від окислювального пошкодження шляхом посилення функції мітохондрій, поліпшення потенціалу мітохондріальної мембрани та зменшення накопичення активних форм кисню (АФК). Ці результати підкреслюють корисність IPEC-J2 у вивченні епітеліальних реакцій на стрес та потенційних терапевтичних втручань для підтримання цілісності кишкового бар'єру.

Тканина	Тонка кишка, порожня кишка
Хвороба	Нормально

Синоніми

- IPECJ2
- Intestinal Porcine Epithelial Cell line-J2

КЛАСИФІКАЦІЯ

Організм	Свиня
Секс	Не вказано
Характеристики росту	Прихильник
Рівень біобезпеки	1

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Морфологія	Епітеліальноподібні
Тип клітини	Ентероцит

ІДЕНТИФІКАТОРИ

Посилання

IPEC-J2 (номер у каталозі Cytion 305571)

Ідентифікаційний номер платника податків NCBI	9823
Целозавр	CVCL_2246

ОБРОБКА ТА ВИРОЩУВАННЯ

Живильне середовище

ДМЕМ, w: 4,5 г/л Глюкоза, w: 4 мМ L-глутамін, w: 3,7 г/л NaHCO3, w: 1,0 мМ піруват натрію (цит. номер 820300a)

Атмосфера інкубації	37°C, 5% CO2, волога атмосфера.

Добавки

Додайте до середовища 10% FBS

Реагент для дисоціації	Аккутаза

Пересадка в нове середовище

Видаліть старе середовище з прилиплих клітин і промийте їх PBS, в якому бракує кальцію і магнію. Для колб T25 використовуйте 3-5 мл PBS, а для колб T75 - 5-10 мл. Потім повністю покрийте клітини TrypLE Express, використовуючи 1-2 мл для колб T25 і 2,5 мл для колб T75. Залиште клітини інкубуватися при кімнатній температурі протягом 8-10 хвилин, щоб відокремити їх. Після інкубації обережно змішайте клітини з 10 мл середовища, щоб ресуспендувати їх, а потім центрифугуйте при 300xg протягом 3 хвилин. Викиньте надосадову рідину, ресуспендуйте клітини у свіжому середовищі та перенесіть їх у нові колби, які вже містять свіже середовище.

Щільність висіву	1–3 × 10⁴/см²
Оновлення рідини	1–2 рази на тиждень

Розморожування та культивування

Confirm that the vial remains deeply frozen upon delivery, as cells are shipped on dry ice to maintain optimal temperatures during transit.
Upon receipt, either store the cryovial immediately at temperatures below -150°C to ensure the preservation of cellular integrity, or proceed to step 3 if immediate culturing is required.
For immediate culturing, swiftly thaw the vial by immersing it in a 37°C water bath with clean water and an antimicrobial agent, agitating gently for 40-60 seconds until a small ice clump remains.
Perform all subsequent steps under sterile conditions in a flow hood, disinfecting the cryovial with 70% ethanol before opening.
Carefully open the disinfected vial and transfer the cell suspension into a 15 ml centrifuge tube containing 8 ml of room-temperature culture medium, mixing gently.
Centrifuge the mixture at 300 x g for 3 minutes to separate the cells and carefully discard the supernatant containing residual freezing medium.
Gently resuspend the cell pellet in 10 ml of fresh culture medium. For adherent cells, divide the suspension between two T25 culture flasks; for suspension cultures, transfer all the medium into one T25 flask to promote effective cell interaction and growth.
Adhere to established subculture protocols for continued growth and maintenance of the cell line, ensuring reliable experimental outcomes.

КОНТРОЛЬ ЯКОСТІ ТА КРІОКОНСЕРВАЦІЯ

Стерильність

Зараження мікоплазмою виключається за допомогою аналізів на основі ПЛР та люмінесцентних методів виявлення мікоплазми. Щоб переконатися у відсутності бактеріального, грибкового або дріжджового забруднення, клітинні культури піддаються щоденному візуальному контролю.

Середовище для заморожування	Як середовище кріоконсервування ми використовуємо повне живильне середовище (включаючи FBS) + 10% ДМСО для адекватної життєздатності після відтавання або CM-1 (номер за каталогом Cytion 800100), до складу якого входять оптимізовані осмопротектори та метаболічні стабілізатори для прискорення відновлення та зменшення кріоіндукованого стресу.

Умови зберігання

Для тривалого зберігання помістіть флакони в парофазний рідкий азот при температурі від -150 до -196 °C. Зберігання при -80 °C допустиме лише як короткий проміжний етап перед перенесенням у рідкий азот.

Умови доставки

Кріоконсервовані клітинні лінії транспортуються на сухому льоду в перевіреній ізольованій упаковці з достатньою кількістю холодоагенту для підтримання температури приблизно -78 °C під час транспортування. При отриманні негайно огляньте контейнер і без зволікань перемістіть флакони у відповідне місце зберігання.

ДОНОР

Вік донора	Новонароджений

ПРАВОВІ ПИТАННЯ ТА БЕЗПЕКА

Заходи безпеки

Плануючи зберігати кріовіал у рідкому азоті для подальшого розморожування, обов'язково слід дотримуватися суворих заходів безпеки. Під час перенесення заморожених зразків до резервуара з рідким азотом або з нього необхідно використовувати захисні рукавички та одяг, а також маску або захисні окуляри. Це необхідно для того, щоб зменшити ризик травмування від потенційних кріогенних вибухів при вилученні, які можуть призвести до розльоту гострих осколків.

Гарантія

У Cytion ми відповідаємо за якість та життєздатність нашої продукції.
Ми гарантуємо, що наші клітини будуть життєздатними на початку культивування протягом 60 днів після відвантаження з нашого заводу.
Ми запевняємо, що всі матеріали відповідають специфікаціям, описаним у сертифікаті аналізу та/або паспорті продукту
Для отримання більш детальної інформації, будь ласка, зверніться до нашого Заяви про гарантію

Необхідна угода про передачу матеріалів	Yes