MFE-280

305587

ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ

Опис

Клітинна лінія MFE-280 — це клітинна лінія аденокарциноми ендометрія людського походження, яка є типовим представником низькодиференційованої (3-го ступеня) карциноми ендометрія. Ця клітинна лінія широко використовується в дослідженнях гінекологічних онкологічних захворювань для моделювання поведінки агресивних форм раку ендометрія, особливо тих, що супроводжуються несприятливим прогнозом. Клітини MFE-280 демонструють низьку або невизначувану експресію ізоформ естрогенових рецепторів (ER), що відрізняє їх від менш агресивних клітинних ліній раку ендометрія, таких як клітини Ісікава. Ця особливість робить їх ідеальною моделлю для вивчення ER-незалежних механізмів прогресування раку ендометрія.
Ці клітини використовуються для вивчення ролі молекулярних та клітинних шляхів, залучених до проліферації, інвазії та метастазування раку. Наприклад, клітини MFE-280 застосовували для оцінки впливу лептину — гормону, пов'язаного з ожирінням, яке є значним фактором ризику раку ендометрія. Лептин сприяє епітеліально-мезенхімальному переходу (EMT) та посилює проліферацію й інвазію клітин MFE-280 шляхом активації сигнального шляху JAK2/STAT3, що підкреслює його важливість у патогенезі раку ендометрія. Крім того, фармакологічні інгібітори, спрямовані на іонні канали аквапорину-1 (AQP1), продемонстрували ефективність у зниженні інвазивного потенціалу клітин MFE-280, що вказує на потенційні терапевтичні підходи до лікування агресивних форм раку ендометрія.
У рамках терапевтичних досліджень із використанням клітин MFE-280 також вивчалися селективні агоністи печінкового X-рецептора (LXR), такі як GW3965, які, як було показано, значно зменшують проліферацію цих клітин. Це підтверджує їхню корисність у виявленні нових мішеней для лікарських засобів та оцінці терапевтичних сполук, спрямованих на лікування запущених та резистентних до лікування форм раку ендометрія. Клітинна лінія MFE-280 залишається цінним ресурсом для вивчення механізмів, що лежать в основі агресивного раку ендометрія, та для вдосконалення терапевтичних стратегій.

Тканина	Ендометрій
Хвороба	Аденокарцинома

Синоніми

- MFE 280
- MFE280

КЛАСИФІКАЦІЯ

Організм	Людина
Секс	Жінка
Характеристики росту	Прихильник
Рівень біобезпеки	1

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Морфологія	Епітеліальноподібні
Пухлиноутворювальний	Так, у голих мишей

ІДЕНТИФІКАТОРИ

Посилання

MFE-280 (номер у каталозі Cytion — 305587)

Cytion GmbH
Nikola-Tesla-Str. 3
69124 Heidelberg
Tel: +49 (0)6221 405780
info@cytion.com
cytion.com

Registered office Heidelberg
VAT ID: DE283292917
Local court Mannheim - HRB 714394
CEO / Geschäftsführer: Jonathan Steubing

Banking information
Sparkasse Heidelberg
IBAN: DE35 6725 0020 0009 2076 86
BIC: SOLADES1HDB

Ідентифікаційний номер платника податків NCBI	9606
Целозавр	CVCL_1405

ЕКСПРЕСІЯ ТА СПРИЙНЯТЛИВІСТЬ

Рецептори, що експресуються

Прогестерон

ОБРОБКА ТА ВИРОЩУВАННЯ

Живильне середовище

45 % RPMI 1640 + 45 % MEM (з солями Ерла)

Атмосфера інкубації	37°C, 5% CO2, волога атмосфера.

Добавки

Додайте до середовища 10 % теплоінактивованого FBS, 1% ITS (0,625 мг/мл людського інсуліну, 0,625 мг/мл людського трансферину, 0,625 мкг/мл селеніту натрію, 0,535 мг/мл лінолевої кислоти, 125 мг/мл BSA) та 2 мМ L-глутаміну

Реагент для дисоціації	Аккутаза

Пересадка в нове середовище

Видаліть старе середовище з прилиплих клітин і промийте їх PBS, в якому бракує кальцію і магнію. Для колб T25 використовуйте 3-5 мл PBS, а для колб T75 - 5-10 мл. Потім повністю покрийте клітини TrypLE Express, використовуючи 1-2 мл для колб T25 і 2,5 мл для колб T75. Залиште клітини інкубуватися при кімнатній температурі протягом 8-10 хвилин, щоб відокремити їх. Після інкубації обережно змішайте клітини з 10 мл середовища, щоб ресуспендувати їх, а потім центрифугуйте при 300xg протягом 3 хвилин. Викиньте надосадову рідину, ресуспендуйте клітини у свіжому середовищі та перенесіть їх у нові колби, які вже містять свіже середовище.

Оновлення рідини	1–2 рази на тиждень

Розморожування та культивування

Confirm that the vial remains deeply frozen upon delivery, as cells are shipped on dry ice to maintain optimal temperatures during transit.
Upon receipt, either store the cryovial immediately at temperatures below -150°C to ensure the preservation of cellular integrity, or proceed to step 3 if immediate culturing is required.
For immediate culturing, swiftly thaw the vial by immersing it in a 37°C water bath with clean water and an antimicrobial agent, agitating gently for 40-60 seconds until a small ice clump remains.
Perform all subsequent steps under sterile conditions in a flow hood, disinfecting the cryovial with 70% ethanol before opening.
Carefully open the disinfected vial and transfer the cell suspension into a 15 ml centrifuge tube containing 8 ml of room-temperature culture medium, mixing gently.
Centrifuge the mixture at 300 x g for 3 minutes to separate the cells and carefully discard the supernatant containing residual freezing medium.
Gently resuspend the cell pellet in 10 ml of fresh culture medium. For adherent cells, divide the suspension between two T25 culture flasks; for suspension cultures, transfer all the medium into one T25 flask to promote effective cell interaction and growth.
Adhere to established subculture protocols for continued growth and maintenance of the cell line, ensuring reliable experimental outcomes.

КОНТРОЛЬ ЯКОСТІ ТА КРІОКОНСЕРВАЦІЯ

Стерильність

Зараження мікоплазмою виключається за допомогою аналізів на основі ПЛР та люмінесцентних методів виявлення мікоплазми.
Щоб переконатися у відсутності бактеріального, грибкового або дріжджового забруднення, клітинні культури піддаються щоденному візуальному контролю.

Середовище для заморожування	Як середовище кріоконсервування ми використовуємо повне живильне середовище (включаючи FBS) + 10% ДМСО для адекватної життєздатності після відтавання або CM-1 (номер за каталогом Cytion 800100), до складу якого входять оптимізовані осмопротектори та метаболічні стабілізатори для прискорення відновлення та зменшення кріоіндукованого стресу.

Умови зберігання

Для тривалого зберігання помістіть флакони в парофазний рідкий азот при температурі від -150 до -196 °C. Зберігання при -80 °C допустиме лише як короткий проміжний етап перед перенесенням у рідкий азот.

Умови доставки

Кріоконсервовані клітинні лінії транспортуються на сухому льоду в перевіреній ізольованій упаковці з достатньою кількістю холодоагенту для підтримання температури приблизно -78 °C під час транспортування. При отриманні негайно огляньте контейнер і без зволікань перемістіть флакони у відповідне місце зберігання.

ДОНОР

Вік донора	77 років
Етнічна приналежність	Кавказець

ПРАВОВІ ПИТАННЯ ТА БЕЗПЕКА

Заходи безпеки

Плануючи зберігати кріовіал у рідкому азоті для подальшого розморожування, обов'язково слід дотримуватися суворих заходів безпеки. Під час перенесення заморожених зразків до резервуара з рідким азотом або з нього необхідно використовувати захисні рукавички та одяг, а також маску або захисні окуляри. Це необхідно для того, щоб зменшити ризик травмування від потенційних кріогенних вибухів при вилученні, які можуть призвести до розльоту гострих осколків.

Гарантія

У Cytion ми відповідаємо за якість та життєздатність нашої продукції.
Ми гарантуємо, що наші клітини будуть життєздатними на початку культивування протягом 60 днів після відвантаження з нашого заводу.
Ми запевняємо, що всі матеріали відповідають специфікаціям, описаним у сертифікаті аналізу та/або паспорті продукту
Для отримання більш детальної інформації, будь ласка, зверніться до нашого Заяви про гарантію

Необхідна угода про передачу матеріалів	Yes

ДЕТАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ ПРО ТОВАР

Таблиця складу