SW756

305588

GENERELL INFORMASJON

Beskrivelse

SW756 er en human cellelinje for livmorhalskreft som stammer fra et primært plateepitelkarsinom i livmorhalsen hos en voksen kvinne. Den inngikk tidlig i et omfattende arbeid med å karakterisere cellelinjer, og er validert som fri for HeLa-kontaminering basert på isoenzymtyping av glukose-6-fosfatdehydrogenase (G6PD), som bekreftet at den er av type B, i motsetning til HeLa-celler, som er av type A. Dette sikrer dens autentisitet som en distinkt modell for livmorhalskreft.
SW756 er klassifisert som plateepitelkarsinom og har blitt brukt i ulike genomiske og proteomiske profileringsstudier, inkludert storskala farmakogenomiske og funksjonelle genomiske datasett. I proteomprofilstudier som ProCan-DepMapSanger-datasettet bidrar SW756 til en bredere forståelse av regulering av proteinuttrykk, særlig i forhold til posttranskripsjonelle modifikasjoner og korrelasjoner med legemiddelrespons. Slike datasett har vist at proteomiske data fra SW756, i likhet med andre cellelinjer, kan avsløre mønstre av linjespesifikt uttrykk og reguleringsmekanismer som ikke alltid er tydelige på transkriptomisk nivå, noe som understreker nytten av SW756 i integrerte multi-omiske analyser.

Vev	Livmor, livmorhals
Sykdom	Plateepitelkarsinom

Synonymer

- SW-756
- SW 756

KLASSIFISERING

Organisme	Menneske
Sex	Kvinne
Vekstegenskaper	Tilhenger
Biosikkerhetsnivå	1

EGENSKAPER

Fordoblingstid	1.6 dager

IDENTIFIKATORER

Kildehenvisning

SW756 (Cytion-katalognummer 305588)

NCBI-skattenummer	9606
Cellosaurus	CVCL_1727

UTTRYKK OG MOTTAKELIGHET

Mutasjonsprofil

Mutasjon: p.Gly12Cys, heterozygot

Cytion GmbH
Nikola-Tesla-Str. 3
69124 Heidelberg
Tel: +49 (0)6221 405780
info@cytion.com
cytion.com

Registered office Heidelberg
VAT ID: DE283292917
Local court Mannheim - HRB 714394
CEO / Geschäftsführer: Jonathan Steubing

Banking information
Sparkasse Heidelberg
IBAN: DE35 6725 0020 0009 2076 86
BIC: SOLADES1HDB

HÅNDTERING OG KULTUR

Næringsmedium

DMEM, m: 4,5 g/L glukose, m: 4 mM L-glutamin, m: 3,7 g/L NaHCO3, m: 1,0 mM natriumpyruvat (Cytion artikkelnummer 820300a)

Inkubasjonsatmosfære	37 °C, 5 %CO2, befuktet atmosfære.

Kosttilskudd

Suppler mediet med 10 % FBS

Dissosiasjonsmiddel	Accutase

Tining og dyrking

Confirm that the vial remains deeply frozen upon delivery, as cells are shipped on dry ice to maintain optimal temperatures during transit.
Upon receipt, either store the cryovial immediately at temperatures below -150°C to ensure the preservation of cellular integrity, or proceed to step 3 if immediate culturing is required.
For immediate culturing, swiftly thaw the vial by immersing it in a 37°C water bath with clean water and an antimicrobial agent, agitating gently for 40-60 seconds until a small ice clump remains.
Perform all subsequent steps under sterile conditions in a flow hood, disinfecting the cryovial with 70% ethanol before opening.
Carefully open the disinfected vial and transfer the cell suspension into a 15 ml centrifuge tube containing 8 ml of room-temperature culture medium, mixing gently.
Centrifuge the mixture at 200 x g for 5 minutes, carefully discard the supernatant containing freezing medium.
Follow the procedure described under Post-Thaw Recovery

KVALITETSKONTROLL OG KRYOKONSERVERING

Frysemedium	Som kryopreserveringsmedium bruker vi komplett vekstmedium + 10 % DMSO for å sikre tilstrekkelig levedyktighet etter opptining.

Oppbevaringsbetingelser

For langtidsoppbevaring plasseres hetteglassene i flytende nitrogen i dampfase ved ca. -150 til -196 °C. Lagring ved -80 °C er kun akseptabelt som et kort mellomtrinn før overføring til flytende nitrogen.

Fraktvilkår

Kryopreserverte cellelinjer sendes på tørris i validert, isolert emballasje med tilstrekkelig kjølemiddel til å opprettholde en temperatur på ca. -78 °C under hele transporten. Ved mottak skal beholderen inspiseres umiddelbart, og hetteglassene skal straks overføres til egnet lagringsplass.

DONOR

Donorens alder	46 år
Etnisitet	Kaukasisk

JURIDISK OG SIKKERHET

Sikkerhetsregler

Når du planlegger å oppbevare et kryovial i flytende nitrogen for senere tining, er det obligatorisk å følge strenge sikkerhetstiltak. Det er viktig å bruke egnede vernehansker og -klær, og det er påbudt å bruke ansiktsmaske eller vernebriller under overføring av frosne prøver til eller fra tanken med flytende nitrogen. Dette er for å redusere risikoen for skader som følge av potensielle kryovæskeeksplosjoner ved fjerning, noe som kan føre til at skarpe fragmenter slynges ut.

Garanti

Hos Cytion står vi bak kvaliteten og levedyktigheten til produktene våre.
Vi garanterer at cellene våre vil være levedyktige ved starten av dyrkingen i 60 dager etter at de er sendt fra våre anlegg.
Vi forsikrer at alle materialer er i samsvar med spesifikasjonene som er beskrevet i analysesertifikatet og/eller produktarket
For fullstendig informasjon, se vår <a href=""/Who-we-are/Warranty/"" hreflang=""x-default"">Garantierklæring

Avtale om materialoverføring kreves	Yes