ProPak-A.6

305599

ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ

Опис

ProPak-A.6 (PPA.6) — це лінія упаковувальних клітин, отримана з нирок людського плода, створена для виробництва ретровірусних векторів, нездатних до реплікації. ProPak-A.6 стабільно експресує послідовності E1A аденовірусу-5 (для транскрипційної трансактивації) разом із білками, пов'язаними з gag, pol та env, що походять від мишачого лейкемічного вірусу (MLV), що забезпечує ефективне упакування рекомбінантних ретровірусних геномів у неінфекційні вірусні частинки на основі MLV. Класифікація GMO-S1 відображає стабільну інтеграцію цих вірусних трансгенів.
ProPak-A.6 застосовується як клітинна лінія для упаковки з метою отримання рекомбінантних ретровірусних векторів на основі MLV з високим титром для перенесення генів у клітини-мішені. Її використовують у виробництві векторів для генної терапії, стабільній трансдукції популяцій клітин, що діляться, та дослідженнях, що вимагають ефективної ретровірусної доставки трансгенів. Аденовірусний компонент E1A підсилює промотор-опосередковану експресію, підвищуючи ефективність вірусного виробництва. Користувачі повинні дотримуватися чинних правил біобезпеки для роботи з ретровірусними векторами рівня BSL-2.

Тканина	Нирка плода
Хвороба	Нормальна нирка плода (клітинна лінія для упаковки ретровірусів; непухлинна)
Місце метастазування	Не застосовується (непухлинна клітинна лінія для упаковки)

Застосування

Виробництво ретровірусних векторів; виготовлення векторів для генної терапії; стабільна трансдукція клітин, що діляться; ретровірусна доставка генів на основі MLV; упаковка ретровірусів за допомогою аденовірусів; дослідження в галузі генного перенесення

Синоніми

- ProPakA.6
- PPA.6
- PP-A.6

КЛАСИФІКАЦІЯ

Організм	Людина
Секс	Жінка
Характеристики росту	Прихильник
Статус ГМО	GMO-S1

Детальна інформація щодо статусу ГМО

GMO-S1: This human kidney-derived cell line (ProPaka.6) contains plasmid constructs encoding adenovirus-5 sequences together with gag-, pol-, and env-related proteins that form non-infectious murine leukemia virus particles. The inserts are stably integrated. This classification applies only within Germany and may differ elsewhere.

Рівень біобезпеки	2

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Морфологія	Епітеліальноподібні
Тип клітини	Епітеліальні клітини

Cytion GmbH
Nikola-Tesla-Str. 3
69124 Heidelberg
Tel: +49 (0)6221 405780
info@cytion.com
cytion.com

Registered office Heidelberg
VAT ID: DE283292917
Local court Mannheim - HRB 714394
CEO / Geschäftsführer: Jonathan Steubing

Banking information
Sparkasse Heidelberg
IBAN: DE35 6725 0020 0009 2076 86
BIC: SOLADES1HDB

Час подвоєння	приблизно від 24 до 36 годин

ІДЕНТИФІКАТОРИ

Посилання

ProPak-A.6 (номер у каталозі Cytion — 305599)

Ідентифікаційний номер платника податків NCBI	9606
Целозавр	CVCL_8968

ОБРОБКА ТА ВИРОЩУВАННЯ

Живильне середовище

ДМЕМ, w: 4,5 г/л Глюкоза, w: 4 мМ L-глутамін, w: 3,7 г/л NaHCO3, w: 1,0 мМ піруват натрію (цит. номер 820300a)

Атмосфера інкубації	37°C, 5% CO2, волога атмосфера.

Добавки

Додайте до середовища 10% FBS

Реагент для дисоціації	Аккутаза

Пересадка в нове середовище

Видалити середовище, промити PBS без кальцію та магнію, залити Accutase, інкубувати 8–10 хв при кімнатній температурі, ресуспендувати в середовищі, центрифугувати при 300×g протягом 3 хв, злити супернатант, пересіяти в свіже середовище.

Коефіцієнт розподілу	від 1 до 5
Щільність висіву	2–4 × 10^4/см²
Оновлення рідини	Кожні 1–2 дні

Розморожування та культивування

Confirm that the vial remains deeply frozen upon delivery, as cells are shipped on dry ice to maintain optimal temperatures during transit.
Upon receipt, either store the cryovial immediately at temperatures below -150°C to ensure the preservation of cellular integrity, or proceed to step 3 if immediate culturing is required.
For immediate culturing, swiftly thaw the vial by immersing it in a 37°C water bath with clean water and an antimicrobial agent, agitating gently for 40-60 seconds until a small ice clump remains.
Perform all subsequent steps under sterile conditions in a flow hood, disinfecting the cryovial with 70% ethanol before opening.
Carefully open the disinfected vial and transfer the cell suspension into a 15 ml centrifuge tube containing 8 ml of room-temperature culture medium, mixing gently.
Centrifuge the mixture at 200 x g for 5 minutes, carefully discard the supernatant containing freezing medium.
Follow the procedure described under Post-Thaw Recovery

КОНТРОЛЬ ЯКОСТІ ТА КРІОКОНСЕРВАЦІЯ

Середовище для заморожування	В якості середовища для кріоконсервування ми використовуємо повне живильне середовище + 10% ДМСО для адекватної життєздатності після розморожування.

Умови зберігання

Для тривалого зберігання помістіть флакони в парофазний рідкий азот при температурі від -150 до -196 °C. Зберігання при -80 °C допустиме лише як короткий проміжний етап перед перенесенням у рідкий азот.

Умови доставки

Кріоконсервовані клітинні лінії транспортуються на сухому льоду в перевіреній ізольованій упаковці з достатньою кількістю холодоагенту для підтримання температури приблизно -78 °C під час транспортування. При отриманні негайно огляньте контейнер і без зволікань перемістіть флакони у відповідне місце зберігання.

ДОНОР

Вік донора	Плід

ПРАВОВІ ПИТАННЯ ТА БЕЗПЕКА

Заходи безпеки

Плануючи зберігати кріовіал у рідкому азоті для подальшого розморожування, обов'язково слід дотримуватися суворих заходів безпеки. Під час перенесення заморожених зразків до резервуара з рідким азотом або з нього необхідно використовувати захисні рукавички та одяг, а також маску або захисні окуляри. Це необхідно для того, щоб зменшити ризик травмування від потенційних кріогенних вибухів при вилученні, які можуть призвести до розльоту гострих осколків.

Гарантія

У Cytion ми відповідаємо за якість та життєздатність нашої продукції.
Ми гарантуємо, що наші клітини будуть життєздатними на початку культивування протягом 60 днів після відвантаження з нашого заводу.
Ми запевняємо, що всі матеріали відповідають специфікаціям, описаним у сертифікаті аналізу та/або паспорті продукту
Для отримання більш детальної інформації, будь ласка, зверніться до нашого Заяви про гарантію

Необхідна угода про передачу матеріалів	Yes