NOMO-1

305604

GENERAL INFORMATION

Description

קו תאים זה מפגין מאפיינים פרו-מונוציטיים, מה (AML-M5a). נגזר ממטופלת בת 31 שאובחנה כסובלת מלוקמיה מונוציטית חריפה NOMO-1 שהופך אותו למודל אמין לחקר לוקמיה מונוציטית ותהליך ההתמיינות. תאי NOMO-1 מגיבים לחומרים המשרים התמיינות כגון אסטרי פורבול (למשל, 12-o-tetradecanoyl phorbol-13-acetate או TPA), מה שמוביל להתבגרותם לתאים דמויי מקרופאגים. עם ההתמיינות, התאים מפגינים ביטוי מוגבר של IL-1α ו-IL-1β, סמנים כגון פיברונקטין והפרשת האינטרלוקינים שהם חיוניים לתגובה החיסונית ולמסלולי הדלקת.
תאי NOMO-1 מבטאים רקמתי גורם (TF), מעכב פלסמינוגן (PA) ומפעיל פלסמינוגן (PA), ובפרט את ה-PA וה-TF. תאי NOMO-1 מגביר את ייצור ה-TPA כאשר רמות ההפרשה מווסתות על ידי חומרים המשרים התמיינות. טיפול ב-PAI, מפעיל פלסמינוגן מסוג אורוקינאז (uPA), להבנת מנגנוני ההמוסטאזיס והטרומבוזיס בלוקמיה NOMO-1 דבר המעיד על חשיבותם של תאי PAI-תוך הגברת הפרשת ה-uPA.
המהווה סימן היכר של תת-סוגים MLL-AF9, המובילה להיווצרות גן היתוך t(9;11)(p22;q23) נושאים את הטרנסלוקציה NOMO-1 מבחינה גנטית, תאי טרנסלוקציה זו מובילה להיווצרות לוקמיה על ידי שיבוש בתוכניות ביטוי הגנים הקשורות להבחנה מסוימים של לוקמיה מיאלואידית חריפה (AML). ולהערכת טיפולים MLL לכלי חיוני לחקר לוקמיות עם שינוי במבנה הגן NOMO-1 ולהתפשטות של תאי הדם. נוכחותה של טרנסלוקציה זו הופכת את ממוקדים.

Tissue	מח עצם
Disease	לוקמיה מונוציטית חריפה במבוגרים

Synonyms

- Nomo-1
- NOMO1

CLASSIFICATION

Organism	Human
Sex	Female
Growth properties	Suspension
Biosafety level	1

CHARACTERISTICS

Morphology	דמוי לימפוציט

IDENTIFIERS

Citation

NOMO-1 (מספר קטלוג של Cytion: 305604)

NCBI TaxID	9606
Cellosaurus	CVCL_1609

EXPRESSION AND SUSCEPTIBILITY

Antigen expression

CD3-, CD4+, CD13+, CD14-, CD15+, CD19-, CD33+, CD34-, HLA-DR+

Cytion GmbH
Nikola-Tesla-Str. 3
69124 Heidelberg
Tel: +49 (0)6221 405780
info@cytion.com
cytion.com

Registered office Heidelberg
VAT ID: DE283292917
Local court Mannheim - HRB 714394
CEO / Geschäftsführer: Jonathan Steubing

Banking information
Sparkasse Heidelberg
IBAN: DE35 6725 0020 0009 2076 86
BIC: SOLADES1HDB

HANDLING AND CULTURE

Culture medium

RPMI 1640, w: 2.0 mM גלוטמין יציב, w: 2.0 g/L NaHCO3 (מספר קטלוגי של Cytion 820700a)

Incubation atmosphere	37°C, 5%CO2, אווירה לחה.

Supplements

מנוטרל בחום FBS הוסף לתווך 10%

Seeding density	3–5 × 10^5/מ"ל

Thawing and culturing

Confirm that the vial remains deeply frozen upon delivery, as cells are shipped on dry ice to maintain optimal temperatures during transit.
Upon receipt, either store the cryovial immediately at temperatures below -150°C to ensure the preservation of cellular integrity, or proceed to step 3 if immediate culturing is required.
For immediate culturing, swiftly thaw the vial by immersing it in a 37°C water bath with clean water and an antimicrobial agent, agitating gently for 40-60 seconds until a small ice clump remains.
Perform all subsequent steps under sterile conditions in a flow hood, disinfecting the cryovial with 70% ethanol before opening.
Carefully open the disinfected vial and transfer the cell suspension into a 15 ml centrifuge tube containing 8 ml of room-temperature culture medium, mixing gently.
Centrifuge the mixture at 300 x g for 3 minutes to separate the cells and carefully discard the supernatant containing residual freezing medium.
Gently resuspend the cell pellet in 10 ml of fresh culture medium. For adherent cells, divide the suspension between two T25 culture flasks; for suspension cultures, transfer all the medium into one T25 flask to promote effective cell interaction and growth.
Adhere to established subculture protocols for continued growth and maintenance of the cell line, ensuring reliable experimental outcomes.

QUALITY CONTROL AND CRYOPRESERVATION

Sterility

ושיטות זיהוי מיקופלסמה מבוססות לומניסצנציה PCR זיהום במיקופלסמה נשלל באמצעות בדיקות מבוססות.
כדי להבטיח שאין זיהום חיידקי, פטרייתי או שמרי, תרבויות התאים עוברות בדיקות ויזואליות יומיות.

Freeze medium	כדי להבטיח 10% DMSO + (FBS כולל) כמדיום לשימור בקירור, אנו משתמשים במדיום גידול מלא הכולל חומרים אוסמו-, (Cytion 800100 מספר קטלוגי) CM-1 חיוניות נאותה לאחר ההפשרה, או מגנים ומייצבי מטבוליזם משופרים כדי לשפר את ההתאוששות ולהפחית את הלחץ הנגרם מהקפאה.

Storage conditions

לשימור לטווח ארוך, יש להניח את הבקבוקונים בחנקן נוזלי במצב של אדי בטמפרטורה של כ-150 עד 196 מעלות צלזיוס. אחסון בטמפרטורה של 80 מעלות צלזיוס מקובל רק כצעד ביניים קצר לפני העברה לחנקן נוזלי.

Shipping conditions

במהלך C-שורות תאים שהוקפאו נשלחות בקרח יבש באריזה מאושרת ומבודדת עם כמות מספקת של חומר קירור כדי לשמור על טמפרטורה של כ-78° ההובלה. עם קבלת המשלוח, יש לבדוק את המכל מיד ולהעביר את הבקבוקונים ללא דיחוי לאחסון מתאים.

DONOR

Donor age	31 שנים
Ethnicity	יפנית

LEGAL AND SAFETY

Safety precautions

כאשר מתכננים לאחסן קריוביאל בחנקן נוזלי להפשרה עתידית, חובה להקפיד על אמצעי בטיחות מחמירים. יש להקפיד על שימוש בכפפות ובבגדים מגנים מתאימים, וכן על שימוש במסכת פנים או משקפי מגן בעת העברת דגימות קפואות אל מיכל החנקן הנוזלי או ממנו. זאת כדי להפחית את הסיכון לפציעה כתוצאה מפיצוץ אפשרי של הקריוביאל בעת הוצאתו, העלול לגרום להתזת רסיסים חדים.

Warranty

ב-Cytion, אנו עומדים מאחורי האיכות והכדאיות של המוצרים שלנו.
אנו מבטיחים שתאינו יהיו קיימים בתחילת התרבית למשך
60 יום לאחר המשלוח מהמתקנים שלנו.
אנו מבטיחים שכל החומרים תואמים למפרטים המתוארים
בתעודת הניתוח ו/או בדף המוצר.
לפרטים מלאים, אנא עיינו ב
<a href=""/Who-we-are/Warranty/"" hreflang=""x-default"">הצהרת האחריות שלנו

Material Transfer Agreement required	Yes

Cytion GmbH
Nikola-Tesla-Str. 3
69124 Heidelberg
Tel: +49 (0)6221 405780
info@cytion.com
cytion.com

Registered office Heidelberg
VAT ID: DE283292917
Local court Mannheim - HRB 714394
CEO / Geschäftsführer: Jonathan Steubing

Banking information
Sparkasse Heidelberg
IBAN: DE35 6725 0020 0009 2076 86
BIC: SOLADES1HDB