NOR-10

305605

YLEISTÄ TIETOA

Kuvaus

NOR-10-solulinja on fibroblastimalli, joka on peräisin C57BL/10-hiirten normaalista luustolihaskudoksesta. Tätä solulinjaa käytetään laajasti myogeneesin, solunulkoisen matriisin (ECM) biologian ja luustolihaksen korjautumisen tutkimuksissa. NOR-10-fibroblastien tiedetään syntetisoivan keskeisiä ekstrasellulaarisen matriisin komponentteja, kuten kollageenia ja laminiinia, jotka ovat välttämättömiä rakenteellisen eheyden ylläpitämiselle ja soluprosessien, kuten myoblastien adheesion, migraation ja erilaistumisen, tukemiselle. Näillä soluilla on keskeinen rooli kudostekniikan tutkimuksessa, erityisesti sellaisissa yhteisviljelyjärjestelmissä, jotka on suunniteltu jäljittelemään luustolihaksen in vivo -mikroympäristöä.
Kudostekniikan sovelluksissa NOR-10-solujen on osoitettu edistävän lihassyiden muodostumista, kun niitä viljellään yhdessä myoblastien kanssa tai käytetään fibroblastien ehdollistamassa viljelyliuoksessa (fCM). Tämä vaikutus johtuu parakriinisestä signalointijärjestelmästä, jota välittävät fibroblastien erittämät kasvutekijät ja sytokiinit, mukaan lukien fibroblastikasvutekijät (FGF:t) ja insuliinin kaltaiset kasvutekijät (IGF:t), jotka edistävät satelliittisolujen lisääntymistä ja erilaistumista myoblasteiksi. Kun NOR-10-fibroblasteja viljellään myoblastien kanssa, ne edistävät ekstrasellulaarisen matriisin (ECM) komponenttien kertymistä, jotka ohjaavat myotubien suuntautumista ja fuusiota, mikä tekee niistä välttämättömiä biomimeettisten lihaskudosten kehittämisessä.
Edistyneessä biomateriaalitutkimuksessa NOR-10-fibroblasteja on hyödynnetty 3D-hydrogeelirunkojen luomisessa solujen ja ekstrasellulaarimatriisin välisten vuorovaikutusten sekä kasvaimen mikroympäristöjen tutkimiseksi. Niiden kyky erittää aktiivisesti ECM-molekyylejä ja osallistua solujen ja matriisin väliseen adheesioon tekee niistä tehokkaan mallin dynaamisten solukäyttäytymisten, kuten migraation ja proliferaation, tutkimiseen keinotekoisissa ympäristöissä. Nämä ominaisuudet korostavat NOR-10-solujen monipuolisuutta ja merkitystä sekä regeneratiivisessa lääketieteessä että syöpäbiologiassa.

Kudos	Vatsa, luustolihakset
Sairaus	Normaali

Synonyymit

- NOR 10
- NOR10
- Nor10
- Normal fibroblast-10

LUOKITTELU

Organismi	Hiiri
Sukupuoli	Määrittelemätön
Kasvuominaisuudet	Kiinnittynyt
Bioturvallisuustaso	1

OMINAISUUDET

Morfologia	Fibroblastien kaltaiset
Solutyyppi	Fibroblastit

TUNNISTEET

Lähdeviite

NOR-10 (Cytionin tuotenumero 305605)

Cytion GmbH
Nikola-Tesla-Str. 3
69124 Heidelberg
Tel: +49 (0)6221 405780
info@cytion.com
cytion.com

Registered office Heidelberg
VAT ID: DE283292917
Local court Mannheim - HRB 714394
CEO / Geschäftsführer: Jonathan Steubing

Banking information
Sparkasse Heidelberg
IBAN: DE35 6725 0020 0009 2076 86
BIC: SOLADES1HDB

NCBI-verotunnus	10090
Cellosaurus	CVCL_3939

ILMENTYMINEN JA ALTTIUS

Antigeenin ilmentyminen

H-2b +

KÄSITTELY JA VILJELY

Viljelyalusta

DMEM, w: 4,5 g/l glukoosia, w: 4 mM L-glutamiinia, w: 3,7 g/l NaHCO3, w: 1,0 mM natriumpyruvaattia (Cytionin artikkelinumero 820300a)

Inkubaatioilma	37 °C, 5 %CO2, kostutettu ilmakehä.

Ravintolisät

Täydennetään elatusainetta 20 %:lla FBS:llä

Dissosiaatioreagenssi	Accutase

Soluviljely

Poista vanha väliaine tarttuneista soluista ja pese ne PBS:llä, josta puuttuu kalsiumia ja magnesiumia. Käytä T25-pulloissa 3-5 ml PBS:ää ja T75-pulloissa 5-10 ml. Peitä sitten solut kokonaan TrypLE Express -valmisteella, käyttäen 1-2 ml T25-pulloissa ja 2,5 ml T75-pulloissa. Anna solujen inkuboitua huoneenlämmössä 8-10 minuuttia solujen irtoamiseksi. Inkuboinnin jälkeen sekoita solut varovasti 10 ml:lla elatusainetta niiden resuspendoimiseksi ja sentrifugoi sitten 300xg:n nopeudella 3 minuutin ajan. Hävitä supernatantti, suspendoi solut uudelleen tuoreeseen väliaineeseen ja siirrä ne uusiin pulloihin, jotka sisältävät jo tuoretta väliaineita.

Nesteen uusiminen	2-3 kertaa viikossa

Sulatus ja viljely

Confirm that the vial remains deeply frozen upon delivery, as cells are shipped on dry ice to maintain optimal temperatures during transit. Upon receipt, either store the cryovial immediately at temperatures below -150°C to ensure the preservation of cellular integrity, or proceed to step 3 if immediate culturing is required.
For immediate culturing, swiftly thaw the vial by immersing it in a 37°C water bath with clean water and an antimicrobial agent, agitating gently for 40-60 seconds until a small ice clump remains.
Perform all subsequent steps under sterile conditions in a flow hood, disinfecting the cryovial with 70% ethanol before opening.
Carefully open the disinfected vial and transfer the cell suspension into a 15 ml centrifuge tube containing 8 ml of room-temperature culture medium, mixing gently.
Centrifuge the mixture at 300 x g for 3 minutes to separate the cells and carefully discard the supernatant containing residual freezing medium.
Gently resuspend the cell pellet in 10 ml of fresh culture medium. For adherent cells, divide the suspension between two T25 culture flasks; for suspension cultures, transfer all the medium into one T25 flask to promote effective cell interaction and growth.
Adhere to established subculture protocols for continued growth and maintenance of the cell line, ensuring reliable experimental outcomes.

LAADUNVALVONTA JA KRYOSÄILYTYS

Hedelmättömyys

Mykoplasmakontaminaatio suljetaan pois sekä PCR-pohjaisilla määrityksillä että luminesenssiin perustuvilla mykoplasman osoitusmenetelmillä.
Bakteeri-, sieni- tai hiivakontaminaation välttämiseksi soluviljelmät tarkastetaan päivittäin silmämääräisesti.

Jäädytysaine	Kryosäilytysmediana käytämme täydellistä kasvualustaa (mukaan lukien FBS) + 10 % DMSO:ta riittävän sulatuksen jälkeisen elinkelpoisuuden varmistamiseksi tai CM-1:tä (Cytionin luettelonumero 800100), joka sisältää optimoituja osmoprotectantteja ja metabolisia stabilisaattoreita, jotka parantavat elpymistä ja vähentävät kryosäilytyksen aiheuttamaa stressiä.

Säilytysolosuhteet

Pitkäaikaissäilytystä varten injektiopullot asetetaan höyryfaasissa olevaan nestemäiseen typpeen noin -150 - -196 °C:een. Säilytys -80 °C:ssa on hyväksyttävää vain lyhyenä välivaiheena ennen siirtoa nestemäiseen typpeen.

Toimitusehdot

Kryosäilytetyt solulinjat kuljetetaan kuivajäässä validoidussa, eristetyssä pakkauksessa, jossa on riittävästi kylmäainetta, jotta lämpötila pysyy noin -78 °C:ssa koko kuljetuksen ajan. Pakkaus on tarkastettava välittömästi sen vastaanottamisen jälkeen ja injektiopullot on siirrettävä viipymättä asianmukaiseen varastoon.

LAHJOITTAJA

Rotua / alalajia	C57BL/10
Luovuttajan ikä	1 kuukausi

OIKEUDELLISET JA TURVALLISUUSASIAT

Turvallisuusohjeet

Kun suunnitellaan kryoputken säilyttämistä nestemäisessä typessä sulatusta varten, on noudatettava tiukkoja turvatoimenpiteitä. Asianmukaiset suojakäsineet ja -vaatteet ovat välttämättömiä, ja kasvonaamarin tai suojalasien käyttö on välttämätöntä siirrettäessä jäädytettyjä näytteitä nestetyppisäiliöön tai siitä pois. Tällä pyritään pienentämään loukkaantumisriskiä, joka aiheutuu kryoputkien mahdollisista räjähdyksistä, jotka voivat aiheuttaa terävien sirpaleiden sinkoutumisen.

Takuu

Me Cytionilla seisomme tuotteidemme laadun ja elinkelpoisuuden takana.
Takaamme, että solumme ovat elinkelpoisia viljelyn alkaessa 60 päivän ajan sen jälkeen, kun ne on lähetetty laitoksestamme.
Vakuutamme, että kaikki materiaalit ovat analyysitodistuksessa ja/tai tuoteselosteessa kuvattujen eritelmien mukaisia
Lisätietoja on <a href=""/Who-we-are/Warranty/"" hreflang=""""x-default"""">Takuulausumassa

Aineiden siirtoa koskeva sopimus vaaditaan	Yes

Cytion GmbH
Nikola-Tesla-Str. 3
69124 Heidelberg
Tel: +49 (0)6221 405780
info@cytion.com
cytion.com

Registered office Heidelberg
VAT ID: DE283292917
Local court Mannheim - HRB 714394
CEO / Geschäftsführer: Jonathan Steubing

Banking information
Sparkasse Heidelberg
IBAN: DE35 6725 0020 0009 2076 86
BIC: SOLADES1HDB