NU-DUL-1

305607

INFORMAÇÕES GERAIS

Descrição

A NU-DUL-1 é uma linha celular de linfoma difuso de grandes células B (DLBCL) humano, derivada de um doente adulto. Esta linha celular destaca-se pela sua utilidade no estudo dos mecanismos moleculares e celulares subjacentes ao linfoma não de Hodgkin, em particular ao subtipo agressivo de linfoma difuso de grandes células B. As células NU-DUL-1 apresentam características distintivas do DLBCL, incluindo diferenciação anormal das células B e vias de sinalização desreguladas, o que as torna um modelo in vitro relevante para a investigação do linfoma.
As células NU-DUL-1 crescem em suspensão, apresentando uma morfologia redonda e unicelular típica das células linfoblastoides. Apresentam anomalias genéticas frequentemente associadas ao linfoma difuso de grandes células B, constituindo uma ferramenta importante para a análise de vias de sinalização oncogénicas, mecanismos de resistência aos fármacos e potenciais alvos terapêuticos. Os investigadores utilizam frequentemente as células NU-DUL-1 para investigar a eficácia de agentes quimioterapêuticos e anticorpos monoclonais, bem como as respostas moleculares a terapias direcionadas.
Esta linha celular é adequada para estudos sobre imunologia tumoral, uma vez que mantém características relevantes para a evasão imunitária e as interações com o microambiente tumoral. A linha celular NU-DUL-1 constitui uma plataforma robusta para a investigação pré-clínica, proporcionando novos conhecimentos sobre a biologia do DLBCL e contribuindo para o desenvolvimento de novas estratégias terapêuticas para este subtipo agressivo de linfoma.

Tecido	Cérebro
Doença	Linfoma difuso de grandes células B

Sinónimos

- NUDUL-1
- NUDUL1

CLASSIFICAÇÃO

Organismo	Humano
Sexo	Masculino
Propriedades de crescimento	Suspensão
Nível de biossegurança	1

CARACTERÍSTICAS

Morfologia	Polimórfico
Tipo de célula	Linfócito

IDENTIFICADORES

Referência

NU-DUL-1 (número de catálogo da Cytion 305607)

Número de identificação fiscal do NCBI	9606
Cellosaurus	CVCL_1877

Cytion GmbH
Nikola-Tesla-Str. 3
69124 Heidelberg
Tel: +49 (0)6221 405780
info@cytion.com
cytion.com

Registered office Heidelberg
VAT ID: DE283292917
Local court Mannheim - HRB 714394
CEO / Geschäftsführer: Jonathan Steubing

Banking information
Sparkasse Heidelberg
IBAN: DE35 6725 0020 0009 2076 86
BIC: SOLADES1HDB

EXPRESSÃO E SUSCETIBILIDADE

Expressão do antígeno

CD3 -, CD10 +, CD13 -, CD19 +, CD20 +, CD34 -, CD37 +, CD38 +, cyCD79a +, CD138 -, HLA-DR+, sm/cyIgG+, sm/cyIgM-, sm/cykappa-, sm/cylambda+

Perfil mutacional

Mutação: KRAS, p.Asp119Asn (c.355G>A), heterozigótica; Mutação: TP53, p.Val143Met (c.427G>A), heterozigótica; Mutação: TP53, p.Arg248Gln (c.743G>A), heterozigótica

MANUSEAMENTO E CULTURA

Meio de cultura

RPMI 1640, com: 2,0 mM de glutamina estável, com: 2,0 g/L NaHCO3 (número de artigo Cytion 820700a)

Atmosfera de incubação	37°C, 5%CO2, atmosfera humidificada.

Suplementos

Completar o meio com 10% de FBS

Renovação de fluidos	2 a 3 vezes por semana

Descongelamento e cultura

Confirm that the vial remains deeply frozen upon delivery, as cells are shipped on dry ice to maintain optimal temperatures during transit.
Upon receipt, either store the cryovial immediately at temperatures below -150°C to ensure the preservation of cellular integrity, or proceed to step 3 if immediate culturing is required.
For immediate culturing, swiftly thaw the vial by immersing it in a 37°C water bath with clean water and an antimicrobial agent, agitating gently for 40-60 seconds until a small ice clump remains.
Perform all subsequent steps under sterile conditions in a flow hood, disinfecting the cryovial with 70% ethanol before opening.
Carefully open the disinfected vial and transfer the cell suspension into a 15 ml centrifuge tube containing 8 ml of room-temperature culture medium, mixing gently.
Centrifuge the mixture at 300 x g for 3 minutes to separate the cells and carefully discard the supernatant containing residual freezing medium.
Gently resuspend the cell pellet in 10 ml of fresh culture medium. For adherent cells, divide the suspension between two T25 culture flasks; for suspension cultures, transfer all the medium into one T25 flask to promote effective cell interaction and growth.
Adhere to established subculture protocols for continued growth and maintenance of the cell line, ensuring reliable experimental outcomes.

CONTROLO DE QUALIDADE E CRIOPRESERVAÇÃO

Esterilidade

A contaminação por micoplasma é excluída utilizando ensaios baseados em PCR e métodos de deteção de micoplasma baseados em luminescência.
Para garantir que não há contaminação bacteriana, fúngica ou de leveduras, as culturas de células são sujeitas a inspecções visuais diárias.

Meio de congelação	Como meio de criopreservação, utilizamos um meio de crescimento completo (incluindo FBS) + 10% DMSO para uma viabilidade pós-descongelamento adequada, ou CM-1 (número de catálogo Cytion 800100), que inclui osmoprotectores optimizados e estabilizadores metabólicos para melhorar a recuperação e reduzir o stress induzido pela crio.

Condições de armazenamento

Para conservação a longo prazo, colocar os frascos em azoto líquido em fase de vapor a uma temperatura entre -150 e -196 °C. O armazenamento a -80 °C é aceitável apenas como um curto passo intermédio antes da transferência para azoto líquido.

Condições de envio

As linhas celulares criopreservadas são expedidas em gelo seco em embalagens validadas e isoladas com refrigerante suficiente para manter aproximadamente -78 °C durante o transporte. Aquando da receção, inspecionar imediatamente o recipiente e transferir sem demora os frascos para um local de armazenamento adequado.

DOADOR

Idade do dador	43 anos
Etnia	Caucasiano

ASPECTOS LEGAIS E DE SEGURANÇA

Precauções de segurança

Quando se planeia armazenar um criovial em nitrogénio líquido para descongelação futura, é obrigatório aderir a medidas de segurança rigorosas. Luvas e vestuário de proteção adequados são essenciais, e a utilização de uma máscara facial ou óculos de segurança é necessária durante a transferência de amostras congeladas para ou do tanque de nitrogénio líquido. Isto destina-se a mitigar o risco de ferimentos provocados por potenciais explosões de crioviais após a remoção, que podem resultar na projeção de fragmentos afiados.

Garantia

Na Cytion, nós garantimos a qualidade e a viabilidade de nossos produtos.
Garantimos que nossas células serão viáveis no início da cultura por 60 dias após o envio de nossas instalações.
Asseguramos que todos os materiais estão em conformidade com as especificações descritas no Certificado de Análise e/ou Folha de Produto
Para mais informações, consulte a nossa <a href=""/Who-we-are/Warranty/"" hreflang=""x-default"">Declaração de Garantia

É necessário um Acordo de Transferência de Material	Yes