OCUM-1

305612

ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ

Описание

OCUM-1 е клетъчна линия от човешки стомашен рак, получена от пациент с нискодиференциран аденокарцином на стомаха. Тази клетъчна линия се използва широко в изследванията в областта на рака за проучване на агресивния характер на стомашните ракови заболявания, особено при тези с ниска степен на диференциация. OCUM-1 служи като надежден in vitro модел за изследване на биологията на тумора, механизмите на метастазиране и терапевтичните реакции при аденокарцинома на стомаха, която остава една от водещите причини за смъртност, свързана с рак, в световен мащаб.
Клетките OCUM-1 притежават епителна морфология и се прикрепват при стандартни условия на култивиране. Те се характеризират с типични за слабодиференцирания рак на стомаха особености, включително висока пролиферативна способност, способност за инвазия в околните тъкани и молекулярни промени, които стимулират прогресията на тумора. Изследователите често използват OCUM-1 за изучаване на сигнални пътища като Wnt/β-катенин, PI3K/AKT и механизми, свързани с епителиално-мезенхималната трансформация (EMT), които често са нарушени при стомашния аденокарцином и допринасят за неговото метастатично поведение. Освен това тази клетъчна линия предоставя платформа за оценка на генетичните и епигенетичните промени, свързани с слабодиференцирани тумори.
В предклиничните изследвания OCUM-1 е особено ценна за скрининг на лекарства и разработване на целеви терапии, насочени към лечението на агресивни подтипове на рак на стомаха. Клетъчната линия често се използва за оценка на ефикасността на химиотерапевтични средства, нискомолекулни инхибитори и комбинирани терапии, както и за проучване на механизмите на химиорезистентност. Освен това OCUM-1 се използва в проучвания, фокусирани върху взаимодействията в туморната микросреда и молекулярните фактори, обуславящи перитонеалното разпространение – често срещано и трудно за преодоляване усложнение при напреднал рак на стомаха. Като цяло OCUM-1 остава ключов ресурс за напредъка в изследванията на рака на стомаха и откриването на нови терапевтични подходи.

Тъкан	Стомахът
Заболяване	аденокарцином
Място на метастазите	Плеврален излив

Синоними

- OCUM1
- Osaka City University Medical school-1

КЛАСИФИКАЦИЯ

Организъм	Човек
Секс	Женски
Свойства, свързани с растежа	Привърженик
Ниво на биологична безопасност	1

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Морфология	Подобни на лимфоцити, с групиране
Тип клетка	Лимфоцити
Време за удвояване	26–34 часа

Cytion GmbH
Nikola-Tesla-Str. 3
69124 Heidelberg
Tel: +49 (0)6221 405780
info@cytion.com
cytion.com

Registered office Heidelberg
VAT ID: DE283292917
Local court Mannheim - HRB 714394
CEO / Geschäftsführer: Jonathan Steubing

Banking information
Sparkasse Heidelberg
IBAN: DE35 6725 0020 0009 2076 86
BIC: SOLADES1HDB

ИДЕНТИФИКАТОРИ

Източник

OCUM-1 (каталожен номер на Cytion 305612)

Данъчен идентификационен номер в NCBI	9606
Целозавър	CVCL_3084

ПРОЯВА И ПРЕДРАЗПОЛОЖЕНОСТ

Мутационен профил

Мутация: MAP2K1, проста, p.Gln56Pro (c.167A>C), хемизиготна

ОБРАБОТКА И ОТГЛЕЖДАНЕ

Хранителна среда

DMEM, w: 4,5 g/L глюкоза, w: 4 mM L-глутамин, w: 3,7 g/L NaHCO3, w: 1,0 mM натриев пируват (номер на изделието на Cytion 820300a)

Атмосфера за инкубация	37°C, 5%CO2, овлажнена атмосфера.

Добавки

Допълнете средата с 10% FBS

Реагент за дисоциация	Accutase

Размразяване и култивиране

Confirm that the vial remains deeply frozen upon delivery, as cells are shipped on dry ice to maintain optimal temperatures during transit.
Upon receipt, either store the cryovial immediately at temperatures below -150°C to ensure the preservation of cellular integrity, or proceed to step 3 if immediate culturing is required.
For immediate culturing, swiftly thaw the vial by immersing it in a 37°C water bath with clean water and an antimicrobial agent, agitating gently for 40-60 seconds until a small ice clump remains.
Perform all subsequent steps under sterile conditions in a flow hood, disinfecting the cryovial with 70% ethanol before opening.
Carefully open the disinfected vial and transfer the cell suspension into a 15 ml centrifuge tube containing 8 ml of room-temperature culture medium, mixing gently.
Centrifuge the mixture at 300 x g for 3 minutes to separate the cells and carefully discard the supernatant containing residual freezing medium.
Gently resuspend the cell pellet in 10 ml of fresh culture medium. For adherent cells, divide the suspension between two T25 culture flasks; for suspension cultures, transfer all the medium into one T25 flask to promote effective cell interaction and growth.
Adhere to established subculture protocols for continued growth and maintenance of the cell line, ensuring reliable experimental outcomes.

КОНТРОЛ НА КАЧЕСТВОТО И КРИОКОНСЕРВАЦИЯ

Стерилност

Замърсяването с микоплазма се изключва както чрез PCR-базирани анализи, така и чрез луминесцентни методи за откриване на микоплазма.
За да се гарантира, че няма бактериално, гъбично или дрождево замърсяване, клетъчните култури се подлагат на ежедневни визуални проверки.

Среда за замразяване	Като среда за криоконсервация използваме пълна среда за растеж (включително FBS) + 10% DMSO за адекватна жизнеспособност след размразяване или CM-1 (каталожен номер 800100 на Cytion), която включва оптимизирани осмопротектори и метаболитни стабилизатори за подобряване на възстановяването и намаляване на криоиндуцирания стрес.

Условия за съхранение

За дълготрайно съхранение поставете флаконите в течен азот в парна фаза при температура около -150 до -196 °C. Съхранението при -80 °C е приемливо само като кратък междинен етап преди прехвърлянето в течен азот.

Cytion GmbH
Nikola-Tesla-Str. 3
69124 Heidelberg
Tel: +49 (0)6221 405780
info@cytion.com
cytion.com

Registered office Heidelberg
VAT ID: DE283292917
Local court Mannheim - HRB 714394
CEO / Geschäftsführer: Jonathan Steubing

Banking information
Sparkasse Heidelberg
IBAN: DE35 6725 0020 0009 2076 86
BIC: SOLADES1HDB

Условия за доставка

Криоконсервираните клетъчни линии се транспортират върху сух лед в утвърдени, изолирани опаковки с достатъчно хладилен агент, за да се поддържа приблизително -78 °C по време на транспортирането. При получаването незабавно прегледайте опаковката и незабавно прехвърлете флаконите за подходящо съхранение.

ДАРИТЕЛ

Възраст на донора	38 години
Етническа принадлежност	Японски

ПРАВНИ ВЪПРОСИ И БЕЗОПАСНОСТ

Мерки за безопасност

Когато планирате да съхранявате криопрепарат в течен азот за бъдещо размразяване, е задължително да спазвате строги мерки за безопасност. Подходящите защитни ръкавици и облекло са от съществено значение, а по време на прехвърлянето на замразени проби към или от резервоара с течен азот е необходимо да се използва маска за лице или предпазни очила. Това се прави, за да се намали рискът от нараняване от потенциални експлозии на криовиолите при изваждането им, които могат да доведат до изхвърляне на остри фрагменти.

Гаранция

Ние в Cytion заставаме зад качеството и жизнеспособността на нашите продукти.
Гарантираме, че нашите клетки ще бъдат жизнеспособни в началото на култивирането в продължение на 60 дни след изпращането им от нашите съоръжения.
Гарантираме, че всички материали отговарят на спецификациите, описани в сертификата за анализ и/или продуктовата листа
За пълни подробности, моля, направете справка с нашата <a href=""/Кои сме ние/Гаранция/"" hreflang=""x-default"">Гаранционна декларация

Необходимо е споразумение за прехвърляне на материали	Yes