SK-CO-1

305626

YLEISTÄ TIETOA

Kuvaus

SK-CO-1-solulinja on ihmisen paksusuolen ja peräsuolen adenokarsinooman malli, joka on peräisin ascitesnesteen etäpesäkkeestä. Sitä on käytetty laajasti syöpätutkimuksessa paksusuolen ja peräsuolen syövän (CRC) etenemisen taustalla olevien molekyylimekanismien sekä hoitotoimenpiteisiin reagoinnin tutkimiseen. SK-CO-1-solut ovat adheesiivisia viljelmässä ja niillä on epiteelisyöpäsolujen morfologisia ominaisuuksia. Tämä solulinja on sisällytetty laajamittaisiin genomitutkimuksiin, kuten Cancer Cell Line Encyclopedia (CCLE) -tietokantaan, joka tarjoaa kattavan geneettisen, transkriptomisen ja farmakologisen profiloinnin.
SK-CO-1:tä koskevissa geneettisissä tutkimuksissa on tunnistettu mutaatioita ja kopioiden lukumäärän vaihteluita geeneissä, jotka ovat kriittisiä kolorektaalisyövän patogeneesille, mukaan lukien muutokset TP53-, KRAS- ja APC-geeneissä. Nämä ominaisuudet tekevät siitä arvokkaan mallin sellaisten reittien tutkimiseen kuin WNT/β-kateniinisignalointi, jolla on merkittävä rooli kolorektaalisyövän kehittymisessä. Lisäksi farmakologinen seulonta on paljastanut solulinjan erilaiset herkkyydet kemoterapeuttisille aineille, mikä auttaa tutkijoita tunnistamaan potentiaalisia biomarkkereita lääkevasteelle.

Kudos	Paksusuoli
Sairaus	Paksusuolen adenokarsinooma
Metastaasikohde	askites

Sovellukset

3D-soluviljely

Synonyymit

- SKCO-1
- SKCO 1
- SKCO1
- SKCol1
- SK-Col-1
- SK Col 1

LUOKITTELU

Organismi	Ihminen
Sukupuoli	Mies
Kasvuominaisuudet	Kiinnittynyt
Bioturvallisuustaso	1

OMINAISUUDET

Morfologia	Epiteeli

Karyotyyppi

(P7) hypertriploidi–hypotetraploidi, jossa esiintyy poikkeavuuksia, kuten dikentrikoita, minikromosomeja, rengaskromosomeja, toissijaisia kavennuksia sekä kahdeksan suurta submetasentristä markkeria

Kaksinkertaistumisaika	46 tuntia

Cytion GmbH
Nikola-Tesla-Str. 3
69124 Heidelberg
Tel: +49 (0)6221 405780
info@cytion.com
cytion.com

Registered office Heidelberg
VAT ID: DE283292917
Local court Mannheim - HRB 714394
CEO / Geschäftsführer: Jonathan Steubing

Banking information
Sparkasse Heidelberg
IBAN: DE35 6725 0020 0009 2076 86
BIC: SOLADES1HDB

TUNNISTEET

Lähdeviite

SK-CO-1 (Cytionin tuotenumero 305626)

NCBI-verotunnus	9606
Cellosaurus	CVCL_0626

ILMENTYMINEN JA ALTTIUS

Antigeenin ilmentyminen

Veriryhmä O; Rh-positiivinen; HLA A1, A3, B7, B13

Isoentsyymit

AK-1, 1–2
ES-D, 1
G6PD, B
GLO-I, 1–2
Me-2, 1
PGM1, 1
PGM3, 1–2

Onkogeenit

Myc+, ras+, myb+, fos+, sis+, p53+, abl-, ros-, src-

Mutaatioprofiili

Mutaatio: APC, yksinkertainen, p.Phe1089fs*37 (c.3266delT), heterotsygootti; Mutaatio: APC, yksinkertainen, p.Pro1443fs*30 (c.4328delC), heterotsygootti; Mutaatio: GNAS, yksinkertainen, p.Arg201Cys (c.601C>T), heterotsygootti; Mutaatio: KRAS, yksinkertainen, p.Gly12Val (c.35G>T), heterotsygootti

KÄSITTELY JA VILJELY

Viljelyalusta

EMEM (MEM Eagle), w: 2 mM L-Glutamiini, w: 2,2 g/L NaHCO3, w: EBSS (Cytionin artikkelinumero 820100a)

Inkubaatioilma	37 °C, 5 %CO2, kostutettu ilmakehä.

Ravintolisät

Täydennetään elatusainetta 10 % FBS:llä ja 1 % NEAA:lla

Dissosiaatioreagenssi	Accutase

Soluviljely

Tyhjennä elatusaine ja huuhtele 0,25-prosenttisella trypsiini-EDTA-liuoksella. Tyhjennä liuos ja lisää vielä 1–2 ml trypsiini-EDTA-liuosta. Anna pullon seistä huoneenlämmössä (tai 37 °C:ssa), kunnes solut irtoavat. Lisää uutta elatusainetta, imee sisältö pois ja siirrä solut uusiin viljelypulloihin.

Nesteen uusiminen	2-3 kertaa viikossa

Sulatus ja viljely

Confirm that the vial remains deeply frozen upon delivery, as cells are shipped on dry ice to maintain optimal temperatures during transit.
Upon receipt, either store the cryovial immediately at temperatures below -150°C to ensure the preservation of cellular integrity, or proceed to step 3 if immediate culturing is required.
For immediate culturing, swiftly thaw the vial by immersing it in a 37°C water bath with clean water and an antimicrobial agent, agitating gently for 40-60 seconds until a small ice clump remains.
Perform all subsequent steps under sterile conditions in a flow hood, disinfecting the cryovial with 70% ethanol before opening.
Carefully open the disinfected vial and transfer the cell suspension into a 15 ml centrifuge tube containing 8 ml of room-temperature culture medium, mixing gently.
Centrifuge the mixture at 300 x g for 3 minutes to separate the cells and carefully discard the supernatant containing residual freezing medium.
Gently resuspend the cell pellet in 10 ml of fresh culture medium. For adherent cells, divide the suspension between two T25 culture flasks; for suspension cultures, transfer all the medium into one T25 flask to promote effective cell interaction and growth.
Adhere to established subculture protocols for continued growth and maintenance of the cell line, ensuring reliable experimental outcomes.

LAADUNVALVONTA JA KRYOSÄILYTYS

Hedelmättömyys

Mykoplasmakontaminaatio suljetaan pois sekä PCR-pohjaisilla määrityksillä että luminesenssiin perustuvilla mykoplasman osoitusmenetelmillä.
Bakteeri-, sieni- tai hiivakontaminaation välttämiseksi soluviljelmät tarkastetaan päivittäin silmämääräisesti.

Jäädytysaine	Kryosäilytysmediana käytämme täydellistä kasvualustaa (mukaan lukien FBS) + 10 % DMSO:ta riittävän sulatuksen jälkeisen elinkelpoisuuden varmistamiseksi tai CM-1:tä (Cytionin luettelonumero 800100), joka sisältää optimoituja osmoprotectantteja ja metabolisia stabilisaattoreita, jotka parantavat elpymistä ja vähentävät kryosäilytyksen aiheuttamaa stressiä.

Säilytysolosuhteet

Pitkäaikaissäilytystä varten injektiopullot asetetaan höyryfaasissa olevaan nestemäiseen typpeen noin -150 - -196 °C:een. Säilytys -80 °C:ssa on hyväksyttävää vain lyhyenä välivaiheena ennen siirtoa nestemäiseen typpeen.

Toimitusehdot

Kryosäilytetyt solulinjat kuljetetaan kuivajäässä validoidussa, eristetyssä pakkauksessa, jossa on riittävästi kylmäainetta, jotta lämpötila pysyy noin -78 °C:ssa koko kuljetuksen ajan. Pakkaus on tarkastettava välittömästi sen vastaanottamisen jälkeen ja injektiopullot on siirrettävä viipymättä asianmukaiseen varastoon.

LAHJOITTAJA

Luovuttajan ikä	65 vuotta
Etnisyys	Kaukasialainen

OIKEUDELLISET JA TURVALLISUUSASIAT

Turvallisuusohjeet

Kun suunnitellaan kryoputken säilyttämistä nestemäisessä typessä sulatusta varten, on noudatettava tiukkoja turvatoimenpiteitä. Asianmukaiset suojakäsineet ja -vaatteet ovat välttämättömiä, ja kasvonaamarin tai suojalasien käyttö on välttämätöntä siirrettäessä jäädytettyjä näytteitä nestetyppisäiliöön tai siitä pois. Tällä pyritään pienentämään loukkaantumisriskiä, joka aiheutuu kryoputkien mahdollisista räjähdyksistä, jotka voivat aiheuttaa terävien sirpaleiden sinkoutumisen.

Takuu

Me Cytionilla seisomme tuotteidemme laadun ja elinkelpoisuuden takana.
Takaamme, että solumme ovat elinkelpoisia viljelyn alkaessa 60 päivän ajan sen jälkeen, kun ne on lähetetty laitoksestamme.
Vakuutamme, että kaikki materiaalit ovat analyysitodistuksessa ja/tai tuoteselosteessa kuvattujen eritelmien mukaisia
Lisätietoja on <a href=""/Who-we-are/Warranty/"" hreflang=""""x-default"">Takuulausumassa

Aineiden siirtoa koskeva sopimus vaaditaan	Yes

Cytion GmbH
Nikola-Tesla-Str. 3
69124 Heidelberg
Tel: +49 (0)6221 405780
info@cytion.com
cytion.com

Registered office Heidelberg
VAT ID: DE283292917
Local court Mannheim - HRB 714394
CEO / Geschäftsführer: Jonathan Steubing

Banking information
Sparkasse Heidelberg
IBAN: DE35 6725 0020 0009 2076 86
BIC: SOLADES1HDB