SK-CO-1

305626

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Description

La lignée cellulaire SK-CO-1 est un modèle d'adénocarcinome colorectal humain dérivé d'un site métastatique présent dans le liquide ascitique. Elle est largement utilisée dans la recherche sur le cancer pour étudier les mécanismes moléculaires sous-jacents à la progression du cancer colorectal (CCR) et à la réponse aux interventions thérapeutiques. Les cellules SK-CO-1 sont adhérentes en culture et présentent des caractéristiques morphologiques compatibles avec celles des cellules tumorales épithéliales. Cette lignée cellulaire a été incluse dans des études génomiques à grande échelle, telles que la Cancer Cell Line Encyclopedia (CCLE), qui fournit un profilage génétique, transcriptomique et pharmacologique complet.
Des études génétiques sur SK-CO-1 ont identifié des mutations et des variations du nombre de copies dans des gènes essentiels à la pathogenèse du CCR, notamment des altérations des gènes TP53, KRAS et APC. Ces caractéristiques en font un modèle précieux pour l'exploration de voies telles que la signalisation WNT/β-caténine, qui joue un rôle significatif dans le développement des tumeurs colorectales. De plus, le criblage pharmacologique a révélé les sensibilités différentielles de la lignée cellulaire aux agents chimiothérapeutiques, aidant ainsi les chercheurs à identifier des biomarqueurs potentiels de la réponse aux médicaments.

Tissu	Gros intestin, côlon
Maladie	Adénocarcinome colorectal
Site métastatique	ascite

Applications

culture cellulaire en 3D

Synonymes

- SKCO-1
- SKCO 1
- SKCO1
- SKCol1
- SK-Col-1
- SK Col 1

CLASSIFICATION

Organisme	Humain
Sexe	Homme
Propriétés de croissance	Adepte
Niveau de biosécurité	1

CARACTÉRISTIQUES

Morphologie	Épithéliale

Caryotype

(P7) hypertriploïde à hypotétraploïde présentant des anomalies telles que des dicentriques, des chromosomes minuscules, des anneaux, des constrictions secondaires et 8 grands marqueurs submétacentriques

Temps de doublement	46 heures

Cytion GmbH
Nikola-Tesla-Str. 3
69124 Heidelberg
Tel: +49 (0)6221 405780
info@cytion.com
cytion.com

Registered office Heidelberg
VAT ID: DE283292917
Local court Mannheim - HRB 714394
CEO / Geschäftsführer: Jonathan Steubing

Banking information
Sparkasse Heidelberg
IBAN: DE35 6725 0020 0009 2076 86
BIC: SOLADES1HDB

IDENTIFIANTS

Référence

SK-CO-1 (référence Cytion 305626)

Numéro d'identification fiscale NCBI	9606
Cellosaurus	CVCL_0626

EXPRESSION ET SENSIBILITÉ

Expression des antigènes

Groupe sanguin O ; Rh+ ; HLA A1, A3, B7, B13

Isoenzymes

AK-1, 1-2
ES-D, 1
G6PD, B
GLO-I, 1-2
Me-2, 1
PGM1, 1
PGM3, 1-2

Oncogènes

Myc+, ras+, myb+, fos+, sis+, p53+, abl-, ros-, src-

Profil mutationnel

Mutation : APC, simple, p.Phe1089fs*37 (c.3266delT), hétérozygote ; Mutation : APC, simple, p.Pro1443fs*30 (c.4328delC), hétérozygote ; Mutation : GNAS, simple, p.Arg201Cys (c.601C>T), hétérozygote ; Mutation : KRAS, simple, p.Gly12Val (c.35G>T), hétérozygote

MANIPULATION ET CULTURE

Milieu de culture

EMEM (MEM Eagle), w : 2 mM L-Glutamine, w : 2.2 g/L NaHCO3, w : EBSS (numéro d'article Cytion 820100a)

Atmosphère d'incubation	37°C, 5%CO2, atmosphère humidifiée.

Compléments alimentaires

Compléter le milieu avec 10 % de FBS et 1 % de NEAA

Réactif de dissociation	Accutase

Repiquage

Retirer le milieu de culture et rincer avec une solution à 0,25 % de trypsine et 0,03 % d'EDTA. Retirer la solution et ajouter 1 à 2 ml supplémentaires de solution trypsine-EDTA. Laisser reposer le flacon à température ambiante (ou à 37 °C) jusqu'à ce que les cellules se détachent. Ajouter du milieu de culture frais, aspirer le contenu et le transvaser dans de nouveaux flacons de culture.

Renouvellement des fluides	2 à 3 fois par semaine

Décongélation et mise en culture

Confirm that the vial remains deeply frozen upon delivery, as cells are shipped on dry ice to maintain optimal temperatures during transit.
Upon receipt, either store the cryovial immediately at temperatures below -150°C to ensure the preservation of cellular integrity, or proceed to step 3 if immediate culturing is required.
For immediate culturing, swiftly thaw the vial by immersing it in a 37°C water bath with clean water and an antimicrobial agent, agitating gently for 40-60 seconds until a small ice clump remains.
Perform all subsequent steps under sterile conditions in a flow hood, disinfecting the cryovial with 70% ethanol before opening.
Carefully open the disinfected vial and transfer the cell suspension into a 15 ml centrifuge tube containing 8 ml of room-temperature culture medium, mixing gently.
Centrifuge the mixture at 300 x g for 3 minutes to separate the cells and carefully discard the supernatant containing residual freezing medium.
Gently resuspend the cell pellet in 10 ml of fresh culture medium. For adherent cells, divide the suspension between two T25 culture flasks; for suspension cultures, transfer all the medium into one T25 flask to promote effective cell interaction and growth.
Adhere to established subculture protocols for continued growth and maintenance of the cell line, ensuring reliable experimental outcomes.

CONTRÔLE QUALITÉ ET CRYOCONSERVATION

Stérilité

La contamination par les mycoplasmes est exclue à l'aide de tests basés sur la PCR et de méthodes de détection des mycoplasmes basées sur la luminescence.
Pour s'assurer de l'absence de contamination bactérienne, fongique ou levurienne, les cultures cellulaires font l'objet d'inspections visuelles quotidiennes.

Milieu de congélation	Comme milieu de cryoconservation, nous utilisons un milieu de croissance complet (comprenant du FBS) + 10 % de DMSO pour une viabilité adéquate après décongélation, ou CM-1 (numéro de catalogue 800100 de Cytion), qui comprend des osmoprotectants et des stabilisateurs métaboliques optimisés pour améliorer la récupération et réduire le stress induit par la cryogénisation.

Conditions de stockage

Pour une conservation à long terme, placer les flacons dans de l'azote liquide en phase vapeur à une température comprise entre -150 et -196 °C environ. Le stockage à -80 °C n'est acceptable qu'en tant qu'étape intermédiaire de courte durée avant le transfert dans l'azote liquide.

Conditions de livraison

Les lignées cellulaires cryoconservées sont expédiées sur glace sèche dans des emballages isolés et validés, avec suffisamment de réfrigérant pour maintenir une température d'environ -78 °C tout au long du transport. À la réception, inspecter immédiatement le conteneur et transférer sans délai les flacons dans un lieu de stockage approprié.

DONATEUR

Âge du donneur	65 ans
Origine ethnique	Caucasien

ASPECTS JURIDIQUES ET SÉCURITÉ

Consignes de sécurité

Lorsque l'on envisage de stocker un cryovial dans l'azote liquide en vue d'une décongélation ultérieure, il est obligatoire de respecter des mesures de sécurité rigoureuses. Des gants et des vêtements de protection appropriés sont indispensables, et l'utilisation d'un masque facial ou de lunettes de sécurité est requise pendant le transfert des échantillons congelés vers ou depuis le réservoir d'azote liquide. Ceci afin de réduire le risque de blessures dues à l'explosion potentielle des cryoviaux lors de leur retrait, qui peut entraîner la projection de fragments tranchants.

Garantie

Chez Cytion, nous nous portons garants de la qualité et de la viabilité de nos produits.
Nous garantissons que nos cellules seront viables au début de la culture pendant 60 jours après l'expédition de nos installations.
Nous assurons que tous les matériaux sont conformes aux spécifications décrites dans le certificat d'analyse et/ou la fiche produit
Pour plus de détails, veuillez consulter notre <a href=""/Who-we-are/Warranty/"" hreflang=""x-default""> Déclaration de garantie

Un accord de transfert de matériel est requis	Yes