SKM-1

305627

YLEISTÄ TIETOA

Kuvaus

SKM-1-solulinja on ihmisen leukemia-malli, joka on perustettu myelodysplastisesta oireyhtymästä (MDS) kehittyneen akuutin monoblastisen leukemian potilaan ääreisverestä. Nämä solut osoittavat epäkypsiä morfologisia piirteitä, kuten korkean tumasuhteen ja hienoja atsurofiilisiä rakeita, mikä tekee niistä erinomaisen mallin leukemian molekyyli- ja solumekanismien tutkimiseen, erityisesti MDS:n siirtymiseen akuutiksi myelooiseksi leukemiaksi (AML).
SKM-1:n geneettinen analyysi on paljastanut tärkeitä kromosomipoikkeavuuksia, kuten del(9)(q13;q22) ja der(17)t(17:?)(p13:?); jälkimmäinen muutos koskee p53-geeniä, joka on yli-ilmentynyt ja sisältää mutaatioita tässä solulinjassa. Nämä havainnot korostavat p53:n roolia klonaalisessa evoluutiossa ja myelooisten pahanlaatuisten kasvainten etenemisessä. SKM-1-soluille on ominaista myös myelomonosyyttisten merkkiaineiden, kuten CD4, CD13 ja CD33, ilmentyminen sekä butyraattiesterasiaktiivisuuden positiivisuus, mikä on yhdenmukaista niiden monoblastisen sukupolven kanssa.
Tätä solulinjaa käytetään laajasti leukemogeneesin, lääkeresistenssin ja leukemian taustalla olevien molekyylireittien tutkimuksessa. SKM-1 tarjoaa esimerkiksi alustan p53-geenin toimintahäiriön ja muiden geneettisten vaurioiden vaikutusten tutkimiseen solujen proliferaatiossa ja terapeuttisessa vasteessa. Se toimii myös mallina uusien terapeuttisten strategioiden tutkimisessa myelodysplastisissa oireyhtymissä ja sekundaarisessa AML:ssä.

Kudos	Perifeerinen veri
Sairaus	akuutti myelooinen leukemia

Synonyymit

- SKM1

LUOKITTELU

Organismi	Ihminen
Sukupuoli	Mies
Kasvuominaisuudet	Jousitus
Bioturvallisuustaso	1

OMINAISUUDET

Morfologia	Pyöreät kennot
Kaksinkertaistumisaika	48 tuntia

TUNNISTEET

Lähdeviite

SKM-1 (Cytion-tuotenumero 305627)

NCBI-verotunnus	9606
Cellosaurus	CVCL_0098

Cytion GmbH
Nikola-Tesla-Str. 3
69124 Heidelberg
Tel: +49 (0)6221 405780
info@cytion.com
cytion.com

Registered office Heidelberg
VAT ID: DE283292917
Local court Mannheim - HRB 714394
CEO / Geschäftsführer: Jonathan Steubing

Banking information
Sparkasse Heidelberg
IBAN: DE35 6725 0020 0009 2076 86
BIC: SOLADES1HDB

ILMENTYMINEN JA ALTTIUS

Antigeenin ilmentyminen

CD3-, CD4(+), CD13+, CD14-, CD15+, CD19-, CD33+, HLA-DR+;

Mutaatioprofiili

Mutaatio: ASXL1, yksinkertainen, p.Tyr591Ter (c.1773C>A), homotsygoottinen; Mutaatio: BCORL1, yksinkertainen, c.4619-1G>A, homotsygoottinen, splice-akseptori-mutaatio; Mutaatio: EZH2, yksinkertainen, p.Tyr646Cys (c.1937A>G), heterotsygoottinen; Mutaatio: KRAS, yksinkertainen, p.Lys117Asn (c.351A>C), homotsygoottinen; Mutaatio: TP53, yksinkertainen, p.Arg248Gln (c.743G>A), homotsygoottinen

Virukset

EBV -, HBV -, HCV -, HIV-1 -, HIV-2 -, HTLV-1/2 -, MLV -, SMRV -, SMRV -

KÄSITTELY JA VILJELY

Viljelyalusta

RPMI 1640, w: 2,0 mM stabiilia glutamiinia, w: 2,0 g/L $NaHCO_3$ (Cytionin artikkelinumero 820700a)

Inkubaatioilma	37 °C, 5 %CO_2, kostutettu ilmakehä.

Ravintolisät

Täydennetään elatusainetta 15 %:lla FBS:llä

Dissosiaatioreagenssi	Ei mitään
Kylvötiheys	0,3–1 x 10^6 solua/ml
Nesteen uusiminen	2-3 kertaa viikossa

Sulatus ja viljely

Confirm that the vial remains deeply frozen upon delivery, as cells are shipped on dry ice to maintain optimal temperatures during transit.
Upon receipt, either store the cryovial immediately at temperatures below -150°C to ensure the preservation of cellular integrity, or proceed to step 3 if immediate culturing is required.
For immediate culturing, swiftly thaw the vial by immersing it in a 37°C water bath with clean water and an antimicrobial agent, agitating gently for 40-60 seconds until a small ice clump remains.
Perform all subsequent steps under sterile conditions in a flow hood, disinfecting the cryovial with 70% ethanol before opening.
Carefully open the disinfected vial and transfer the cell suspension into a 15 ml centrifuge tube containing 8 ml of room-temperature culture medium, mixing gently.
Centrifuge the mixture at 300 x g for 3 minutes to separate the cells and carefully discard the supernatant containing residual freezing medium.
Gently resuspend the cell pellet in 10 ml of fresh culture medium. For adherent cells, divide the suspension between two T25 culture flasks; for suspension cultures, transfer all the medium into one T25 flask to promote effective cell interaction and growth.
Adhere to established subculture protocols for continued growth and maintenance of the cell line, ensuring reliable experimental outcomes.

LAADUNVALVONTA JA KRYOSÄILYTYS

Hedelmättömyys

Mykoplasmakontaminaatio suljetaan pois sekä PCR-pohjaisilla määrityksillä että luminesenssiin perustuvilla mykoplasman osoitusmenetelmillä.
Bakteeri-, sieni- tai hiivakontaminaation välttämiseksi soluviljelmät tarkastetaan päivittäin silmämääräisesti.

Jäädytysaine	Kryosäilytysmediana käytämme täydellistä kasvualustaa (mukaan lukien FBS) + 10 % DMSO:ta riittävän sulatuksen jälkeisen elinkelpoisuuden varmistamiseksi tai CM-1:tä (Cytionin luettelonumero 800100), joka sisältää optimoituja osmoprotectantteja ja metabolisia stabilisaattoreita, jotka parantavat elpymistä ja vähentävät kryosäilytyksen aiheuttamaa stressiä.

Säilytysolosuhteet

Pitkäaikaissäilytystä varten injektiopullot asetetaan höyryfaasissa olevaan nestemäiseen typpeen noin -150 - -196 °C:een. Säilytys -80 °C:ssa on hyväksyttävää vain lyhyenä välivaiheena ennen siirtoa nestemäiseen typpeen.

Cytion GmbH
Nikola-Tesla-Str. 3
69124 Heidelberg
Tel: +49 (0)6221 405780
info@cytion.com
cytion.com

Registered office Heidelberg
VAT ID: DE283292917
Local court Mannheim - HRB 714394
CEO / Geschäftsführer: Jonathan Steubing

Banking information
Sparkasse Heidelberg
IBAN: DE35 6725 0020 0009 2076 86
BIC: SOLADES1HDB

Toimitusehdot

Kryosäilytetyt solulinjat kuljetetaan kuivajäässä validoidussa, eristetyssä pakkauksessa, jossa on riittävästi kylmäainetta, jotta lämpötila pysyy noin -78 °C:ssa koko kuljetuksen ajan. Pakkaus on tarkastettava välittömästi sen vastaanottamisen jälkeen ja injektiopullot on siirrettävä viipymättä asianmukaiseen varastoon.

LAHJOITTAJA

Luovuttajan ikä	76 vuotta
Etnisyys	Japanilainen

OIKEUDELLISET JA TURVALLISUUSASIAT

Turvallisuusohjeet

Kun suunnitellaan kryoputken säilyttämistä nestemäisessä typessä sulatusta varten, on noudatettava tiukkoja turvatoimenpiteitä. Asianmukaiset suojakäsineet ja -vaatteet ovat välttämättömiä, ja kasvonaamarin tai suojalasien käyttö on välttämätöntä siirrettäessä jäädytettyjä näytteitä nestetyppisäiliöön tai siitä pois. Tällä pyritään pienentämään loukkaantumisriskiä, joka aiheutuu kryoputkien mahdollisista räjähdyksistä, jotka voivat aiheuttaa terävien sirpaleiden sinkoutumisen.

Takuu

Me Cytionilla seisomme tuotteidemme laadun ja elinkelpoisuuden takana.
Takaamme, että solumme ovat elinkelpoisia viljelyn alkaessa 60 päivän ajan sen jälkeen, kun ne on lähetetty laitoksestamme.
Vakuutamme, että kaikki materiaalit ovat analyysitodistuksessa ja/tai tuoteselosteessa kuvattujen eritelmien mukaisia
Lisätietoja on <a href=""/Who-we-are/Warranty/"" hreflang=""""x-default"""">Takuulausumassa

Aineiden siirtoa koskeva sopimus vaaditaan	Yes

Cytion GmbH
Nikola-Tesla-Str. 3
69124 Heidelberg
Tel: +49 (0)6221 405780
info@cytion.com
cytion.com

Registered office Heidelberg
VAT ID: DE283292917
Local court Mannheim - HRB 714394
CEO / Geschäftsführer: Jonathan Steubing

Banking information
Sparkasse Heidelberg
IBAN: DE35 6725 0020 0009 2076 86
BIC: SOLADES1HDB