SKM-1

305627

VISPĀRĪGA INFORMĀCIJA

Apraksts

SKM-1 šūnu līnija ir cilvēka leikēmijas modelis, kas izveidots no pacienta perifērās asinis, kurš slimo ar akūtu monoblastisko leikēmiju, kas attīstījusies no mielodisplastiskā sindroma (MDS). Šīs šūnas uzrāda nenobriedušas morfoloģiskas pazīmes, piemēram, augstu kodola un citoplazmas attiecību un smalkas azurofīlas granulas, kas padara tās par izcilu modeli leikēmijas molekulāro un šūnu mehānismu pētīšanai, jo īpaši pārejai no MDS uz akūtu mieloīdo leikēmiju (AML).
SKM-1 ģenētiskā analīze ir atklājusi svarīgas hromosomu anomālijas, tostarp del(9)(q13;q22) un der(17)t(17:?)(p13:?); pēdējā izmaiņa ietekmē p53 gēnu, kas šajā šūnu līnijā ir pārmērīgi ekspresēts un satur mutācijas. Šie atklājumi uzsver p53 nozīmi klonālās evolūcijas un mieloīdo malignitāšu progresēšanā. SKM-1 šūnas raksturo arī mielomonocītu marķieru ekspresija, tostarp CD4, CD13 un CD33, kā arī to pozitīvā reakcija uz butirāta esterāzes aktivitāti, kas atbilst to monoblastiskajai ciltsrakstībai.
Šī šūnu līnija tiek plaši izmantota pētījumos par leikēmijas attīstību, zāļu rezistenci un molekulārajiem procesiem, kas ir leikēmijas pamatā. Piemēram, SKM-1 nodrošina platformu, lai pētītu p53 disfunkcijas un citu ģenētisko bojājumu ietekmi uz šūnu proliferāciju un terapeitisko reakciju. Tā kalpo arī kā modelis, lai pētītu jaunas terapeitiskas stratēģijas mielodisplastiskajiem sindromiem un sekundārajai AML.

Audums	Perifērās asinis
Slimība	akūta mieloīdā leikēmija

Sinonīmi

- SKM1

KLASIFIKĀCIJA

Organisms	Cilvēks
Sekss	Vīrietis
Augšanas īpašības	Atsperes
Bioloģiskās drošības līmenis	1

RAKSTURLIELUMI

Morfoloģija	Apaļas šūnas
Laiks, kas nepieciešams, lai skaits dubultojās	48 stundas

IDENTIFIKATORI

Atsauce

SKM-1 (Cytion kataloga numurs 305627)

NCBI nodokļu identifikācijas numurs	9606
Cellosaurus	CVCL_0098

PAZĪMES UN UZŅĒMĪBA

Antigēna ekspresija

CD3 -, CD4 (+), CD13 +, CD14 -, CD15 +, CD19 -, CD33 +, HLA-DR +;

Cytion GmbH
Nikola-Tesla-Str. 3
69124 Heidelberg
Tel: +49 (0)6221 405780
info@cytion.com
cytion.com

Registered office Heidelberg
VAT ID: DE283292917
Local court Mannheim - HRB 714394
CEO / Geschäftsführer: Jonathan Steubing

Banking information
Sparkasse Heidelberg
IBAN: DE35 6725 0020 0009 2076 86
BIC: SOLADES1HDB

Mutāciju profils

Mutācija: ASXL1, vienkārša, p.Tyr591Ter (c.1773C>A), homozigota; Mutācija: BCORL1, vienkārša, c.4619-1G>A, homozigota, splaisa akceptora mutācija; Mutācija: EZH2, vienkārša, p.Tyr646Cys (c.1937A>G), heterozigota; Mutācija: KRAS, vienkārša, p.Lys117Asn (c.351A>C), homozigota; Mutācija: TP53, vienkārša, p.Arg248Gln (c.743G>A), homozigota

Vīrusi

EBV -, HBV -, HCV -, HIV-1 -, HIV-2 -, HTLV-1/2 -, MLV -, SMRV -

APSTRĀDE UN AUDZĒŠANA

Barotne

RPMI 1640, w: 2,0 mM stabils glutamīns, w: 2,0 g/L NaHCO3 (Cytion izstrādājuma numurs 820700a)

Inkubācijas vide	37°C, 5%CO2, mitrināta atmosfēra.

Papildinājumi

Papildināt barotni ar 15% FBS

Disociācijas reaģents	Neviens
Sēšanas blīvums	0,3 līdz 1 x 10^6 šūnas/ml
Šķidruma atjaunošana	2 līdz 3 reizes nedēļā

Atkausēšana un kultivēšana

Confirm that the vial remains deeply frozen upon delivery, as cells are shipped on dry ice to maintain optimal temperatures during transit.
Upon receipt, either store the cryovial immediately at temperatures below -150°C to ensure the preservation of cellular integrity, or proceed to step 3 if immediate culturing is required.
For immediate culturing, swiftly thaw the vial by immersing it in a 37°C water bath with clean water and an antimicrobial agent, agitating gently for 40-60 seconds until a small ice clump remains.
Perform all subsequent steps under sterile conditions in a flow hood, disinfecting the cryovial with 70% ethanol before opening.
Carefully open the disinfected vial and transfer the cell suspension into a 15 ml centrifuge tube containing 8 ml of room-temperature culture medium, mixing gently.
Centrifuge the mixture at 300 x g for 3 minutes to separate the cells and carefully discard the supernatant containing residual freezing medium.
Gently resuspend the cell pellet in 10 ml of fresh culture medium. For adherent cells, divide the suspension between two T25 culture flasks; for suspension cultures, transfer all the medium into one T25 flask to promote effective cell interaction and growth.
Adhere to established subculture protocols for continued growth and maintenance of the cell line, ensuring reliable experimental outcomes.

KVALITĀTES KONTROLE UN KRIOKONSERVĀCIJA

Sterilitāte

Mikoplazmas piesārņojums tiek izslēgts, izmantojot gan uz PCR balstītus testus, gan uz luminiscenci balstītas mikoplazmas noteikšanas metodes.
Lai pārliecinātos, ka nav baktēriju, sēnīšu vai rauga piesārņojuma, šūnu kultūras katru dienu vizuāli pārbauda.

Saldēšanas barotne	Kā kriokonservēšanas barotni mēs izmantojam pilnvērtīgu augšanas barotni (ieskaitot FBS) + 10 % DMSO, lai nodrošinātu pietiekamu dzīvotspēju pēc atkausēšanas, vai CM-1 (Cytion kataloga numurs 800100), kas ietver optimizētus osmoprotektorus un metaboliskos stabilizatorus, lai uzlabotu atveseļošanos un samazinātu krioinducēto stresu.

Uzglabāšanas nosacījumi

Ilgstošai uzglabāšanai flakonus ievietojiet šķidrā slāpeklī ar tvaika fāzi aptuveni -150 līdz -196 °C temperatūrā. Uzglabāšana -80 °C temperatūrā ir pieļaujama tikai kā īss starpposms pirms pārvietošanas uz šķidro slāpekli.

Piegādes nosacījumi

Kriokonservētas šūnu līnijas tiek sūtītas uz sausā ledus apstiprinātā, izolētā iepakojumā ar pietiekamu dzesēšanas šķidruma daudzumu, lai visā transportēšanas laikā uzturētu aptuveni -78 °C temperatūru. Pēc saņemšanas nekavējoties pārbaudiet iepakojumu un nekavējoties pārvietojiet flakonus uz atbilstošu uzglabāšanas vietu.

ZIEDOTĀJS

Donora vecums	76 gadi
Etniskā piederība	Japāņu

JURIDISKIE JAUTĀJUMI UN DROŠĪBA

Drošības pasākumi

Plānojot uzglabāt kriokviālu šķidrā slāpeklī turpmākai atkausēšanai, obligāti jāievēro stingri drošības pasākumi. Ir nepieciešami piemēroti aizsargcimdi un apģērbs, un, pārvietojot sasaldētos paraugus uz šķidrā slāpekļa tvertni vai no tās, ir jālieto sejas maska vai aizsargbrilles. Tas jādara, lai mazinātu traumu risku, ko var radīt iespējamas kriokrioviālu eksplozijas, kas var izraisīt asu fragmentu izmešanu.

Garantija

Uzņēmumā Cytion mēs atbalstām savu produktu kvalitāti un dzīvotspēju.
Mēs garantējam, ka mūsu šūnas būs dzīvotspējīgas kultivēšanas sākumā 60 dienas pēc nosūtīšanas no mūsu ražotnēm.
Mēs nodrošinām, ka visi materiāli atbilst analīzes sertifikātā un/vai produkta lapā aprakstītajām specifikācijām
Lai iegūtu sīkāku informāciju, lūdzu, skatiet mūsu <a href=""/"/Kas mēs esam/garantija/"" hreflang=""x-default"">Garantijas paziņojumu

Nepieciešams materiālu nodošanas līgums	Yes