SKM-1

305627

INFORMACJE OGÓLNE

Opis

Linia komórkowa SKM-1 jest modelem ludzkiej białaczki utworzonym z krwi obwodowej pacjenta z ostrą białaczką monoblastyczną, która rozwinęła się z zespołu mielodysplastycznego (MDS). Komórki te wykazują niedojrzałe cechy morfologiczne, takie jak wysoki stosunek jądra do cytoplazmy i drobne granulki azurofilowe, co czyni je doskonałym modelem do badania molekularnych i komórkowych mechanizmów białaczki, w szczególności przejścia od MDS do ostrej białaczki szpikowej (AML).
Analiza genetyczna SKM-1 ujawniła istotne nieprawidłowości chromosomowe, w tym del(9)(q13;q22) i der(17)t(17:?)(p13:?); ta ostatnia zmiana dotyczy genu p53, który jest nadekspresjonowany i zawiera mutacje w tej linii komórkowej. Odkrycia te podkreślają rolę p53 w ewolucji klonalnej i progresji nowotworów szpikowych. Komórki SKM-1 charakteryzują się również ekspresją markerów mielomonocytowych, w tym CD4, CD13 i CD33, a także dodatnią aktywnością esterazy maślanej, co jest zgodne z ich monoblastycznym pochodzeniem.
Linia komórkowa ta jest szeroko stosowana w badaniach nad leukemogenezą, opornością na leki i szlakami molekularnymi leżącymi u podstaw białaczki. Na przykład SKM-1 stanowi platformę do badania wpływu dysfunkcji p53 i innych zmian genetycznych na proliferację komórek i odpowiedź terapeutyczną. Służy również jako model do badania nowych strategii terapeutycznych w przypadku zespołów mielodysplastycznych i wtórnej AML.

Chusteczka	Krew obwodowa
Choroba	ostra białaczka szpikowa

Synonimy

- SKM1

KLASYFIKACJA

Organizm	Człowiek
Seks	Mężczyzna
Właściwości związane ze wzrostem	Zawieszenie
Poziom bezpieczeństwa biologicznego	1

CECHY CHARAKTERYSTYCZNE

Morfologia	Okrągłe komórki
Czas podwojenia	48 godzin

IDENTYFIKATORY

Źródło

SKM-1 (numer katalogowy Cytion 305627)

Numer identyfikacji podatkowej NCBI	9606
Cellosaurus	CVCL_0098

EKSPRESJA I PODATNOŚĆ

Ekspresja antygenu

CD3 -, CD4 (+), CD13 +, CD14 -, CD15 +, CD19 -, CD33 +, HLA-DR +;

Cytion GmbH
Nikola-Tesla-Str. 3
69124 Heidelberg
Tel: +49 (0)6221 405780
info@cytion.com
cytion.com

Registered office Heidelberg
VAT ID: DE283292917
Local court Mannheim - HRB 714394
CEO / Geschäftsführer: Jonathan Steubing

Banking information
Sparkasse Heidelberg
IBAN: DE35 6725 0020 0009 2076 86
BIC: SOLADES1HDB

Profil mutacji

Mutacja: ASXL1, prosta, p.Tyr591Ter (c.1773C>A), homozygotyczna; Mutacja: BCORL1, prosta, c.4619-1G>A, homozygotyczna, mutacja akceptorowa splicingu; Mutacja: EZH2, prosta, p.Tyr646Cys (c.1937A>G), heterozygotyczna; Mutacja: KRAS, prosta, p.Lys117Asn (c.351A>C), homozygotyczna; Mutacja: TP53, prosta, p.Arg248Gln (c.743G>A), homozygotyczna

Wirusy

EBV -, HBV -, HCV -, HIV-1 -, HIV-2 -, HTLV-1/2 -, MLV -, SMRV -

POSTĘPOWANIE I HODOWLA

Pożywka hodowlana

RPMI 1640, w: 2,0 mM stabilnej glutaminy, w: 2,0 g/L NaHCO3 (numer artykułu Cytion 820700a)

Atmosfera inkubacyjna	37°C, 5%CO2, nawilżona atmosfera.

Suplementy

Uzupełnić podłoże 15% FBS

Odczynnik dysocjacyjny	Brak
Gęstość wysiewu	0,3 do 1 x 10^6 komórek/ml
Odnawianie płynów	2 do 3 razy w tygodniu

Rozmrażanie i hodowla

Confirm that the vial remains deeply frozen upon delivery, as cells are shipped on dry ice to maintain optimal temperatures during transit.
Upon receipt, either store the cryovial immediately at temperatures below -150°C to ensure the preservation of cellular integrity, or proceed to step 3 if immediate culturing is required.
For immediate culturing, swiftly thaw the vial by immersing it in a 37°C water bath with clean water and an antimicrobial agent, agitating gently for 40-60 seconds until a small ice clump remains.
Perform all subsequent steps under sterile conditions in a flow hood, disinfecting the cryovial with 70% ethanol before opening.
Carefully open the disinfected vial and transfer the cell suspension into a 15 ml centrifuge tube containing 8 ml of room-temperature culture medium, mixing gently.
Centrifuge the mixture at 300 x g for 3 minutes to separate the cells and carefully discard the supernatant containing residual freezing medium.
Gently resuspend the cell pellet in 10 ml of fresh culture medium. For adherent cells, divide the suspension between two T25 culture flasks; for suspension cultures, transfer all the medium into one T25 flask to promote effective cell interaction and growth.
Adhere to established subculture protocols for continued growth and maintenance of the cell line, ensuring reliable experimental outcomes.

KONTROLA JAKOŚCI I KRIOKONSERWACJA

Bezpłodność

Zanieczyszczenie mykoplazmą jest wykluczane przy użyciu zarówno testów opartych na PCR, jak i metod wykrywania mykoplazmy opartych na luminescencji.
Aby upewnić się, że nie ma zanieczyszczenia bakteriami, grzybami lub drożdżami, hodowle komórkowe są poddawane codziennym kontrolom wizualnym.

Pożywka do zamrażania	Jako pożywki do kriokonserwacji używamy kompletnej pożywki wzrostowej (w tym FBS) + 10% DMSO w celu zapewnienia odpowiedniej żywotności po rozmrożeniu lub CM-1 (numer katalogowy Cytion 800100), która zawiera zoptymalizowane osmoprotektanty i stabilizatory metaboliczne w celu zwiększenia regeneracji i zmniejszenia stresu wywołanego kriokonserwacją.

Warunki przechowywania

W celu długotrwałego przechowywania należy umieścić fiolki w ciekłym azocie w fazie lotnej w temperaturze od -150 do -196 °C.
Przechowywanie w temperaturze -80 °C jest dopuszczalne tylko jako krótki etap przejściowy przed przeniesieniem do ciekłego azotu.

Warunki wysyłki

Linie komórkowe poddane kriokonserwacji są wysyłane w suchym lodzie w zatwierdzonych, izolowanych opakowaniach z wystarczającą ilością czynnika chłodniczego, aby utrzymać temperaturę około -78°C przez cały czas transportu. Po otrzymaniu przesyłki należy natychmiast sprawdzić pojemnik i bezzwłocznie przenieść fiolki do odpowiedniego miejsca przechowywania.

DARCZYŃCA

Wiek dawcy	76 lat
Pochodzenie etniczne	Japoński

KWESTIE PRAWNE I BEZPIECZEŃSTWO

Środki bezpieczeństwa

Planując przechowywanie kriofiolek w ciekłym azocie w celu ich późniejszego rozmrożenia, należy bezwzględnie przestrzegać rygorystycznych środków bezpieczeństwa. Niezbędne są odpowiednie rękawice i odzież ochronna, a podczas przenoszenia zamrożonych próbek do lub ze zbiornika z ciekłym azotem wymagane jest stosowanie maski lub okularów ochronnych. Ma to na celu zmniejszenie ryzyka obrażeń spowodowanych potencjalnymi eksplozjami kriowialu podczas wyjmowania, które mogą skutkować wyrzuceniem ostrych fragmentów.

Gwarancja

W Cytion gwarantujemy jakość i żywotność naszych produktów.
Gwarantujemy, że nasze komórki będą żywotne na początku hodowli przez 60 dni po wysyłce z naszych zakładów.
Zapewniamy, że wszystkie materiały są zgodne ze specyfikacjami opisanymi w certyfikacie analizy i/lub karcie produktu
Szczegółowe informacje można znaleźć w naszej <a href=""/Who-we-are/Warranty/"" hreflang=""x-default"">Oświadczeniu gwarancyjnym

Wymagana umowa o transferze materiałów	Yes