SKM-1

305627

GENEL BILGILER

Açıklama

SKM-1 hücre hattı, miyelodisplastik sendromdan (MDS) gelişen akut monoblastik lösemi hastasının periferik kanından oluşturulan bir insan lösemi modelidir. Bu hücreler, yüksek çekirdek-sitoplazma oranı ve ince azurofilik granüller gibi olgunlaşmamış morfolojik özellikler sergilerler, bu da onları löseminin moleküler ve hücresel mekanizmalarını, özellikle MDS'den akut miyeloid lösemiye (AML) geçişi incelemek için mükemmel bir model haline getirir.
SKM-1'in genetik analizi, del(9)(q13;q22) ve der(17)t(17:?)(p13:?) dahil olmak üzere önemli kromozomal anormallikler ortaya çıkarmıştır; ikinci değişiklik, bu hücre hattında aşırı eksprese edilen ve mutasyonlar barındıran p53 genini içermektedir. Bu bulgular, miyeloid malignitelerin klonal evriminde ve ilerlemesinde p53'ün rolünü vurgulamaktadır. SKM-1 hücreleri ayrıca CD4, CD13 ve CD33 dahil miyelomonositik belirteçlerin ekspresyonu ve monoblastik soylarıyla uyumlu butirat esteraz aktivitesi pozitifliği ile karakterize edilir.
Bu hücre hattı, lösemogenez, ilaç direnci ve löseminin altında yatan moleküler yolaklar üzerine yapılan araştırmalarda yaygın olarak kullanılmaktadır. Örneğin, SKM-1, p53 disfonksiyonu ve diğer genetik lezyonların hücre proliferasyonu ve terapötik yanıt üzerindeki etkilerini araştırmak için bir platform sağlar. Ayrıca, miyelodisplastik sendromlar ve sekonder AML için yeni terapötik stratejileri araştırmak için bir model görevi görür.

Doku	Periferik kan
Hastalık	akut miyeloid lösemi

Eş anlamlılar

- SKM1

SINIFLANDIRMA

Canlı	İnsan
Cinsiyet	Erkek
Büyüme özellikleri	Askıya alma
Biyogüvenlik seviyesi	1

ÖZELLIKLER

Morfoloji	Yuvarlak hücreler
İki katına çıkma süresi	48 saat

TANIMLAYICILAR

Kaynak gösterimi

SKM-1 (Cytion katalog numarası 305627)

NCBI Vergi Kimlik Numarası	9606
Cellosaurus	CVCL_0098

İFADE VE DUYARLILIK

Antijen ekspresyonu

CD3 -, CD4 (+), CD13 +, CD14 -, CD15 +, CD19 -, CD33 +, HLA-DR +;

Cytion GmbH
Nikola-Tesla-Str. 3
69124 Heidelberg
Tel: +49 (0)6221 405780
info@cytion.com
cytion.com

Registered office Heidelberg
VAT ID: DE283292917
Local court Mannheim - HRB 714394
CEO / Geschäftsführer: Jonathan Steubing

Banking information
Sparkasse Heidelberg
IBAN: DE35 6725 0020 0009 2076 86
BIC: SOLADES1HDB

Mutasyon profili

Mutasyon: ASXL1, Basit, p.Tyr591Ter (c.1773C>A), Homozigot; Mutasyon: BCORL1, Basit, c.4619-1G>A, Homozigot, Spleys kabul edici Mutasyon; Mutasyon: EZH2, Basit, p.Tyr646Cys (c.1937A>G), Heterozigot; Mutasyon: KRAS, Basit, p.Lys117Asn (c.351A>C), Homozigot; Mutasyon: TP53, Basit, p.Arg248Gln (c.743G>A), Homozigot

Virüsler

EBV -, HBV -, HCV -, HIV-1 -, HIV-2 -, HTLV-1/2 -, MLV -, SMRV -

İŞLEME VE YETIŞTIRME

Besiyeri

RPMI 1640, w: 2.0 mM stabil Glutamin, w: 2.0 g/L $NaHCO_3$ (Cytion makale numarası 820700a)

Kuluçka ortamı	37°C, %5CO_2, nemlendirilmiş atmosfer.

Takviyeler

Ortamı %15 FBS ile takviye edin

Ayrıştırma reaktifi	Yok
Ekim yoğunluğu	0,3 ila 1 x 10^6 hücre/ml
Sıvı değişimi	haftada 2 ila 3 kez

Çözme ve kültürleme

Confirm that the vial remains deeply frozen upon delivery, as cells are shipped on dry ice to maintain optimal temperatures during transit.
Upon receipt, either store the cryovial immediately at temperatures below -150°C to ensure the preservation of cellular integrity, or proceed to step 3 if immediate culturing is required.
For immediate culturing, swiftly thaw the vial by immersing it in a 37°C water bath with clean water and an antimicrobial agent, agitating gently for 40-60 seconds until a small ice clump remains.
Perform all subsequent steps under sterile conditions in a flow hood, disinfecting the cryovial with 70% ethanol before opening.
Carefully open the disinfected vial and transfer the cell suspension into a 15 ml centrifuge tube containing 8 ml of room-temperature culture medium, mixing gently.
Centrifuge the mixture at 300 x g for 3 minutes to separate the cells and carefully discard the supernatant containing residual freezing medium.
Gently resuspend the cell pellet in 10 ml of fresh culture medium. For adherent cells, divide the suspension between two T25 culture flasks; for suspension cultures, transfer all the medium into one T25 flask to promote effective cell interaction and growth.
Adhere to established subculture protocols for continued growth and maintenance of the cell line, ensuring reliable experimental outcomes.

KALITE KONTROL VE KRIYOPREZERVASYON

Kısırlık

Mikoplazma kontaminasyonu hem PCR tabanlı tahliller hem de lüminesans tabanlı mikoplazma tespit yöntemleri kullanılarak dışlanır. Bakteriyel, fungal veya maya kontaminasyonu olmadığından emin olmak için hücre kültürleri günlük görsel incelemelere tabi tutulur.

Dondurma ortamı	Kriyoprezervasyon ortamı olarak, yeterli çözülme sonrası canlılık için tam büyüme ortamı (FBS dahil) + %10 DMSO veya iyileşmeyi artırmak ve kriyo-indüklenmiş stresi azaltmak için optimize edilmiş ozmoprotektanlar ve metabolik stabilizatörler içeren CM-1 (Cytion katalog numarası 800100) kullanıyoruz.

Saklama koşulları

Uzun süreli muhafaza için flakonları yaklaşık -150 ila -196 °C'de buhar fazlı sıvı nitrojen içine yerleştirin. 80 °C'de saklama yalnızca sıvı nitrojene aktarılmadan önce kısa bir ara adım olarak kabul edilebilir.

Nakliye koşulları

Kriyoprezerve edilmiş hücre hatları, nakliye boyunca yaklaşık -78 °C'yi korumak için yeterli soğutucu akışkan içeren, onaylanmış, yalıtılmış ambalajlarda kuru buz üzerinde gönderilir. Teslim aldığınızda, kabı hemen inceleyin ve flakonları gecikmeden uygun depoya aktarın.

BAĞIŞÇI

Bağışçının yaşı	76 yıl
Etnik köken	Japonca

YASAL VE GÜVENLIK

Güvenlik önlemleri

İleride çözdürmek üzere sıvı nitrojen içinde bir kriyoviyal saklamayı planlarken, sıkı güvenlik önlemlerine uymak zorunludur. Uygun koruyucu eldivenler ve giysiler şarttır ve dondurulmuş numunelerin sıvı nitrojen tankına veya tanktan transferi sırasında yüz maskesi veya koruyucu gözlük kullanılması gerekir. Bu, çıkarma sırasında keskin parçaların fırlamasına neden olabilecek potansiyel kriyoviyal patlamalardan kaynaklanan yaralanma riskini azaltmak içindir.

Garanti

Cytion olarak ürünlerimizin kalitesinin ve canlılığının arkasındayız.
Hücrelerimizin, tesislerimizden sevkiyattan sonra 60 gün boyunca kültürün başlangıcında canlı olacağını garanti ediyoruz.
Tüm malzemelerin Analiz Sertifikası ve/veya Ürün Sayfasında açıklanan özelliklere uygun olduğunu garanti ediyoruz
Tüm ayrıntılar için lütfen <a href=""/Who-we-are/Warranty/"" hreflang=""x-default"">Garanti Beyanımıza bakın

Malzeme Transfer Anlaşması gereklidir	Yes