SNU-368

305631

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Description

La lignée cellulaire SNU-368 est un modèle de carcinome hépatocellulaire humain (CHC) dérivé d'une tumeur primaire d'un patient masculin âgé de 54 ans. Cette lignée cellulaire fait partie d'un panel de huit lignées cellulaires CHC établies à partir de patients coréens, conçues pour refléter les diverses caractéristiques moléculaires et phénotypiques des cancers du foie. Les cellules SNU-368 présentent une morphologie adhérente polygonale et de nombreuses caractéristiques histologiques de la tumeur d'origine, notamment des arrangements trabéculaires et acineux, caractéristiques de la différenciation de grade II à IV selon Edmondson.
Sur le plan génétique, les cellules SNU-368 hébergent l'ADN intégré du virus de l'hépatite B (VHB) et expriment des transcrits du VHB, notamment HBx et preS/S. Ces caractéristiques en font un modèle précieux pour l'étude de l'hépatocarcinogenèse liée au VHB. SNU-368 exprime également la transferrine et le facteur de croissance analogue à l'insuline II (IGF-II), mais ne produit pas d'alpha-fœtoprotéine (AFP), ni au niveau de l'ARN ni au niveau des protéines. Ces caractéristiques moléculaires sont importantes pour explorer les voies du cancer du foie associées à l'infection virale, à la signalisation des facteurs de croissance et aux altérations métaboliques.
SNU-368 a été utilisé dans des études pharmacogénomiques, en particulier dans le Liver Cancer Model Repository (LIMORE), afin d'étudier les réponses aux médicaments et d'identifier des biomarqueurs potentiels pour des thérapies ciblées. L'inclusion de cette lignée cellulaire dans des analyses génomiques et transcriptomiques à grande échelle souligne sa pertinence dans la modélisation de l'hétérogénéité des CHC primaires, ce qui en fait un outil robuste pour étudier les fondements moléculaires du cancer du foie et évaluer de nouveaux agents thérapeutiques.

Tissu	Foie
Maladie	carcinome hépatocellulaire

Synonymes

- SNU368

CLASSIFICATION

Organisme	Humain
Sexe	Homme
Propriétés de croissance	Adepte
Niveau de biosécurité	2

CARACTÉRISTIQUES

Morphologie	Polygonal
Type de cellule	Endothéliales

Caryotype

A perdu le chromosome Y.

Temps de doublement	41 heures

IDENTIFIANTS

Référence

SNU-368 (référence Cytion 305631)

Cytion GmbH
Nikola-Tesla-Str. 3
69124 Heidelberg
Tel: +49 (0)6221 405780
info@cytion.com
cytion.com

Registered office Heidelberg
VAT ID: DE283292917
Local court Mannheim - HRB 714394
CEO / Geschäftsführer: Jonathan Steubing

Banking information
Sparkasse Heidelberg
IBAN: DE35 6725 0020 0009 2076 86
BIC: SOLADES1HDB

Numéro d'identification fiscale NCBI	9606
Cellosaurus	CVCL_3948

EXPRESSION ET SENSIBILITÉ

Profil mutationnel

Mutation : ARID1A, simple, p.Leu1607Profs*41 (c.4817dupT), non spécifiée ; Mutation : AXIN1, simple, p.Gln184Ter (c.550C>T), non spécifiée ; Mutation : TERT, simple, c.1-124C>T (c.228C>T) (C228T), non spécifiée ; Mutation : TP53, simple, p.Ser106Arg (c.318C>G), non spécifiée

Virus

VHB

MANIPULATION ET CULTURE

Milieu de culture

RPMI 1640, w : 2.0 mM Glutamine stable, w : 2.0 g/L NaHCO3 (numéro d'article Cytion 820700a)

Atmosphère d'incubation	37°C, 5%CO2, atmosphère humidifiée.

Compléments alimentaires

Compléter le milieu avec 10 % de FBS inactivé à la chaleur

Réactif de dissociation	Accutase

Repiquage

Retirer le milieu, ajouter une solution fraîche de trypsine à 0,25 % et d'EDTA à 0,02 %, placer le flacon de culture à 37""C pendant 3 à 5 minutes, ajouter le milieu de culture et collecter les cellules, transférer le milieu dans un tube de 15 ml, centrifuger, aspirer le milieu, remettre les culots en suspension avec le milieu de culture et les distribuer dans le flacon de culture

Renouvellement des fluides	2 à 3 fois par semaine

Décongélation et mise en culture

Confirm that the vial remains deeply frozen upon delivery, as cells are shipped on dry ice to maintain optimal temperatures during transit.
Upon receipt, either store the cryovial immediately at temperatures below -150°C to ensure the preservation of cellular integrity, or proceed to step 3 if immediate culturing is required.
For immediate culturing, swiftly thaw the vial by immersing it in a 37°C water bath with clean water and an antimicrobial agent, agitating gently for 40-60 seconds until a small ice clump remains.
Perform all subsequent steps under sterile conditions in a flow hood, disinfecting the cryovial with 70% ethanol before opening.
Carefully open the disinfected vial and transfer the cell suspension into a 15 ml centrifuge tube containing 8 ml of room-temperature culture medium, mixing gently.
Centrifuge the mixture at 300 x g for 3 minutes to separate the cells and carefully discard the supernatant containing residual freezing medium.
Gently resuspend the cell pellet in 10 ml of fresh culture medium. For adherent cells, divide the suspension between two T25 culture flasks; for suspension cultures, transfer all the medium into one T25 flask to promote effective cell interaction and growth.
Adhere to established subculture protocols for continued growth and maintenance of the cell line, ensuring reliable experimental outcomes.

CONTRÔLE QUALITÉ ET CRYOCONSERVATION

Stérilité

La contamination par les mycoplasmes est exclue à l'aide de tests basés sur la PCR et de méthodes de détection des mycoplasmes basées sur la luminescence.
Pour s'assurer de l'absence de contamination bactérienne, fongique ou levurienne, les cultures cellulaires font l'objet d'inspections visuelles quotidiennes.

Milieu de congélation	Comme milieu de cryoconservation, nous utilisons un milieu de croissance complet (comprenant du FBS) + 10 % de DMSO pour une viabilité adéquate après décongélation, ou CM-1 (numéro de catalogue 800100 de Cytion), qui comprend des osmoprotectants et des stabilisateurs métaboliques optimisés pour améliorer la récupération et réduire le stress induit par la cryogénisation.

Conditions de stockage

Pour une conservation à long terme, placer les flacons dans de l'azote liquide en phase vapeur à une température comprise entre -150 et -196 °C environ. Le stockage à -80 °C n'est acceptable qu'en tant qu'étape intermédiaire de courte durée avant le transfert dans l'azote liquide.

Conditions de livraison

Les lignées cellulaires cryoconservées sont expédiées sur glace sèche dans des emballages isolés et validés, avec suffisamment de réfrigérant pour maintenir une température d'environ -78 °C tout au long du transport. À la réception, inspecter immédiatement le conteneur et transférer sans délai les flacons dans un lieu de stockage approprié.

DONATEUR

Âge du donneur	54 ans
Origine ethnique	Coréen

ASPECTS JURIDIQUES ET SÉCURITÉ

Consignes de sécurité

Lorsque l'on envisage de stocker un cryovial dans l'azote liquide en vue d'une décongélation ultérieure, il est obligatoire de respecter des mesures de sécurité rigoureuses. Des gants et des vêtements de protection appropriés sont indispensables, et l'utilisation d'un masque facial ou de lunettes de sécurité est requise pendant le transfert des échantillons congelés vers ou depuis le réservoir d'azote liquide. Ceci afin de réduire le risque de blessures dues à l'explosion potentielle des cryoviaux lors de leur retrait, qui peut entraîner la projection de fragments tranchants.

Garantie

Chez Cytion, nous nous portons garants de la qualité et de la viabilité de nos produits.
Nous garantissons que nos cellules seront viables au début de la culture pendant 60 jours après l'expédition de nos installations.
Nous assurons que tous les matériaux sont conformes aux spécifications décrites dans le certificat d'analyse et/ou la fiche produit
Pour plus de détails, veuillez consulter notre <a href=""/Who-we-are/Warranty/"" hreflang=""x-default""> Déclaration de garantie

Un accord de transfert de matériel est requis	Yes