SNU-368

305631

ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK

Leírás

Az SNU-368 sejtvonal egy humán hepatocelluláris karcinóma (HCC) modell, amely egy 54 éves férfi beteg primer tumorából származik. Ez a sejtvonal egy nyolc HCC sejtvonalból álló panel része, amelyet koreai betegekből hoztak létre, és amelynek célja a májrákok különböző molekuláris és fenotípusos jellemzőinek tükrözése. Az SNU-368 sejtek sokszögű adhezív morfológiát mutatnak, és az eredeti tumor számos szövettani jellemzőjét hordozzák, beleértve a trabekuláris és acináris elrendezést, amelyek az Edmondson II–IV. fokozatú differenciálódásra jellemzőek.
Genetikailag az SNU-368 sejtek integrált hepatitis B vírus (HBV) DNS-t hordoznak és HBV transzkriptumokat expresszálnak, beleértve a HBx-et és a preS/S-t. Ezek a jellemzők értékes modellé teszik a HBV-vel kapcsolatos hepatokarcinogenezis tanulmányozásához. Az SNU-368 transzferrint és inzulin-szerű növekedési faktort II (IGF-II) is expresszál, de sem RNS-, sem fehérje szinten nem termel alfa-fetoproteint (AFP). Ezek a molekuláris jellemzők fontosak a vírusfertőzéssel, a növekedési faktorok jelátvitelével és az anyagcsere-változásokkal kapcsolatos májrákos folyamatok feltárásában.
Az SNU-368-at farmakogenomikai tanulmányokban, különösen a májrákmodell-tárban (LIMORE) alkalmazták a gyógyszerre adott válaszok vizsgálatára és a célzott terápiák potenciális biomarkereinek azonosítására. A sejtvonal bevonása nagyszabású genomikai és transzkriptomikai elemzésekbe aláhúzza annak jelentőségét az elsődleges HCC-k heterogenitásának modellezésében, ami robusztus eszközzé teszi a májrák molekuláris alapjainak tanulmányozásához és új terápiás szerek értékeléséhez.

Szövet	Máj
Betegség	hepatocelluláris karcinóma

Szinonimák

- SNU368

OSZTÁLYOZÁS

Organizmus	Ember
Szex	Férfi
Növekedési tulajdonságok	Hűséges
Biológiai biztonsági szint	2

JELLEMZŐK

Morfológia	Poligonális
Sejttípus	Endothelialis

Kariotípus

Elvesztette a Y kromoszómát.

Kettőzési idő	41 óra

AZONOSÍTÓK

Hivatkozás

SNU-368 (Cytion katalógusszám: 305631)

Cytion GmbH
Nikola-Tesla-Str. 3
69124 Heidelberg
Tel: +49 (0)6221 405780
info@cytion.com
cytion.com

Registered office Heidelberg
VAT ID: DE283292917
Local court Mannheim - HRB 714394
CEO / Geschäftsführer: Jonathan Steubing

Banking information
Sparkasse Heidelberg
IBAN: DE35 6725 0020 0009 2076 86
BIC: SOLADES1HDB

NCBI adóazonosító szám	9606
Cellosaurus	CVCL_3948

KIFEJEZŐDÉS ÉS FOGÉKONYSÁG

Mutációs profil

Mutáció: ARID1A, egyszerű, p.Leu1607Profs*41 (c.4817dupT), meg nem határozott; Mutáció: AXIN1, egyszerű, p.Gln184Ter (c.550C>T), meg nem határozott; Mutáció: TERT, egyszerű, c.1-124C>T (c.228C>T) (C228T), nem meghatározott; Mutáció: TP53, egyszerű, p.Ser106Arg (c.318C>G), nem meghatározott

Vírusok

HBV

KEZELÉS ÉS TENYÉSZTÉS

Táptalaj

RPMI 1640, w: 2,0 mM stabil glutamin, w: 2,0 g/L NaHCO3 (Cytion 820700a cikkszám)

Inkubációs környezet	37°C, 5%CO2, párásított légkör.

Kiegészítők

A táptalajt 10% hővel inaktivált FBS-szel egészítsük ki

Diszociációs reagens	Accutase

Átültetés

Távolítsuk el a tápfolyadékot, adjunk hozzá friss 0,25 %-os tripszin 0,02 %-os EDTA oldatot, állítsuk a tenyésztőlombikot 37""C-on 3-5 percig, adjunk hozzá tápfolyadékot és gyűjtsük össze a sejteket, a tápfolyadékot vigyük át 15 ml-es csőbe, centrifugáljuk, szívjuk le a tápfolyadékot, szuszpendáljuk újra a pelleteket tápfolyadékkal és adagoljuk a tenyésztőlombikba

Folyadékcsere	hetente 2-3 alkalommal

Felolvasztás és tenyésztés

Confirm that the vial remains deeply frozen upon delivery, as cells are shipped on dry ice to maintain optimal temperatures during transit.
Upon receipt, either store the cryovial immediately at temperatures below -150°C to ensure the preservation of cellular integrity, or proceed to step 3 if immediate culturing is required.
For immediate culturing, swiftly thaw the vial by immersing it in a 37°C water bath with clean water and an antimicrobial agent, agitating gently for 40-60 seconds until a small ice clump remains.
Perform all subsequent steps under sterile conditions in a flow hood, disinfecting the cryovial with 70% ethanol before opening.
Carefully open the disinfected vial and transfer the cell suspension into a 15 ml centrifuge tube containing 8 ml of room-temperature culture medium, mixing gently.
Centrifuge the mixture at 300 x g for 3 minutes to separate the cells and carefully discard the supernatant containing residual freezing medium.
Gently resuspend the cell pellet in 10 ml of fresh culture medium. For adherent cells, divide the suspension between two T25 culture flasks; for suspension cultures, transfer all the medium into one T25 flask to promote effective cell interaction and growth.
Adhere to established subculture protocols for continued growth and maintenance of the cell line, ensuring reliable experimental outcomes.

MINŐSÉGELLENŐRZÉS ÉS KRIOKONZERVÁLÁS

Meddőség

A mikoplazma-szennyeződést mind a PCR-alapú vizsgálatokkal, mind a lumineszcencia-alapú mikoplazma-kimutatási módszerekkel kizárják. A bakteriális, gombás vagy élesztőgombás szennyeződés elkerülése érdekében a sejtkultúrákat napi vizuális ellenőrzésnek vetik alá.

Fagyasztóközeg	Krioprezerváló táptalajként teljes növekedési táptalajt (beleértve az FBS-t) + 10% DMSO-t használunk a megfelelő kiolvasztás utáni életképesség érdekében, vagy CM-1-et (Cytion katalógusszám: 800100), amely optimalizált ozmoprotektánsokat és metabolikus stabilizátorokat tartalmaz a regenerálódás fokozása és a krio-indukált stressz csökkentése érdekében.

Tárolási feltételek

Hosszú távú tartósítás céljából helyezze az üvegeket gőzfázisú folyékony nitrogénbe, körülbelül -150 és -196 °C közötti hőmérsékleten. A -80 °C-on történő tárolás csak rövid átmeneti lépésként fogadható el a folyékony nitrogénbe való átvitel előtt.

Szállítási feltételek

A kriokonzervált sejtvonalakat szárazjégen, validált, szigetelt csomagolásban szállítják, elegendő hűtőközeggel, hogy a szállítás során a hőmérsékletet körülbelül -78 °C-on tartsák. Átvételkor azonnal vizsgálja meg a tárolóedényt, és haladéktalanul helyezze át az injekciós üvegeket a megfelelő tárolóhelyre.

ADOMÁNYOZÓ

Az adományozó életkora	54 év
Etnikai hovatartozás	Koreai

JOGI ÉS BIZTONSÁGI INFORMÁCIÓK

Biztonsági óvintézkedések

Ha egy kriovialitást folyékony nitrogénben tervezünk tárolni a későbbi kiolvasztás céljából, akkor kötelező betartani a szigorú biztonsági intézkedéseket. A megfelelő védőkesztyű és védőruházat elengedhetetlen, és a fagyasztott minták folyékony nitrogéntartályba vagy a folyékony nitrogéntartályból történő átvitele során arcmaszk vagy védőszemüveg használata szükséges. Ez azért van, hogy csökkentsék a kriovialis anyagok eltávolításakor bekövetkező esetleges robbanásból eredő sérülésveszélyt, amely éles szilánkok kilövellését eredményezheti.

Garancia

A Cytionnál kiállunk termékeink minősége és életképessége mellett.
Garantáljuk, hogy sejtjeink a tenyésztés megkezdésekor életképesek lesznek, a létesítményünkből történő kiszállítás után 60 napig.
Biztosítjuk, hogy minden anyag megfelel az analitikai tanúsítványban és/vagy a terméklapon leírt specifikációknak
A teljes részleteket lásd <a href="""/Who-we-are/Warranty/"" hreflang="""'x-default"">Garancia nyilatkozatunkban

Anyagátadási megállapodás szükséges	Yes