SNU-368

305631

ALGEMENE INFORMATIE

Beschrijving

De SNU-368-cellijn is een humaan hepatocellulair carcinoom (HCC)-model dat is afgeleid van een primaire tumor van een 54-jarige mannelijke patiënt. Deze cellijn maakt deel uit van een panel van acht HCC-cellijnen die zijn vastgesteld bij Koreaanse patiënten, ontworpen om de diverse moleculaire en fenotypische kenmerken van leverkankers weer te geven. SNU-368-cellen vertonen een veelhoekige hechtende morfologie en vertonen veel histologische kenmerken van de oorspronkelijke tumor, waaronder trabeculaire en acinaire structuren, die kenmerkend zijn voor Edmondson-graad II tot IV-differentiatie.
Genetisch gezien bevatten SNU-368-cellen geïntegreerd hepatitis B-virus (HBV)-DNA en brengen ze HBV-transcripten tot expressie, waaronder HBx en preS/S. Deze kenmerken maken het een waardevol model voor het bestuderen van HBV-gerelateerde hepatocarcinogenese. SNU-368 brengt ook transferrine en insuline-achtige groeifactor II (IGF-II) tot expressie, maar produceert geen alfa-fetoproteïne (AFP), noch op RNA- noch op eiwitniveau. Dergelijke moleculaire kenmerken zijn belangrijk voor het onderzoeken van leverkankerpaden die verband houden met virale infectie, groeifactorsignalering en metabole veranderingen.
SNU-368 is gebruikt in farmacogenomische studies, met name in de Liver Cancer Model Repository (LIMORE), om de respons op geneesmiddelen te onderzoeken en potentiële biomarkers voor gerichte therapieën te identificeren. De opname van de cellijn in grootschalige genomische en transcriptomische analyses onderstreept het belang ervan voor het modelleren van de heterogeniteit van primaire HCC's, waardoor het een robuust instrument is voor het bestuderen van de moleculaire basis van leverkanker en het evalueren van nieuwe therapeutische middelen.

Weefsel	Lever
Ziekte	hepatocellulair carcinoom

Synoniemen

- SNU368

CLASSIFICATIE

Organisme	Mens
Seks	Man
Groei-eigenschappen	Aanhanger
Bioveiligheidsniveau	2

KENMERKEN

Morfologie	Veelhoekig
Celtype	Endotheel

Karyotype

Heeft chromosoom Y verloren.

Verdubbelingstijd	41 uur

IDENTIFICATIEGEGEVENS

Bronvermelding

SNU-368 (Cytion-catalogusnummer 305631)

Cytion GmbH
Nikola-Tesla-Str. 3
69124 Heidelberg
Tel: +49 (0)6221 405780
info@cytion.com
cytion.com

Registered office Heidelberg
VAT ID: DE283292917
Local court Mannheim - HRB 714394
CEO / Geschäftsführer: Jonathan Steubing

Banking information
Sparkasse Heidelberg
IBAN: DE35 6725 0020 0009 2076 86
BIC: SOLADES1HDB

NCBI-belastingnummer	9606
Cellosaurus	CVCL_3948

EXPRESSIE EN VATBAARHEID

Mutatieprofiel

Mutatie: ARID1A, eenvoudig, p.Leu1607Profs*41 (c.4817dupT), niet gespecificeerd; Mutatie: AXIN1, eenvoudig, p.Gln184Ter (c.550C>T), niet gespecificeerd; Mutatie: TERT, eenvoudig, c.1-124C>T (c.228C>T) (C228T), niet gespecificeerd; Mutatie: TP53, eenvoudig, p.Ser106Arg (c.318C>G), niet gespecificeerd

Virussen

HBV

BEHANDELING EN KWEEK

Kweekmedium

RPMI 1640, w: 2,0 mM stabiele Glutamine, w: 2,0 g/L NaHCO3 (Cytion artikelnummer 820700a)

Incubatieomgeving	37°C, 5%CO2, bevochtigde atmosfeer.

Supplementen

Vul het medium aan met 10% geïnactiveerde FBS

Dissociatiereagens	Accutase

Heruitplanten

Verwijder medium, voeg verse 0,25% trypsine 0,02% EDTA-oplossing toe, plaats kweekkolf gedurende 3 tot 5 minuten op 37""C, voeg kweekmedium toe en verzamel de cellen, breng het medium over in een 15 ml-buis, centrifugeer, zuig het medium op, resuspendeer de pellets met kweekmedium en breng over in de kweekkolf

Vloeistofverversing	2 tot 3 keer per week

Ontdooien en kweken

Confirm that the vial remains deeply frozen upon delivery, as cells are shipped on dry ice to maintain optimal temperatures during transit.
Upon receipt, either store the cryovial immediately at temperatures below -150°C to ensure the preservation of cellular integrity, or proceed to step 3 if immediate culturing is required.
For immediate culturing, swiftly thaw the vial by immersing it in a 37°C water bath with clean water and an antimicrobial agent, agitating gently for 40-60 seconds until a small ice clump remains.
Perform all subsequent steps under sterile conditions in a flow hood, disinfecting the cryovial with 70% ethanol before opening.
Carefully open the disinfected vial and transfer the cell suspension into a 15 ml centrifuge tube containing 8 ml of room-temperature culture medium, mixing gently.
Centrifuge the mixture at 300 x g for 3 minutes to separate the cells and carefully discard the supernatant containing residual freezing medium.
Gently resuspend the cell pellet in 10 ml of fresh culture medium. For adherent cells, divide the suspension between two T25 culture flasks; for suspension cultures, transfer all the medium into one T25 flask to promote effective cell interaction and growth.
Adhere to established subculture protocols for continued growth and maintenance of the cell line, ensuring reliable experimental outcomes.

KWALITEITSCONTROLE EN CRYOPRESERVATIE

Onvruchtbaarheid

Mycoplasmaverontreiniging wordt uitgesloten met zowel PCR-gebaseerde testen als op luminescentie gebaseerde mycoplasmadetectiemethoden.
Om er zeker van te zijn dat er geen besmetting is met bacteriën, schimmels of gisten, worden de celculturen dagelijks onderworpen aan visuele inspecties.

Kweekmedium invriezen	Als cryoconserveringsmedium gebruiken we volledig groeimedium (inclusief FBS) + 10% DMSO voor voldoende levensvatbaarheid na het ontdooien, of CM-1 (Cytion catalogusnummer 800100), dat geoptimaliseerde osmoprotectanten en metabolische stabilisatoren bevat om het herstel te verbeteren en door cryo geïnduceerde stress te verminderen.

Opslagvoorwaarden

Voor langdurige bewaring plaatst u flesjes in vloeibare stikstof in dampfase bij ongeveer -150 tot -196 °C. Opslag bij -80 °C is alleen aanvaardbaar als korte tussenstap vóór overbrenging naar vloeibare stikstof.

Verzendvoorwaarden

Gecryopreserveerde cellijnen worden verzonden op droog ijs in gevalideerde, geïsoleerde verpakkingen met voldoende koelmiddel om gedurende het transport ongeveer -78 °C te handhaven. Inspecteer de verpakking onmiddellijk na ontvangst en breng de flacons onverwijld over naar de juiste opslagplaats.

DONATEUR

Leeftijd van de donor	54 jaar
Etnische afkomst	Koreaans

JURIDISCHE EN VEILIGHEIDSASPECTEN

Veiligheidsmaatregelen

Wanneer men van plan is om een cryovial in vloeibare stikstof op te slaan om later te ontdooien, is het verplicht om strenge veiligheidsmaatregelen in acht te nemen. Passende beschermende handschoenen en kleding zijn essentieel en het gebruik van een gezichtsmasker of veiligheidsbril is vereist tijdens het overbrengen van bevroren monsters naar of uit de tank met vloeibare stikstof. Dit is om het risico op letsel door mogelijke cryoviale explosies bij het verwijderen te beperken, wat kan resulteren in de projectie van scherpe fragmenten.

Garantie

Bij Cytion staan we achter de kwaliteit en levensvatbaarheid van onze producten.
We garanderen dat onze cellen levensvatbaar zijn bij het begin van de kweek gedurende 60 dagen na verzending vanuit onze faciliteiten.
We verzekeren dat alle materialen voldoen aan de specificaties beschreven in het analysecertificaat en/of productblad
Raadpleeg voor volledige informatie onze <a href=""/Wie-zijn-wij/Garantie/"" hreflang=""x-default"">Garantieverklaring

Er is een overeenkomst inzake materiaaloverdracht vereist	Yes

Cytion GmbH
Nikola-Tesla-Str. 3
69124 Heidelberg
Tel: +49 (0)6221 405780
info@cytion.com
cytion.com

Registered office Heidelberg
VAT ID: DE283292917
Local court Mannheim - HRB 714394
CEO / Geschäftsführer: Jonathan Steubing

Banking information
Sparkasse Heidelberg
IBAN: DE35 6725 0020 0009 2076 86
BIC: SOLADES1HDB