SNU-368

305631

ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ

Опис

Клітинна лінія SNU-368 є моделлю гепатоцелюлярної карциноми (ГЦК) людини, отриманою з первинної пухлини 54-річного пацієнта чоловічої статі. Ця клітинна лінія є частиною панелі з восьми клітинних ліній ГЦК, створених на основі корейських пацієнтів, і призначена для відображення різноманітних молекулярних та фенотипових характеристик раку печінки. Клітини SNU-368 мають багатокутну адгезивну морфологію і демонструють багато гістологічних особливостей первинної пухлини, включаючи трабекулярну та ацинарну структуру, що характерно для диференціації II–IV ступеня за Едмондсоном.
Генетично клітини SNU-368 містять інтегровану ДНК вірусу гепатиту B (HBV) і експресують транскрипти HBV, включаючи HBx і preS/S. Ці особливості роблять її цінною моделлю для вивчення гепатокарциногенезу, пов'язаного з HBV. SNU-368 також експресує трансферин та інсуліноподібний фактор росту II (IGF-II), але не продукує альфа-фетопротеїн (AFP) ні на рівні РНК, ні на рівні білка. Такі молекулярні характеристики є важливими для дослідження шляхів розвитку раку печінки, пов'язаних з вірусною інфекцією, сигналами факторів росту та метаболічними змінами.
SNU-368 використовується у фармакогеномних дослідженнях, зокрема в Репозиторії моделей раку печінки (LIMORE), для вивчення реакції на ліки та виявлення потенційних біомаркерів для цільової терапії. Включення клітинної лінії до масштабних геномних та транскриптомних аналізів підкреслює її важливість у моделюванні гетерогенності первинних ГЦК, що робить її надійним інструментом для вивчення молекулярних основ раку печінки та оцінки нових терапевтичних засобів.

Тканина	Печінка
Хвороба	гепатоцелюлярна карцинома

Синоніми

- SNU368

КЛАСИФІКАЦІЯ

Організм	Людина
Секс	Чоловік
Характеристики росту	Прихильник
Рівень біобезпеки	2

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Морфологія	Полігональна
Тип клітини	Ендотеліальний

Каріотип

Втратив хромосому Y.

Час подвоєння	41 година

ІДЕНТИФІКАТОРИ

Посилання

SNU-368 (номер у каталозі Cytion 305631)

Cytion GmbH
Nikola-Tesla-Str. 3
69124 Heidelberg
Tel: +49 (0)6221 405780
info@cytion.com
cytion.com

Registered office Heidelberg
VAT ID: DE283292917
Local court Mannheim - HRB 714394
CEO / Geschäftsführer: Jonathan Steubing

Banking information
Sparkasse Heidelberg
IBAN: DE35 6725 0020 0009 2076 86
BIC: SOLADES1HDB

Ідентифікаційний номер платника податків NCBI	9606
Целозавр	CVCL_3948

ЕКСПРЕСІЯ ТА СПРИЙНЯТЛИВІСТЬ

Профіль мутацій

Мутація: ARID1A, проста, p.Leu1607Profs*41 (c.4817dupT), неспецифікована; Мутація: AXIN1, проста, p.Gln184Ter (c.550C>T), неспецифікована; Мутація: TERT, проста, c.1-124C>T (c.228C>T) (C228T), неспецифікована; Мутація: TP53, проста, p.Ser106Arg (c.318C>G), неспецифікована

Віруси

HBV

ОБРОБКА ТА ВИРОЩУВАННЯ

Живильне середовище

RPMI 1640, w: 2,0 мМ стабільний глютамін, w: 2,0 г/л NaHCO3 (номер за каталожним номером 820700a)

Атмосфера інкубації	37°C, 5% CO2, волога атмосфера.

Добавки

Додайте до середовища 10% термоінактивованого FBS

Реагент для дисоціації	Аккутаза

Пересадка в нове середовище

Видаліть середовище, додайте свіжий 0,25 % розчин трипсину, 0,02 % розчин ЕДТА, витримайте культуральну колбу при 37""C протягом 3-5 хвилин, додайте культуральне середовище і зберіть клітини, перенесіть середовище в пробірку на 15 мл, центрифугуйте, аспіруйте середовище, ресуспендуйте гранули з культуральним середовищем і внесіть в культуральну колбу

Оновлення рідини	2-3 рази на тиждень

Розморожування та культивування

Confirm that the vial remains deeply frozen upon delivery, as cells are shipped on dry ice to maintain optimal temperatures during transit.
Upon receipt, either store the cryovial immediately at temperatures below -150°C to ensure the preservation of cellular integrity, or proceed to step 3 if immediate culturing is required.
For immediate culturing, swiftly thaw the vial by immersing it in a 37°C water bath with clean water and an antimicrobial agent, agitating gently for 40-60 seconds until a small ice clump remains.
Perform all subsequent steps under sterile conditions in a flow hood, disinfecting the cryovial with 70% ethanol before opening.
Carefully open the disinfected vial and transfer the cell suspension into a 15 ml centrifuge tube containing 8 ml of room-temperature culture medium, mixing gently.
Centrifuge the mixture at 300 x g for 3 minutes to separate the cells and carefully discard the supernatant containing residual freezing medium.
Gently resuspend the cell pellet in 10 ml of fresh culture medium. For adherent cells, divide the suspension between two T25 culture flasks; for suspension cultures, transfer all the medium into one T25 flask to promote effective cell interaction and growth.
Adhere to established subculture protocols for continued growth and maintenance of the cell line, ensuring reliable experimental outcomes.

КОНТРОЛЬ ЯКОСТІ ТА КРІОКОНСЕРВАЦІЯ

Стерильність

Зараження мікоплазмою виключається за допомогою аналізів на основі ПЛР та люмінесцентних методів виявлення мікоплазми. Щоб переконатися у відсутності бактеріального, грибкового або дріжджового забруднення, клітинні культури піддаються щоденному візуальному контролю.

Середовище для заморожування	Як середовище кріоконсервування ми використовуємо повне живильне середовище (включаючи FBS) + 10% ДМСО для адекватної життєздатності після відтавання або CM-1 (номер за каталогом Cytion 800100), до складу якого входять оптимізовані осмопротектори та метаболічні стабілізатори для прискорення відновлення та зменшення кріоіндукованого стресу.

Умови зберігання

Для тривалого зберігання помістіть флакони в парофазний рідкий азот при температурі від -150 до -196 °C. Зберігання при -80 °C допустиме лише як короткий проміжний етап перед перенесенням у рідкий азот.

Умови доставки

Кріоконсервовані клітинні лінії транспортуються на сухому льоду в перевіреній ізольованій упаковці з достатньою кількістю холодоагенту для підтримання температури приблизно -78 °C під час транспортування. При отриманні негайно огляньте контейнер і без зволікань перемістіть флакони у відповідне місце зберігання.

ДОНОР

Вік донора	54 роки
Етнічна приналежність	Корейська

ПРАВОВІ ПИТАННЯ ТА БЕЗПЕКА

Заходи безпеки

Плануючи зберігати кріовіал у рідкому азоті для подальшого розморожування, обов'язково слід дотримуватися суворих заходів безпеки. Під час перенесення заморожених зразків до резервуара з рідким азотом або з нього необхідно використовувати захисні рукавички та одяг, а також маску або захисні окуляри. Це необхідно для того, щоб зменшити ризик травмування від потенційних кріогенних вибухів при вилученні, які можуть призвести до розльоту гострих осколків.

Гарантія

У Cytion ми відповідаємо за якість та життєздатність нашої продукції.
Ми гарантуємо, що наші клітини будуть життєздатними на початку культивування протягом 60 днів після відвантаження з нашого заводу.
Ми запевняємо, що всі матеріали відповідають специфікаціям, описаним у сертифікаті аналізу та/або паспорті продукту
Для отримання більш детальної інформації, будь ласка, зверніться до нашого Заяви про гарантію

Необхідна угода про передачу матеріалів	Yes