SNU-638

305634

معلومات عامة

الوصف

هو نموذج لسرطان المعدة البشري الذي تم إنشاؤه من السائل الاستسقاطي لمريض سرطان المعدة الذكر. ويُظهر تمايزاً ضعيفاً وحداً خط الخلية SNU-638 أدنى من التمايز، وينمو في المختبر بنمط مختلط مع كثافة غير متجانسة وتعلق ضعيف بركيزة الزرع. تحافظ الخلايا على محيط دائري إلى بيضاوي وتُظهر نسبة منخفضة من النواة إلى السيتوبلازم، مع تطور محدود من الميكروفيلي. تعكس هذه الخصائص السمات التي ترتبط عادةً بالأنماط الظاهرية العدوانية لسرطان المعدة وتجعل هذا الخط مناسباً لدراسة الأورام الغدية المعدية ضعيفة التمايز.
أما على المستوى الجزيئي، لا يحمل سلالة SNU-638 طفرات في الجين *c-Ki-Ras، مثل CA ولكنه يعبر عن مستويات عالية من العلامات المرتبطة بالورم (AFP). كما أنه يحمل أيضًا طفرة جينية في *TP53، والتي توجد بشكل متكرر في 19-9 ومستضد بولي ببتيد الأنسجة (TPA)، مع غياب تعبير البروتين الجنيني ألفا (AFP). كشف التنميط الجينومي أن MET، مما يفتقر إلى تضخيم أو زيادة في التعبير عن البروتين SNU-638 سرطانات المعدة وتلعب دورًا محوريًا في نشأة الورم. هذا المظهر الجزيئي يجعل من SNU-638 خط خلية تحكم قيّم في الدراسات التي يصنفه على أنه سلبي مع الحد الأدنى من الاعتماد على مسار إشارات MET. تستهدف مثبطات MET أو تقييم فعالية MET في سرطان المعدة.

الأنسجة	المعدة
المرض	السرطان الغدي
موقع الانتشار	الاستسقاء

المرادفات

- SNU638

التصنيف

كائن حي	إنسان
الجنس	ذكر
خصائص النمو	الملتزم
مستوى السلامة البيولوجية	1

الخصائص

المورفولوجيا	شبيه بالظهارة
نوع الخلية	الظهارة
زمن المضاعفة	25 ساعة

المعرّفات

المرجع

SNU-638 (305634 الرقم الكتالوجي لسيتيون)

NCBI رقم التعريف الضريبي لدى	9606
سيلوصور	CVCL_0102

Cytion GmbH
Nikola-Tesla-Str. 3
69124 Heidelberg
Tel: +49 (0)6221 405780
info@cytion.com
cytion.com

Registered office Heidelberg
VAT ID: DE283292917
Local court Mannheim - HRB 714394
CEO / Geschäftsführer: Jonathan Steubing

Banking information
Sparkasse Heidelberg
IBAN: DE35 6725 0020 0009 2076 86
BIC: SOLADES1HDB

التعبير والقابلية للإصابة

الأنماط الطفريّة

متغاير الزيجوت، p.Arg282Trp (c.844C>T)، بسيط: TP53، غير محدد؛ طفرة: p.Asn375Ser (c.1124A>G)، بسيط: MET، طفرة

التعامل مع النباتات وزراعتها

وسط الاستزراع

RPMI 1640، ث: 2.0 جم/لتر NaHCO3 (820700 رقم المادة aمن سايتيون) ث: 2.0 مللي مولار جلوتامين مستقر،

بيئة الحضانة	37 درجة مئوية، و5% من ثاني أكسيد الكربون في جو مرطب.

المكملات الغذائية

إضافة 10% من FBS المعطل بالحرارة إلى الوسط

كاشف التفكك	أكوتاس

إعادة الاستنبات

لمدة 3 إلى 5 دقائق، وأضف وسط C""وأوقف دورق الزرع عند 37، EDTA أزل الوسط، وأضف محلول التربسين الطازج 0.25% تربسين 0.02% محلول الزرع واجمع الخلايا، وانقل الوسط إلى أنبوب سعة 15 مل، ثم قم بالطرد المركزي، وشفط الوسط، وأعد ترسيب الكريات مع وسط الزرع، ووزعه في دورق الزرع

تجديد السوائل	إلى 3 مرات في الأسبوع 2

إذابة الثلج والزراعة

Confirm that the vial remains deeply frozen upon delivery, as cells are shipped on dry ice to maintain optimal temperatures during transit.
Upon receipt, either store the cryovial immediately at temperatures below -150°C to ensure the preservation of cellular integrity, or proceed to step 3 if immediate culturing is required.
For immediate culturing, swiftly thaw the vial by immersing it in a 37°C water bath with clean water and an antimicrobial agent, agitating gently for 40-60 seconds until a small ice clump remains.
Perform all subsequent steps under sterile conditions in a flow hood, disinfecting the cryovial with 70% ethanol before opening.
Carefully open the disinfected vial and transfer the cell suspension into a 15 ml centrifuge tube containing 8 ml of room-temperature culture medium, mixing gently.
Centrifuge the mixture at 300 x g for 3 minutes to separate the cells and carefully discard the supernatant containing residual freezing medium.
Gently resuspend the cell pellet in 10 ml of fresh culture medium. For adherent cells, divide the suspension between two T25 culture flasks; for suspension cultures, transfer all the medium into one T25 flask to promote effective cell interaction and growth.
Adhere to established subculture protocols for continued growth and maintenance of the cell line, ensuring reliable experimental outcomes.

مراقبة الجودة والحفظ بالتبريد

العقم

وطرق الكشف عن الميكوبلازما القائمة على (PCR) يُستبعد التلوث بالميكوبلازما باستخدام كل من المقايسات القائمة على تفاعل البوليميراز المتسلسل التألق.
ولضمان عدم وجود تلوث بكتيري أو فطري أو خميرة يتم إخضاع مزارع الخلايا للفحص البصري اليومي.

وسط التجميد	من أجل الحفاظ DMSO 10% + (FBS بما في ذلك) كوسيط للحفظ بالتبريد، نستخدم وسط نمو كامل والذي يتضمن مواد حماية ،(رقم Cytion 800100 كتالوج) CM-1 على حيوية كافية بعد ذوبان الجليد أو أسموزموبيروتيكتية ومثبتات أيضية مُحسّنة لتعزيز التعافي وتقليل الإجهاد الناجم عن التبريد.

شروط التخزين

للحفظ طويل الأمد، ضع القوارير في نيتروجين سائل في طور البخار عند درجة حرارة تتراوح بين -150 و -196 درجة مئوية تقريباً. يُقبل التخزين عند درجة حرارة -80 درجة مئوية فقط كخطوة مؤقتة قصيرة قبل النقل إلى النيتروجين السائل.

شروط الشحن

تُشحن خطوط الخلايا المحفوظة بالتبريد على ثلج جاف في عبوات معزولة وموثوقة مع مبرد كافٍ للحفاظ على درجة حرارة -78 درجة مئوية تقريبًا طوال فترة النقل. عند الاستلام، افحص الحاوية على الفور وانقل القوارير دون تأخير إلى المخزن المناسب.

Cytion GmbH
Nikola-Tesla-Str. 3
69124 Heidelberg
Tel: +49 (0)6221 405780
info@cytion.com
cytion.com

Registered office Heidelberg
VAT ID: DE283292917
Local court Mannheim - HRB 714394
CEO / Geschäftsführer: Jonathan Steubing

Banking information
Sparkasse Heidelberg
IBAN: DE35 6725 0020 0009 2076 86
BIC: SOLADES1HDB

المانح

عمر المتبرع	سنة 48
الأصل العرقي	كوري

الشؤون القانونية والسلامة

احتياطات السلامة

عند التخطيط لتخزين القارورة المبردة في النيتروجين السائل لإذابتها في المستقبل، من الضروري الالتزام بتدابير السلامة الصارمة. من الضروري ارتداء قفازات وملابس واقية مناسبة، كما يلزم استخدام قناع الوجه أو نظارات السلامة أثناء نقل العينات المجمدة من خزان النيتروجين السائل أو إليه. وذلك للتخفيف من خطر الإصابة من الانفجارات المحتملة للنيتروجين المبرد عند الإزالة، والتي يمكن أن تؤدي إلى قذف شظايا حادة.

الضمان

في Cytion، نلتزم Cytion بجودة منتجاتنا وحيويتها.
نحن نضمن أن تكون خلايانا قابلة للحياة في بداية الاستزراع لمدة 60 يومًا بعد الشحن من منشآتنا.
نؤكد أن جميع المواد مطابقة للمواصفات الموضحة في شهادة التحليل و/أو ورقة المنتج
بيان الضمان<a href=""/Who-we-are/Warranty/"" hreflang=""x-default"">للحصول على التفاصيل الكاملة، يُرجى الرجوع إلى

يلزم إبرام اتفاقية نقل المواد	Yes

Cytion GmbH
Nikola-Tesla-Str. 3
69124 Heidelberg
Tel: +49 (0)6221 405780
info@cytion.com
cytion.com

Registered office Heidelberg
VAT ID: DE283292917
Local court Mannheim - HRB 714394
CEO / Geschäftsführer: Jonathan Steubing

Banking information
Sparkasse Heidelberg
IBAN: DE35 6725 0020 0009 2076 86
BIC: SOLADES1HDB