SNU-719

305636

معلومات عامة

الوصف

هي نموذج لسرطان المعدة البشري تم إنشاؤه من نسيج ورم المعدة الأولي لمريض بالغ في كوريا. وهي تنتمي إلى مجموعة من SNU-719 سلسلة الخلايا SNU-719 سلالات سرطان المعدة التي تم تطويرها لدعم أبحاث السرطان في شرق آسيا، حيث معدل انتشار سرطان المعدة مرتفع بشكل خاص. تم اشتقاق من سرطان غدي متوسط التمايز وأظهر ارتباطًا قويًا بأسطح الثقافة البلاستيكية، حيث ينمو كطبقة أحادية منتشرة. تم الحفاظ على الخط في وسط RPMI-1640 المكمل بـ 10٪ من مصل جنين البقر المعطل بالحرارة.

ومستويات عالية من مستضد البولي ببتيد النسيجي (CEA) عن وجود مستضد سرطاني جنيني SNU-719 كشف التحليل البيوكيميائي والجيني الشامل لـ TP53، على حدد تحليل الطفرات تغيرات في جين .(aFP) في كل من الطبقة العائمة ومحلول الخلايا. ومع ذلك، لم يتم الكشف عن ألفا فيتوبروتين (TPA) نموذجًا مناسبًا لدراسة الآليات الجزيئية لسرطان SNU-719 ظل دون طفرات في هذا الخط. هذه الميزات تجعل c-Ki-ras الرغم من أن الجين المسرطن هويته وتفرده، مما يضمن موثوقية خط الخلايا SNP و STR الغدة المعدية وتقييم تعبير المؤشرات الحيوية والتدخلات العلاجية. بالإضافة إلى ذلك، أكد تحليل .للتجارب المختبرية

الأنسجة	المعدة
المرض	سرطان غدي أنبوبي

المرادفات

- SNU719
- NCI-SNU-719

التصنيف

كائن حي	إنسان
الجنس	ذكر
خصائص النمو	الملتزم
مستوى السلامة البيولوجية	2

الخصائص

المورفولوجيا	شبيه بالظهارة
نوع الخلية	الظهارة
زمن المضاعفة	ساعة 43

المعرّفات

المرجع

SNU-719 (رقم كتالوج Cytion 305636)

رقم التعريف الضريبي لدى NCBI	9606
سيلوصور	CVCL_5086

التعبير والقابلية للإصابة

الأنماط الطفريّة

طفرة: CTNNB1، بسيطة، p.Gly34Val (c.101G>T)، طفرة؛ متغايرة: MET، بسيطة، p.Asp153Ala (c.458A>C)، طفرة؛ متغايرة: NRAS، بسيطة، p.Gln61Leu (c.182A>T)، طفرة؛ متماثلة: PIK3CA، بسيطة، p.Pro104Arg (c.311C>G)، غير متماثلة

التعامل مع النباتات وزراعتها

وسط الاستزراع

RPMI 1640، ث: 2.0 جم/لتر NaHCO3 (820700 رقم المادة aمن سايتيون) ث: 2.0 مللي مولار جلوتامين مستقر،

بيئة الحضانة	37 درجة مئوية، و5% من ثاني أكسيد الكربون في جو مرطب.

المكملات الغذائية

قم بتزويد الوسط ب 10٪ من ال FBS

كاشف التفكك	أكوتاس

إعادة الاستنبات

لمدة 3 إلى 5 دقائق، وأضف وسط C""وأوقف دورق الزرع عند 37، EDTA أزل الوسط، وأضف محلول التربسين الطازج 0.25% تربسين 0.02% محلول الزرع واجمع الخلايا، وانقل الوسط إلى أنبوب سعة 15 مل، ثم قم بالطرد المركزي، وشفط الوسط، وأعد ترسيب الكريات مع وسط الزرع، ووزعه في دورق الزرع

تجديد السوائل	إلى 3 مرات في الأسبوع 2

إذابة الثلج والزراعة

Confirm that the vial remains deeply frozen upon delivery, as cells are shipped on dry ice to maintain optimal temperatures during transit.
Upon receipt, either store the cryovial immediately at temperatures below -150°C to ensure the preservation of cellular integrity, or proceed to step 3 if immediate culturing is required.
For immediate culturing, swiftly thaw the vial by immersing it in a 37°C water bath with clean water and an antimicrobial agent, agitating gently for 40-60 seconds until a small ice clump remains.
Perform all subsequent steps under sterile conditions in a flow hood, disinfecting the cryovial with 70% ethanol before opening.
Carefully open the disinfected vial and transfer the cell suspension into a 15 ml centrifuge tube containing 8 ml of room-temperature culture medium, mixing gently.
Centrifuge the mixture at 300 x g for 3 minutes to separate the cells and carefully discard the supernatant containing residual freezing medium.
Gently resuspend the cell pellet in 10 ml of fresh culture medium. For adherent cells, divide the suspension between two T25 culture flasks; for suspension cultures, transfer all the medium into one T25 flask to promote effective cell interaction and growth.
Adhere to established subculture protocols for continued growth and maintenance of the cell line, ensuring reliable experimental outcomes.

مراقبة الجودة والحفظ بالتبريد

العقم

وطرق الكشف عن الميكوبلازما القائمة على (PCR) يُستبعد التلوث بالميكوبلازما باستخدام كل من المقايسات القائمة على تفاعل البوليميراز المتسلسل التألق.
ولضمان عدم وجود تلوث بكتيري أو فطري أو خميرة يتم إخضاع مزارع الخلايا للفحص البصري اليومي.

وسط التجميد	من أجل الحفاظ DMSO 10% + (FBS بما في ذلك) كوسيط للحفظ بالتبريد، نستخدم وسط نمو كامل والذي يتضمن مواد حماية ،(رقم Cytion 800100 كتالوج) CM-1 على حيوية كافية بعد ذوبان الجليد أو أسموزموبيروتيكتية ومثبتات أيضية مُحسّنة لتعزيز التعافي وتقليل الإجهاد الناجم عن التبريد.

شروط التخزين

للحفظ طويل الأمد، ضع القوارير في نيتروجين سائل في طور البخار عند درجة حرارة تتراوح بين -150 و -196 درجة مئوية تقريباً. يُقبل التخزين عند درجة حرارة -80 درجة مئوية فقط كخطوة مؤقتة قصيرة قبل النقل إلى النيتروجين السائل.

شروط الشحن

تُشحن خطوط الخلايا المحفوظة بالتبريد على ثلج جاف في عبوات معزولة وموثوقة مع مبرد كافٍ للحفاظ على درجة حرارة -78 درجة مئوية تقريبًا طوال فترة النقل. عند الاستلام، افحص الحاوية على الفور وانقل القوارير دون تأخير إلى المخزن المناسب.

Cytion GmbH
Nikola-Tesla-Str. 3
69124 Heidelberg
Tel: +49 (0)6221 405780
info@cytion.com
cytion.com

Registered office Heidelberg
VAT ID: DE283292917
Local court Mannheim - HRB 714394
CEO / Geschäftsführer: Jonathan Steubing

Banking information
Sparkasse Heidelberg
IBAN: DE35 6725 0020 0009 2076 86
BIC: SOLADES1HDB

المانح

عمر المتبرع	سنة 53
الأصل العرقي	كوري

الشؤون القانونية والسلامة

احتياطات السلامة

عند التخطيط لتخزين القارورة المبردة في النيتروجين السائل لإذابتها في المستقبل، من الضروري الالتزام بتدابير السلامة الصارمة. من الضروري ارتداء قفازات وملابس واقية مناسبة، كما يلزم استخدام قناع الوجه أو نظارات السلامة أثناء نقل العينات المجمدة من خزان النيتروجين السائل أو إليه. وذلك للتخفيف من خطر الإصابة من الانفجارات المحتملة للنيتروجين المبرد عند الإزالة، والتي يمكن أن تؤدي إلى قذف شظايا حادة.

الضمان

في Cytion، نلتزم Cytion بجودة منتجاتنا وحيويتها.
نحن نضمن أن تكون خلايانا قابلة للحياة في بداية الاستزراع لمدة 60 يومًا بعد الشحن من منشآتنا.
نؤكد أن جميع المواد مطابقة للمواصفات الموضحة في شهادة التحليل و/أو ورقة المنتج
بيان الضمان<a href=""/Who-we-are/Warranty/"" hreflang=""x-default"">للحصول على التفاصيل الكاملة، يُرجى الرجوع إلى

يلزم إبرام اتفاقية نقل المواد	Yes