SNU-719

305636

GENERAL INFORMATION

Description

A linhagem celular SNU-719 é um modelo de carcinoma gástrico humano estabelecido a partir do tecido tumoral gástrico primário de um paciente adulto do sexo masculino na Coreia. Ela faz parte de uma coleção de linhagens de câncer gástrico desenvolvidas para apoiar a pesquisa sobre o câncer no Leste Asiático, região onde a prevalência do câncer gástrico é particularmente alta. A SNU-719 foi derivada de um adenocarcinoma moderadamente diferenciado e demonstrou forte aderência a superfícies de cultura plásticas, crescendo como uma monocamada difusa. A linha foi mantida no meio RPMI-1640 suplementado com 10% de soro fetal bovino inativado por calor.
O perfil bioquímico e genético abrangente da SNU-719 revelou a expressão do antígeno carcinoembrionário (CEA) e altos níveis do antígeno polipeptídico tecidual (TPA) tanto no sobrenadante quanto no lisado celular. No entanto, a alfa-fetoproteína (aFP) não foi detectada. A análise de mutações identificou alterações no gene TP53, embora o oncogene c-Ki-ras tenha permanecido sem mutações nessa linhagem. Essas características tornam a SNU-719 um modelo adequado para o estudo dos mecanismos moleculares do adenocarcinoma gástrico e para a avaliação da expressão de biomarcadores e de intervenções terapêuticas. Além disso, o perfil de STR e SNP confirmou sua identidade e exclusividade, garantindo a confiabilidade da linhagem celular para experimentos in vitro.

Tissue	Estômago
Disease	adenocarcinoma tubular

Synonyms

- SNU719
- NCI-SNU-719

CLASSIFICATION

Organism	Human
Sex	Male
Growth properties	Adherent
Biosafety level	2

CHARACTERISTICS

Morphology	De tipo epitelial
Cell type	Epithelial
Doubling time	43 horas

IDENTIFIERS

Citation

SNU-719 (número de catálogo da Cytion 305636)

NCBI TaxID	9606
Cellosaurus	CVCL_5086

EXPRESSION AND SUSCEPTIBILITY

Mutational profile

Mutação: CTNNB1, simples, p.Gly34Val (c.101G>T), heterozigótica; Mutação: MET, simples, p.Asp153Ala (c.458A>C), heterozigótica; Mutação: NRAS, simples, p.Gln61Leu (c.182A>T), homozigótica; Mutação: PIK3CA, simples, p.Pro104Arg (c.311C>G), heterozigótica

HANDLING AND CULTURE

Culture medium

RPMI 1640, com 2,0 mM de glutamina estável e 2,0 g/L de $NaHCO_3$ (número de artigo da Cytion: 820700a)

Incubation atmosphere	37 °C, 5% de CO_2, atmosfera umidificada.

Supplements

Adicione 10% de FBS ao meio

Dissociation reagent	Accutase

Subculturing

Remova o meio, adicione uma solução fresca de tripsina a 0,25 % e EDTA a 0,02 %, deixe o frasco de cultura em repouso a 37""C por 3 a 5 minutos, adicione o meio de cultura e recolha as células, transfira o meio para um tubo de 15 ml, centrifugue, aspire o meio, ressuspenda os sedimentos com meio de cultura e transfira para o frasco de cultura

Fluid renewal	2 a 3 vezes por semana

Thawing and culturing

Confirm that the vial remains deeply frozen upon delivery, as cells are shipped on dry ice to maintain optimal temperatures during transit.
Upon receipt, either store the cryovial immediately at temperatures below -150°C to ensure the preservation of cellular integrity, or proceed to step 3 if immediate culturing is required.
For immediate culturing, swiftly thaw the vial by immersing it in a 37°C water bath with clean water and an antimicrobial agent, agitating gently for 40-60 seconds until a small ice clump remains.
Perform all subsequent steps under sterile conditions in a flow hood, disinfecting the cryovial with 70% ethanol before opening.
Carefully open the disinfected vial and transfer the cell suspension into a 15 ml centrifuge tube containing 8 ml of room-temperature culture medium, mixing gently.
Centrifuge the mixture at 300 x g for 3 minutes to separate the cells and carefully discard the supernatant containing residual freezing medium.
Gently resuspend the cell pellet in 10 ml of fresh culture medium. For adherent cells, divide the suspension between two T25 culture flasks; for suspension cultures, transfer all the medium into one T25 flask to promote effective cell interaction and growth.
Adhere to established subculture protocols for continued growth and maintenance of the cell line, ensuring reliable experimental outcomes.

QUALITY CONTROL AND CRYOPRESERVATION

Sterility

A contaminação por micoplasma é descartada por meio de ensaios baseados em PCR e de métodos de detecção de micoplasma baseados em luminescência.
Para garantir que não haja contaminação por bactérias, fungos ou leveduras, as culturas celulares são submetidas a inspeções visuais diárias.

Freeze medium	Como meio de criopreservação, utilizamos meio de crescimento completo (incluindo FBS) + 10% de DMSO para garantir viabilidade adequada após o descongelamento, ou CM-1 (número de catálogo da Cytion 800100), que inclui osmoprotetores e estabilizadores metabólicos otimizados para melhorar a recuperação e reduzir o estresse induzido pela criopreservação.

Storage conditions

Para preservação a longo prazo, coloque os frascos em nitrogênio líquido em fase de vapor a uma temperatura entre aproximadamente −150 e −196 °C. O armazenamento a −80 °C é aceitável apenas como uma etapa intermediária de curta duração antes da transferência para o nitrogênio líquido.

Shipping conditions

As linhagens celulares criopreservadas são enviadas em gelo seco, em embalagens isoladas e validadas, com refrigerante suficiente para manter a temperatura em aproximadamente −78 °C durante todo o transporte. Ao receber a remessa, inspecione o recipiente imediatamente e transfira os frascos sem demora para o local de armazenamento adequado.

DONOR

Donor age	53 anos
Ethnicity	Coreano

LEGAL AND SAFETY

Safety precautions

Ao planejar o armazenamento de um criotubo em nitrogênio líquido para descongelamento futuro, é obrigatório seguir medidas de segurança rigorosas. É essencial o uso de luvas e roupas de proteção adequadas, além do uso obrigatório de máscara facial ou óculos de proteção durante a transferência de amostras congeladas para dentro ou para fora do tanque de nitrogênio líquido. Isso visa mitigar o risco de ferimentos decorrentes de possíveis explosões dos criotubos durante a remoção, o que pode resultar na projeção de fragmentos pontiagudos.

Warranty

Na Cytion, garantimos a qualidade e a viabilidade de nossos produtos.
Garantimos que nossas células permanecerão viáveis no início da cultura por
60 dias após o envio de nossas instalações.
Asseguramos que todos os materiais estão em conformidade com as especificações descritas no
Certificado de Análise e/ou na Ficha Técnica do Produto.
Para obter todos os detalhes, consulte nossa
Declaração de Garantia.

Material Transfer Agreement required	Yes