SNU-761

305637

GENERAL INFORMATION

Description

La línea celular SNU-761 es un modelo de carcinoma hepatocelular humano (CHC) derivado de un paciente adulto. Como parte de las iniciativas Cancer Cell Line Encyclopedia (CCLE) y LIMORE (Liver Cancer Model Repository), la línea SNU-761 ha sido ampliamente caracterizada en múltiples niveles moleculares. Esta línea celular se ha utilizado para explorar la heterogeneidad genética y transcriptómica típica de los cánceres primarios de hígado, incluidos aquellos asociados con la infección por el virus de la hepatitis B (VHB), que es prevalente en muchos casos de CHC en Asia Oriental. El perfil genómico ha revelado que los modelos de LIMORE, como el SNU-761, suelen conservar el panorama de mutaciones y alteraciones en el número de copias de los tumores primarios, incluidas las alteraciones en factores oncogénicos clave como TP53, CTNNB1 y FGF19.
La SNU-761 y otros modelos de cáncer de hígado de la colección LIMORE se han sometido a un cribado de alta capacidad de sensibilidad a fármacos con un amplio panel de quimioterapéuticos y agentes dirigidos. Estos conjuntos de datos farmacogenómicos han permitido a los investigadores identificar posibles biomarcadores predictivos de la respuesta, como asociaciones gen-fármaco y letalidades sintéticas relevantes para mutaciones comunes en el cáncer de hígado. Además, las comparaciones de datos transcriptómicos y epigenéticos —como los patrones de metilación del ADN y de modificación de histonas— han ayudado a clasificar el SNU-761 dentro de los subtipos de cáncer de hígado y a evaluar sus atributos funcionales, incluyendo la invasividad y la respuesta a inhibidores específicos de vías de señalización. Este perfil exhaustivo convierte al SNU-761 en un modelo valioso para estudiar el CHC relacionado con el VHB y evaluar estrategias terapéuticas personalizadas.

Tissue	Hígado
Disease	carcinoma hepatocelular

Synonyms

- SNU761
- NCI-SNU-761

CLASSIFICATION

Organism	Human
Sex	Male
Growth properties	Adherent
Biosafety level	2

CHARACTERISTICS

Morphology	Poligonal
Cell type	Epithelial
Doubling time	24 horas

IDENTIFIERS

Citation

SNU-761 (número de catálogo de Cytion 305637)

NCBI TaxID	9606

Cellosaurus	CVCL_5089

EXPRESSION AND SUSCEPTIBILITY

Mutational profile

Mutación: TP53, simple, p.Ser313Glyfs*13 (c.937_968delAGCTCCTCTCCCCAGCCAAAGAAGAAACCACT), no especificada

HANDLING AND CULTURE

Culture medium

RPMI 1640, con 2,0 mM de glutamina estable y 2,0 g/L de $NaHCO_3$ (número de artículo de Cytion: 820700a)

Incubation atmosphere	37 °C, 5 % de CO_2, atmósfera humidificada.

Supplements

Añada al medio un 10 % de suero fetal bovino (FBS) inactivado por calor, 2,5 g/L de glucosa y 10 mM de HEPES

Dissociation reagent	Accutase

Subculturing

Retira el medio, agrega una solución fresca de tripsina al 0,25 % y EDTA al 0,02 %, deja reposar el frasco de cultivo a 37""C durante 3 a 5 minutos, agregar el medio de cultivo y recolectar las células, transferir el medio a un tubo de 15 ml, centrifugar, aspirar el medio, resuspender los sedimentos con medio de cultivo y dispensar en el frasco de cultivo

Seeding density	De 1 a 3 × 10^4 células/cm^2
Fluid renewal	De 2 a 3 veces por semana

Thawing and culturing

Confirm that the vial remains deeply frozen upon delivery, as cells are shipped on dry ice to maintain optimal temperatures during transit.
Upon receipt, either store the cryovial immediately at temperatures below -150°C to ensure the preservation of cellular integrity, or proceed to step 3 if immediate culturing is required.
For immediate culturing, swiftly thaw the vial by immersing it in a 37°C water bath with clean water and an antimicrobial agent, agitating gently for 40-60 seconds until a small ice clump remains.
Perform all subsequent steps under sterile conditions in a flow hood, disinfecting the cryovial with 70% ethanol before opening.
Carefully open the disinfected vial and transfer the cell suspension into a 15 ml centrifuge tube containing 8 ml of room-temperature culture medium, mixing gently.
Centrifuge the mixture at 300 x g for 3 minutes to separate the cells and carefully discard the supernatant containing residual freezing medium.
Gently resuspend the cell pellet in 10 ml of fresh culture medium. For adherent cells, divide the suspension between two T25 culture flasks; for suspension cultures, transfer all the medium into one T25 flask to promote effective cell interaction and growth.
Adhere to established subculture protocols for continued growth and maintenance of the cell line, ensuring reliable experimental outcomes.

QUALITY CONTROL AND CRYOPRESERVATION

Sterility

Se descarta la contaminación por micoplasmas mediante ensayos basados en PCR y métodos de detección de micoplasmas basados en luminiscencia.
Para garantizar que no haya contaminación bacteriana, fúngica o por levaduras, los cultivos celulares se someten a inspecciones visuales diarias.

Freeze medium	Como medio de criopreservación, utilizamos un medio de crecimiento completo (que incluye FBS) + 10 % de DMSO para garantizar una viabilidad adecuada tras la descongelación, o CM-1 (número de catálogo de Cytion 800100), que incluye osmoprotectores y estabilizadores metabólicos optimizados para mejorar la recuperación y reducir el estrés inducido por la criopreservación.

Storage conditions

Para la conservación a largo plazo, coloque los viales en nitrógeno líquido en fase de vapor a una temperatura de entre −150 y −196 °C, aproximadamente. El almacenamiento a −80 °C solo es aceptable como un paso intermedio breve antes de transferirlos al nitrógeno líquido.

Shipping conditions

Las líneas celulares criopreservadas se envían en hielo seco, en un embalaje aislante validado que contiene suficiente refrigerante para mantener una temperatura de aproximadamente −78 °C durante todo el transporte. Al recibir el envío, revise el contenedor de inmediato y traslade los viales sin demora al lugar de almacenamiento adecuado.

DONOR

Donor age	49 años
Ethnicity	Coreano

LEGAL AND SAFETY

Safety precautions

Cuando se planea almacenar un criovial en nitrógeno líquido para su descongelación futura, es obligatorio cumplir con estrictas medidas de seguridad. Es esencial contar con guantes y ropa de protección adecuados, y se requiere el uso de una mascarilla o lentes de seguridad durante la transferencia de muestras congeladas hacia o desde el tanque de nitrógeno líquido. Esto tiene como objetivo mitigar el riesgo de lesiones por posibles explosiones de los criotubos al retirarlos, lo que puede provocar la proyección de fragmentos afilados.

Warranty

En Cytion, respaldamos la calidad y la viabilidad de nuestros productos.
Garantizamos que nuestras células serán viables al inicio del cultivo durante
60 días a partir de la fecha de envío desde nuestras instalaciones.
Aseguramos que todos los materiales cumplen con las especificaciones descritas en el
Certificado de Análisis y/o la Ficha del Producto.
Para obtener más detalles, consulte nuestra
Declaración de garantía.

Material Transfer Agreement required	Yes