SNU-81

305638

GENERAL INFORMATION

Description

La lignée cellulaire SNU-81 est un modèle de carcinome colorectal humain établi à partir d'un patient coréen. Elle fait partie d'une collection de 12 lignées cellulaires de cancer colorectal dérivées à la fois de tumeurs primaires et de sites métastatiques, offrant ainsi un aperçu varié de la biologie tumorale. La lignée SNU-81 a été dérivée d'un adénocarcinome colorectal primaire et présente une morphologie épithéliale avec une croissance adhérente en culture. Elle exprime l'antigène carcino-embryonnaire (ACE), qui est sécrété dans le surnageant de culture, ce qui reflète les caractéristiques typiques des tumeurs colorectales.
Au niveau moléculaire, la lignée SNU-81 a fait l'objet d'une caractérisation génétique approfondie. Elle porte une mutation du gène suppresseur de tumeur TP53, un événement courant dans la carcinogenèse colorectale, généralement associé aux stades avancés de la progression tumorale. De plus, des mutations du gène APC ont été identifiées, ce qui implique une perturbation de la voie de signalisation Wnt/β-caténine, une caractéristique distinctive du développement du cancer colorectal. Aucune mutation activatrice n'a été détectée dans le gène K-ras2 pour cette lignée. Des altérations des régulateurs du cycle cellulaire, telles que l'hyperméthylation du gène p16, ont également été observées, ce qui renforce encore l'utilité de cette lignée cellulaire pour l'étude des mécanismes génétiques et épigénétiques à l'origine du cancer colorectal. Dans l'ensemble, la lignée SNU-81 constitue un modèle in vitro bien défini pour l'étude de la fonction des gènes suppresseurs de tumeurs, de la régulation des voies oncogéniques et de la réponse aux thérapies ciblées dans le cadre de la recherche sur le cancer colorectal.

Tissue	Deux-points
Disease	Adénocarcinome

Synonyms

- SNU81
- NCI-SNU-81

CLASSIFICATION

Organism	Human
Sex	Male
Growth properties	Adherent
Biosafety level	1

CHARACTERISTICS

Morphology	De type épithélial
Cell type	Épithélial
Doubling time	30 heures

IDENTIFIERS

Citation

SNU-81 (numéro de catalogue Cytion 305638)

NCBI TaxID	9606
Cellosaurus	CVCL_5098

Cytion GmbH
Nikola-Tesla-Str. 3
69124 Heidelberg
Tel: +49 (0)6221 405780
info@cytion.com
cytion.com

Registered office Heidelberg
VAT ID: DE283292917
Local court Mannheim - HRB 714394
CEO / Geschäftsführer: Jonathan Steubing

Banking information
Sparkasse Heidelberg
IBAN: DE35 6725 0020 0009 2076 86
BIC: SOLADES1HDB

EXPRESSION AND SUSCEPTIBILITY

Mutational profile

Mutation : APC, simple, p.Ser1392Ter (c.4175C>A), hétérozygote; Mutation : APC, simple, p.Arg1450Ter (c.4348C>T), hétérozygote; Mutation : APC, simple, p.Arg2204Ter (c.6610C>T), hétérozygote; Mutation : FBXW7, simple, p.Arg479Gln (c.1436G>A), hétérozygote; Mutation : KRAS, simple, p.Ala146Thr (c.436G>A), hétérozygote; Mutation : PTEN, simple, p.Arg130Gln (c.389G>A), hétérozygote; Mutation : PTEN, simple, p.Glu299Ter (c.895G>T), hétérozygote; Mutation : TBX3, simple, p.Glu111Ter (c.331G>T), hétérozygote; Mutation : TBX3, simple, c.942-1G>T, hétérozygote; Mutation : TP53, simple, p.Lys132Thr (c.395A>C), hétérozygote; Mutation : TP53, simple, p.Arg213Ter (c.637C>T), hétérozygote

HANDLING AND CULTURE

Culture medium

RPMI 1640, contenant 2,0 mM de glutamine stable et 2,0 g/L de $NaHCO_3$ (numéro d'article Cytion 820700a)

Incubation atmosphere	37 °C, 5 % de CO_2, atmosphère humidifiée.

Supplements

Ajouter 10 % de FBS au milieu de culture

Dissociation reagent	Accutase

Subculturing

Retirer le milieu, ajouter une solution fraîche de trypsine à 0,25 % et d'EDTA à 0,02 %, laisser reposer le flacon de culture à 37""C pendant 3 à 5 minutes, ajouter le milieu de culture et recueillir les cellules, transférer le milieu dans un tube de 15 ml, centrifuger, aspirer le milieu, remettre les culots en suspension dans le milieu de culture et les distribuer dans le flacon de culture

Fluid renewal	2 à 3 fois par semaine

Thawing and culturing

Confirm that the vial remains deeply frozen upon delivery, as cells are shipped on dry ice to maintain optimal temperatures during transit. Upon receipt, either store the cryovial immediately at temperatures below -150°C to ensure the preservation of cellular integrity, or proceed to step 3 if immediate culturing is required.
For immediate culturing, swiftly thaw the vial by immersing it in a 37°C water bath with clean water and an antimicrobial agent, agitating gently for 40-60 seconds until a small ice clump remains.
Perform all subsequent steps under sterile conditions in a flow hood, disinfecting the cryovial with 70% ethanol before opening.
Carefully open the disinfected vial and transfer the cell suspension into a 15 ml centrifuge tube containing 8 ml of room-temperature culture medium, mixing gently.
Centrifuge the mixture at 300 x g for 3 minutes to separate the cells and carefully discard the supernatant containing residual freezing medium.
Gently resuspend the cell pellet in 10 ml of fresh culture medium. For adherent cells, divide the suspension between two T25 culture flasks; for suspension cultures, transfer all the medium into one T25 flask to promote effective cell interaction and growth.
Adhere to established subculture protocols for continued growth and maintenance of the cell line, ensuring reliable experimental outcomes.

QUALITY CONTROL AND CRYOPRESERVATION

Sterility

La contamination par les mycoplasmes est exclue à l'aide de tests basés sur la PCR et de méthodes de détection des mycoplasmes par luminescence.
Afin de s'assurer qu'il n'y a aucune contamination bactérienne, fongique ou par des levures, les cultures cellulaires font l'objet d'inspections visuelles quotidiennes.

Freeze medium	Comme milieu de cryoconservation, nous utilisons un milieu de croissance complet (contenant du sérum fœtal bovin) + 10 % de DMSO pour assurer une viabilité adéquate après décongélation, ou du CM-1 (référence Cytion 800100), qui contient des osmoprotecteurs et des stabilisateurs métaboliques optimisés pour améliorer la récupération et réduire le stress induit par la cryoconservation.

Storage conditions

Pour une conservation à long terme, placez les flacons dans de l’azote liquide en phase vapeur à une température comprise entre environ −150 et −196 °C. L’entreposage à −80 °C n’est acceptable qu’à titre d’étape intermédiaire de courte durée avant le transfert dans l’azote liquide.

Shipping conditions

Les lignées cellulaires cryoconservées sont expédiées dans de la glace sèche, dans un emballage isotherme validé contenant suffisamment de réfrigérant pour maintenir une température d’environ −78 °C pendant tout le transport. À la réception, inspectez immédiatement le conteneur et transférez sans délai les flacons dans un lieu de stockage approprié.

DONOR

Donor age	53 ans
Ethnicity	coréen

LEGAL AND SAFETY

Safety precautions

Lorsqu’on prévoit entreposer un cryotube dans de l’azote liquide en vue d’une décongélation ultérieure, il est impératif de respecter des mesures de sécurité rigoureuses. Le port de gants et de vêtements de protection appropriés est essentiel, et l’utilisation d’un masque facial ou de lunettes de protection est obligatoire lors du transfert d’échantillons congelés vers ou depuis le réservoir d’azote liquide. Cette précaution vise à réduire le risque de blessure causé par d’éventuelles explosions de cryotubes lors de leur retrait, pouvant entraîner la projection de fragments coupants.

Warranty

Chez Cytion, nous garantissons la qualité et la viabilité de nos produits.
Nous garantissons que nos cellules seront viables au début de la culture pendant 60 jours à compter de leur expédition depuis nos installations.
Nous assurons que tous les matériaux sont conformes aux spécifications décrites dans le certificat d’analyse et/ou la fiche technique du produit.
Pour plus de détails, veuillez consulter notre déclaration de garantie.

Material Transfer Agreement required	Yes